

CHOLÉCYSTITE AIGUË

CHIRURGIE DIGESTIVE

MEDICOME

DÉFINITION

Infection aiguë de la vésicule biliaire due à l'obstruction prolongée du canal cystique par un calcul biliaire (lithiase). Risque d'évolution vers la gangrène vésiculaire.

SIGNES CLINIQUES

- **Douleur** : Hypochondre Droit, inhibant la respiration.
- **Signe de Murphy** : Douleur vive bloquant l'inspiration profonde à la palpation sous-costale droite.
- **Fièvre** : $> 38.5^{\circ}\text{C}$, frissons.
- **Absence d'ictère** : Pas de jaunisse (sauf complication).

TERRAIN (RÈGLE DES 4 F)

- Female (Femme).
- Forty (Quarantaine/Âge mûr).
- Fat (Surpoids).
- Fertile (Multipare / Grossesse).

EXAMENS & TRAITEMENT

- ✓ **Échographie Abdominale** : Examen de référence. Montre l'épaississement de la paroi ($>4\text{mm}$), le calcul et le Murphy échographique.
- ✓ **Traitement** : Antibiotiques (Amoxicilline-Ac. Clavulanique) + Cholécystectomie précoce.

COMPLICATION : ANGIOCHOLITE

Si la fièvre et la douleur sont associées à un **ictère** (jaunisse), le calcul a migré dans la voie biliaire principale. Risque de choc septique élevé.