

## DÉFINITION

Obstruction partielle ou totale d'une artère pulmonaire par un caillot (thrombus), provenant le plus souvent d'une thrombose veineuse profonde (phlébite) des membres inférieurs.

## SIGNES CLINIQUES

- **Dyspnée aiguë** : Soudaine, inexpliquée, "soif d'air".
- **Douleur** : Basithoracique, type "point de côté", augmente à l'inspiration.
- **Hémoptysie** : Crachats sanglants (tardif).
- **Signes de TVP** : Mollet douloureux, chaud, signe de Homans.

## FACTEURS DE RISQUE

- Chirurgie récente (orthopédique, cancer).
- Alitement prolongé, voyage long courrier.
- Contraception œstroprogestative + Tabac.
- Antécédents personnels de MTEV.

## EXAMENS & STRATÉGIE

- ✓ **ECG** : Souvent normal ou Tachycardie sinusale (S1Q3 rare).
- ✓ **D-Dimères** : Si probabilité faible. Très bonne Valeur Prédictive Négative.
- ✓ **Angioscanner Thoracique** : Examen de référence pour confirmer.
- ✓ **Traitement** : Anticoagulants curatifs (HBPM ou AOD) immédiats.

## PIÈGE À ÉVITER

Ne jamais attendre les résultats de l'imagerie pour débiter les anticoagulants si la probabilité clinique est forte, sauf contre-indication majeure.