



Domingo de tarde

RMS 2024

Residência Multiprofissional em Saúde FDT

PROFISSÃO: ODONTOLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno:
 - contém 60 (sessenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

RASCUNHO

Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

HUMANIZAÇÃO, SAÚDE COLETIVA; LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 01 – Sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde nos termos da Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as seguintes assertivas:

- I. O acesso aos serviços de saúde deve dar-se exclusivamente pelos serviços de Atenção Básica, integrados por centros de saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde.
- II. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender às pessoas, é responsabilidade da direção e da equipe do serviço acolher, dar informações claras e encaminhá-las sem discriminação e privilégios.
- III. O encaminhamento para outros serviços de saúde deve dar-se por meio de um documento que contenha: caligrafia legível ou datilografada ou digitada ou por meio eletrônico, resumo da história clínica, possíveis diagnósticos, tratamento realizado, evolução e motivo do encaminhamento, linguagem clara, evitando códigos ou abreviaturas, nome legível do profissional e seu número de registro no conselho profissional, assinado e datado; identificação da unidade de saúde que recebeu a pessoa, assim como da unidade a qual ela está sendo encaminhada.
- IV. Em cada serviço de saúde, deverá constar, em local visível à população: nome do responsável pelo serviço, nomes dos profissionais, bem como seus respectivos contatos telefônicos atualizados; horário de trabalho de cada membro da equipe, inclusive do responsável pelo serviço; ações e procedimentos disponíveis.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02 – Sobre a ambiência, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Apresenta-se como um dispositivo que potencializa e facilita a capacidade de ação e de reflexão das pessoas envolvidas nos processos de trabalho, possibilitando a produção de subjetividades protagonistas e corresponsáveis no processo de saúde.
- II. Propõe uma ampliação do olhar sobre a produção do espaço físico na saúde e possibilita afirmar que diferentes fatores atuam e interferem na composição de territórios de encontros no Sistema Único de Saúde (SUS), entre eles: modelos de atenção e gestão, processos de trabalho e relações de poder.
- III. Existem parâmetros que podem ser observados e que qualificam os ambientes tanto no seu desempenho térmico, acústico e de iluminação quanto nas sensações que suas formas, cores, texturas e odores provocam nas pessoas que por ali passam ou trabalham.
- IV. Pode ser utilizada como uma ferramenta facilitadora que propicia processos de mudança; e como instrumento de construção do espaço desejado pelos profissionais de saúde e pelos usuários, com garantia de biossegurança, relativa à infecção hospitalar, e de prevenção de acidentes biológicos, que se constitua em um ambiente que vai além da arquitetura normativa e projetada exclusivamente para comportar alta tecnologia.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 03 – Acerca dos desafios e eventuais potencialidades da Atenção Básica à Saúde na consolidação dos sistemas universais, analise as seguintes assertivas:

- I. Superar a hegemonia do modelo biomédico exige a priorização da saúde como um direito, e não como um produto à venda no mercado, o que está diretamente relacionado à superação da política econômica neoliberal.
- II. A expansão da Estratégia de Saúde da Família está associada, de modo inconsistente, à redução nas mortalidades pós-neonatal e infantil, assim como à diminuição do baixo peso ao nascimento, ao aumento da cobertura dos cuidados pré-natais e a excelentes índices de cobertura vacinal na maioria dos municípios e, ainda, à sensível redução das hospitalizações devidas à diabetes ou a acidentes cerebrovasculares.
- III. Além da formação e dos processos de educação permanente dos profissionais, outras questões, como a distribuição e a organização estrutural das unidades e serviços de saúde no país, a lógica de contratação de prestadores e profissionais e o financiamento, influenciam na capacidade de transformação do sistema.
- IV. O modelo de intervenção na saúde, representado pela medicalização e crescente dependência de tecnologias, poderá dar conta dos desafios emergentes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Considerando a Portaria GM/MS nº 635/2023, que institui, define e cria o incentivo financeiro federal para implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipes Multiprofissionais (eMulti) na Atenção Primária à Saúde (APS), analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Integrar práticas de assistência, prevenção, promoção da saúde, vigilância e formação em saúde na APS são algumas das diretrizes e objetivos do processo de trabalho das eMulti.
- () A participação de um profissional em mais de uma equipe configura duplicidade profissional.
- () Entende-se por eMulti as equipes compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento que atuam de maneira complementar e integrada às demais equipes da APS, com atuação corresponsável pela população e pelo território, em articulação intersetorial e com a Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- () As eMulti são classificadas em duas modalidades de acordo com a carga horária da equipe, vinculação e composição profissional.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – V.
- B) V – F – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – V – V.

QUESTÃO 05 – O debate acerca da qualificação da força de trabalho em saúde aponta como um desafio necessário o alinhamento dos processos de formação, no sentido de fortalecer o trabalho colaborativo nos diferentes cenários do SUS. Nesse sentido, Costa (2017) defende uma reorientação do modelo de formação dos profissionais da saúde. Sobre esse modelo, analise as características abaixo:

- Processo de aprendizagem compartilhado.
- Desenvolvimento de profissionais mais colaborativos.
- Processo de aprendizagem interativo.
- Desenvolvimento de competências específicas ou complementares, comuns e colaborativas.

As características acima definem um processo formativo fundamentado em uma educação:

- A) Dialógica.
- B) Continuada.
- C) Permanente.
- D) Interprofissional.

QUESTÃO 06 – Campos (2018) realiza uma análise sobre os fenômenos relevantes na constituição e funcionamento do SUS. Nesse sentido, propõe-se a apresentar tendências que favorecem ou dificultam a sustentabilidade do SUS. Considerando as possíveis estratégias em defesa do SUS, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Estimular a implementação de cargos de livre provimento ou de confiança, a fim de qualificar a gestão do SUS.
- () Elaborar estratégias que permitam aos trabalhadores do SUS o reconhecimento como tal, independentemente do cenário de atuação, pode colaborar no fortalecimento da identidade do SUS.
- () No intuito de preservar e ampliar o modelo de atenção que vem sendo construído no SUS, propõe-se a reorganização de hospitais e ambulatorios segundo diretrizes já experimentadas na APS, tais como: equipes interprofissionais, valorização do vínculo e cuidado continuado.
- () Implementar Regiões de Saúde com capacidade de planejamento, contratualização e gestão.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F.
- B) F – V – V – V.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.

QUESTÃO 07 – Considerando a análise da situação de saúde da população brasileira apresentada por Barreto (2013) e consequentes esboços para um Cenário das Condições de Saúde da População Brasileira 2022/2030, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando a situação de algumas Doenças Infecciosas (DIs) no Brasil e suas tendências às suas respectivas ocorrências nas duas últimas décadas.

Coluna 1

1. Doenças transmissíveis com tendência declinante.
2. Doenças transmissíveis com quadro de persistência.
3. Doenças transmissíveis em que não há sucesso no controle.

Coluna 2

- () Hepatites virais e esquistossomose.
- () Dengue.
- () Difteria e febre tifoide.
- () Coqueluche, tétano acidental e doença de Chagas por transmissão vetorial e transfusional.
- () Leishmanioses, hanseníase e tuberculose.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
- B) 1 – 2 – 3 – 3 – 1.
- C) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
- D) 2 – 1 – 3 – 2 – 2.

QUESTÃO 08 – A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. A PNH é norteadas pelas seguintes diretrizes, EXCETO:

- A) Interprofissionalidade.
- B) Acolhimento.
- C) Clínica ampliada e compartilhada.
- D) Gestão participativa e cogestão.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao processo de territorialização, de acordo com o documento elaborado por Colussi e Pereira (2016).

- A) O processo de territorialização requer planejamento prévio para estabelecer o que se deseja saber e como será a melhor maneira de obter essas informações.
- B) Mapa inteligente é a ferramenta que ilustra as áreas e microáreas de atuação das equipes, com riqueza de detalhes, permitindo a visualização das características e a identificação espacial dos problemas existentes no território.
- C) É importante definir quais dados serão coletados, quem os coletará, como os coletarão e o prazo para que essa coleta seja realizada com todos os membros da equipe. Deve-se considerar também a definição das responsabilidades de cada membro da equipe em cada uma das fases do processo.
- D) As principais fontes de dados secundários que podem ser utilizadas são: prontuário dos pacientes, banco de dados do DATASUS, banco de dados do IBGE e entrevistas com informantes-chave, entre outros.

QUESTÃO 10 – Considerando a Portaria nº 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, analise as afirmações abaixo:

- 1. As ações e serviços ofertados pela Atenção Básica deverão seguir padrões essenciais, cujas ações e procedimentos são considerados estratégicos para avançar e alcançar condições elevadas de acesso e qualidade na Atenção Básica.
- 2. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem como uma de suas atribuições participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados.
- 3. O teto máximo de equipes de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF), com ou sem os profissionais de saúde bucal, pelas quais o Município e o Distrito Federal poderão fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos, deverá ser calculado a partir da razão população/3500.
- 4. Considera-se relevante para o funcionamento das equipes de Consultório na Rua (eCR) que suas atividades sejam realizadas de forma itinerante, com horário flexível, adequado às demandas das pessoas em situação de rua.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

- A) 04.
- B) 06.
- C) 07.
- D) 10.

QUESTÃO 11 – Considerando a Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, assinale a alternativa correta.

- A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são instâncias consultivas de gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS.
- B) Os níveis de saúde da população estão dissociados da organização social e econômica do país.
- C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o SUS.
- D) É indispensável ao SUS a participação da iniciativa privada.

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que apresenta um dos resultados mais expressivos do Movimento Sanitário Brasileiro.

- A) Criação do Ministério da Saúde.
- B) Realização da VIII Conferência Nacional de Saúde.
- C) Criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
- D) Elaboração das Normas Operacionais Básicas do SUS (NOB/SUS).

QUESTÃO 13 – Em relação aos instrumentos de planejamento do financiamento em saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O Plano de Saúde é elaborado a cada 4 anos, durante o exercício do primeiro ano da gestão em curso, e sua execução é realizada a partir do segundo ano da gestão em curso até o primeiro ano da gestão subsequente.
- () O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser encaminhado ao Legislativo a cada 4 anos, conforme prazos previstos na legislação vigente.
- () A Programação de Saúde é elaborada durante um ano para ser executada no ano subsequente.
- () O Relatório de Gestão é elaborado quadrimestralmente, com envio da resolução de aprovação do relatório de gestão municipal pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) à Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – F.
- B) V – F – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – F – V.

QUESTÃO 14 – Em relação à diferença entre os sistemas de saúde fragmentados e os sistemas que têm como base as Redes de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.

- A) A forma de organização do sistema fragmentado é a poliarquia.
- B) O foco dos sistemas que têm como base as RAS são apenas as condições agudas por meio de unidades de pronto-atendimento.
- C) No sistema fragmentado, a coordenação do cuidado é realizada pela Atenção Primária à Saúde (APS).
- D) Os sistemas que têm como base as RAS são voltados para uma população adscrita sob sua responsabilidade.

QUESTÃO 15 – Em relação aos Conselhos de Saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () São características do Conselho de Saúde: ser um órgão colegiado (composto por pessoas que representam diferentes grupos da sociedade), permanente (tem sua existência garantida em qualquer circunstância) e consultivo (encaminha ações que devem ser avaliadas pelo Poder Público).
- () O Conselho de Saúde é subordinado ao Poder Executivo.
- () A composição do Conselho de Saúde atende a dois critérios: o da representatividade e o da paridade, sendo que, neste último, 50% representam os usuários dos serviços de saúde, 25% representam o Governo/prestadores de serviço de saúde e 25% representam profissionais de saúde.
- () Para assegurar a independência entre os poderes, os conselheiros não devem pertencer aos Poderes Legislativo e Judiciário ou ao Ministério Público. Sendo assim, não devem integrar o Conselho de Saúde: vereadores, deputados, juízes, senadores, promotor público, promotor de justiça, etc.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – F – F – V.
- C) F – V – V – F.
- D) V – V – F – F.

QUESTÃO 16 – Para assegurar a resolutividade na rede de atenção, alguns fundamentos precisam ser considerados, entre eles, economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e disponibilidade de recursos. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os fundamentos citados aos seus respectivos conceitos.

Coluna 1

1. Economia de escala.
2. Qualidade.
3. Suficiência.
4. Acesso.
5. Disponibilidade de recursos.

Coluna 2

- () Quando escasso(s), seja(m) humano(s) ou físico(s), deve(m) ser concentrado(s), ao contrário do(s) menos escasso(s), que deve(m) ser desconcentrado(s).
- () Pode ser melhor compreendido(a) com o conceito de graus de excelência do cuidado, que pressupõe avanços e retrocessos em seis dimensões: segurança, efetividade, centralidade na pessoa, pontualidade e equidade.
- () Ausência de barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, socioculturais, étnicas e de gênero no cuidado. Pode ser analisado(a) através da disponibilidade, comodidade e aceitabilidade do serviço pelos usuários.
- () Conjunto de ações e serviços disponíveis em quantidade e qualidade para atender às necessidades de saúde da população, que inclui cuidados primários, secundários, terciários, de reabilitação, preventivos e paliativos, realizados com qualidade.
- () Ocorre quando os custos médios de longo prazo diminuem, à medida que aumenta o volume das atividades, e os custos fixos se distribuem por um maior número de atividades, sendo o longo prazo um período de tempo suficiente para que todos os insumos sejam variáveis.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
- B) 3 – 2 – 5 – 4 – 1.
- C) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.
- D) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.

QUESTÃO 17 – Em relação à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), analise as assertivas abaixo:

- I. Tem por objetivo geral promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.
- II. Um dos valores elencados pela Política é a felicidade, enquanto autopercepção de satisfação, construída nas relações entre sujeitos e coletivos, que contribui para a capacidade de decidir como aproveitar a vida e como se tornar ator partícipe na construção de projetos e intervenções comuns. Isso ajuda a superar dificuldades individuais e coletivas a partir do reconhecimento de potencialidades.
- III. Um dos seus princípios é a intersetorialidade, que diz respeito ao exercício permanente da desfragmentação das ações e serviços ofertados por um setor, visando à construção e à articulação de redes cooperativas e resolutivas.
- IV. Entre seus objetivos específicos, estão: favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade e o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável; e apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis, favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem viver.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18 – “Caracteriza-se como uma estratégia político-pedagógica que toma como objeto os problemas e necessidades emanadas do processo de trabalho em saúde e incorpora o ensino, a atenção à saúde, a gestão do sistema e a participação e controle social no cotidiano do trabalho com vistas à produção de mudanças neste contexto. Objetiva, assim, a qualificação e aperfeiçoamento do processo de trabalho em vários níveis do sistema, orientando-se para a melhoria do acesso, qualidade e humanização na prestação de serviços e para o fortalecimento dos processos de gestão político-institucional do SUS, no âmbito federal, estadual e municipal” (Ministério da Saúde, 2018). O trecho descreve o conceito de:

- A) Educação continuada em saúde.
- B) Capacitação em saúde.
- C) Educação permanente em saúde.
- D) Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde).

QUESTÃO 19 – A bioética (“ética da vida”) é a ciência “que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis, denunciar os riscos das possíveis aplicações [...]” (Junqueira, 2012). Em relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São princípios da bioética: beneficência/não maleficência, autonomia e justiça.
- B) São fundamentos da bioética: a pessoa humana e o valor da vida humana.
- C) São considerados desafios bioéticos no cotidiano da atenção à saúde: a postura profissional nas relações; humanizar e acolher; esclarecimento; privacidade e sigilo; prontuário; interferência na adoção (ou não) de estilos de vida saudáveis; e satisfação do usuário.
- D) Algumas modalidades exercem grande influência na reflexão ética atualmente, entre elas o individualismo, o hedonismo e o utilitarismo, sendo esta última relacionada à reivindicação da liberdade, expressa na garantia incondicional dos espaços individuais.

QUESTÃO 20 – Em termos conceituais, _____ é definido(a) como um conjunto de elementos conectados ou todo organizado; _____, como um valor quantitativo referente a um fato ou circunstância; e _____, como conhecimento obtido a partir dos dados.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) sistema – dado – informação
- B) informação – dado – sistema
- C) dado – informação – sistema
- D) sistema – informação – dado

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Quais ossos serão comprometidos/fraturados em um trauma com fratura lateral da órbita?

- A) Frontal, maxila e lacrimal.
- B) Maxila, zigomático e esferoide.
- C) Zigomático, frontal e esferoide.
- D) Maxila, esferoide e lacrimal.

QUESTÃO 22 – Considerando o volume anestésico de um tubete e supondo que se utilizaria um tubete de articaína 4% com 1:200.000 de adrenalina, quantos microgramas de vasoconstritor serão injetados no paciente?

- A) 09.
- B) 10.
- C) 18.
- D) 36.

QUESTÃO 23 – Qual dos músculos abaixo é classificado como supra-hióideo?

- A) Mílo-hióideo.
- B) Tireo-hióideo.
- C) Esterno-hióideo.
- D) Omo-hióideo.

QUESTÃO 24 – Os ramos mandibular e maxilar do nervo trigêmeo saem da cavidade craniana por quais ossos, respectivamente?

- A) Mandíbula e etmoide.
- B) Esferoide e esferoide.
- C) Etmoide e maxila.
- D) Esferoide e maxila.

QUESTÃO 25 – Na técnica da artrocentese, preconizada por Nitzan, para lavagem da articulação temporomandibular, como referência para atingir o compartimento superior, traça-se uma linha da porção média do trago da orelha até o canto lateral do olho, e a primeira agulha é inserida a uma distância de ____ mm do trago e ____ mm abaixo da linha canto-tragal.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 10 – 2
- B) 20 – 2
- C) 20 – 10
- D) 10 – 20

QUESTÃO 26 – A síndrome de Frey é uma condição caracterizada por sudorese e rubor facial na região lateral e pré-auricular da face, resultantes da estimulação gustativa, principalmente durante a mastigação. Também é chamada de síndrome da sudorese gustativa e pode acometer alguns pacientes após intervenções na articulação temporomandibular (ATM). Essa condição é resultante da lesão a qual nervo?

- A) Facial.
- B) Massetérico.
- C) Alveolar inferior.
- D) Auriculotemporal.

QUESTÃO 27 – Sobre a prevenção e o tratamento das emergências médicas em Odontologia, analise as assertivas abaixo:

- I. A prescrição de opioides em pacientes que fazem uso de anti-hipertensivos pode gerar episódios de hipotensão ou vertigem.
- II. O paciente hígido, sem doenças de base, mas com medo e ansiedade extrema, deve ser considerado como um paciente ASA 2.
- III. A hiperventilação é definida como ventilação em excesso, seja por aumento na frequência ou na profundidade das respirações. Nesses casos, o paciente pode ser orientado a respirar seu próprio ar exalado, envolvendo a boca e o nariz com as mãos para correção da alcalose respiratória.
- IV. Na *angina pectoris*, uma dor espasmódica, em aperto, associada a uma sensação sufocante, é a manifestação clínica mais básica nos pacientes. O uso de corticoide sublingual ou injetável elimina a isquemia miocárdica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 28 – Nos pacientes com luxações habituais ou redicivantes da ATM, quando o tratamento cirúrgico for indicado, qual dos tratamentos abaixo é o mais indicado?

- A) Artroscopia nível II.
- B) Discopexia.
- C) Condilectomia.
- D) Eminectomia.

QUESTÃO 29 – Em relação à cirurgia dos terceiros molares e à sua classificação em relação à angulação de Pell e Gregory, analise as assertivas abaixo:

- I. Os terceiros molares superiores com inclinação distoangulada são os mais difíceis de serem removidos.
- II. Terceiro molar inferior, classe III-C, com impacção óssea completa indica uma extração dentária difícil.
- III. Os terceiros molares inferiores, distoangulados, têm uma extração mais difícil quando comparados aos mesioangulados.
- IV. A classificação horizontal, classe I-A, indica uma retenção complexa e cirurgia com ampla ostectomia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.

QUESTÃO 30 – Em relação aos retalhos cirúrgicos nas cirurgias dentoalveolares, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A base do retalho cirúrgico deverá ser sempre mais ampla do que seu ápice para manutenção do suprimento sanguíneo.
- B) O retalho em L consiste em uma incisão em envelope associada a uma incisão vertical relaxante e deve abranger no mínimo um dente para anterior e um dente para posterior à área a ser operada.
- C) Ao fazer incisões, deve-se imprimir um corte firme e contínuo. Cortes superficiais, delicados e repetidos aumentam a lesão tecidual e a quantidade de sangramento da ferida. Incisões longas e contínuas são preferíveis às curtas e com interrupções.
- D) A incisão semilunar visa ao acesso à região apical dos dentes. Essa incisão contorna as papilas dentárias, formando uma parábola, e oferece acesso limitado à raiz dentária. É utilizada em dentes com raízes longas.

QUESTÃO 31 – Sobre a realização e a indicação da odontossíntese tipo IVY, assinale a alternativa correta.

- A) Estende-se do primeiro molar inferior ao primeiro molar inferior contralateral.
- B) Pode ser indicada na fratura mandibular favorável ao tratamento.
- C) Pode ser indicada na fratura da maxila com grande deslocamento.
- D) É realizada entre dentes de uma mesma arcada.

QUESTÃO 32 – Em relação aos traumatismos alveolodentários e dos tecidos de sustentação dos dentes permanentes, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A luxação lateral consiste no deslocamento do dente em qualquer direção lateral, geralmente associada a uma compressão da parede alveolar.
- () Nas luxações extrusivas, o dente deve ser imediatamente reposicionado no alvéolo, e uma contenção flexível deve ser realizada por duas semanas quando não há fratura óssea associada.
- () No tratamento da luxação intrusiva em dentes com ápice fechado, quando a escolha for pelo reposicionamento cirúrgico, a contenção deverá permanecer por 4 semanas, e possivelmente o tratamento endodôntico deverá ser iniciado após duas semanas.
- () Nas avulsões dentárias, a antibioticoterapia está indicada, e a medicação de escolha para os pacientes adultos com formação dentária concluída pode ser a tetraciclina.
- () O leite e o soro fisiológico podem prolongar a viabilidade do ligamento periodontal por até 10 horas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – F – F.
- B) V – F – V – F – V.
- C) V – V – V – V – F.
- D) F – F – F – V – V.

QUESTÃO 33 – Doença hereditária que resulta de uma deficiência enzimática, o que provoca o acúmulo de glicosaminoglicano dermatan sulfato em todos os tecidos. Uma das características clínicas que chama a atenção do cirurgião bucomaxilofacial é ela estar associada ao aparecimento de cistos dentígeros bilaterais ou múltiplos nos maxilares. Além disso, esses indivíduos podem apresentar: problemas de nariz, garganta, peito e ouvido; dificuldades para respirar; anormalidades cardíacas; macrocefalia; alterações da face; e aumento do tamanho da língua. A condição descrita representa a síndrome de:

- A) Gardner.
- B) Gorlin-Goltz.
- C) Maroteaux-Lamy.
- D) Crouzon.

QUESTÃO 34 – Durante uma osteotomia sagital da mandíbula, uma lesão grave, com rompimento do nervo alveolar, pode acontecer caso não seja realizada uma técnica correta e cuidadosa. A lesão nervosa com seccionamento total do nervo é chamada de:

- A) Neurotmeze.
- B) Neuropraxia.
- C) Axonotmeze.
- D) Dilaceração.

QUESTÃO 35 – Sobre as cirurgias ortognáticas, analise as assertivas abaixo:

- I. A ortognática minimamente invasiva (OMI) preconiza pequena incisão, menor descolamento, cuidado com os tecidos moles, afastamento e instrumentais delicados e sistematização da técnica operatória.
- II. A osteotomia Le Fort I da maxila e sua segmentação em três segmentos é frequentemente utilizada nas discrepâncias anteroposteriores e transversas da face, sem risco de necrose da maxila por perda da vascularização.
- III. Nos pacientes com face curta, ou seja, com discrepâncias verticais, há uma redução do terço inferior da face, e eles apresentam pouca exposição dos incisivos superiores em repouso.
- IV. A utilização da navegação cirúrgica nas técnicas de ortognática minimamente invasiva promovem um menor trauma cirúrgico e uma menor perda sanguínea; no entanto, há um aumento do custo e do tempo cirúrgico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 36 – Considerando os fios de sutura utilizados em Odontologia, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada fio às suas características.

Coluna 1

- 1. Fio de seda.
- 2. Fio de polipropileno.
- 3. Fio de CatGut.
- 4. Fio de poliglactina.
- 5. Fio de poliglecaprone.

Coluna 2

- () Fio de origem sintética, não absorvível, monofilamentar, com excelente manutenção da força tênsil.
- () Fio absorvível, sintético, multifilamentar, trançado e bem estirado.
- () Fio de origem animal, absorvível, composto por colágeno, derivado da serosa do intestino de animais. Pode perder 50% da sua força tênsil após 24 horas.
- () Fio de sutura de origem sintética, absorvível, monofilamentar, que apresenta boa flexibilidade e fácil manuseio.
- () Fio de origem animal, não absorvível, multifilamentar, retorcido, trançado e confortável.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 2 – 4 – 3 – 5 – 1.
- C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- D) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.

QUESTÃO 37 – São considerados cistos e tumores odontogênicos benignos, EXCETO:

- A) Displasia fibrosa.
- B) Cisto primordial.
- C) Ameloblastoma.
- D) Mixoma.

QUESTÃO 38 – Em relação às características clínicas das síndromes com reflexos no crânio, na face e na cavidade oral, analise o trecho abaixo:

Classicamente o occipital é plano, e a fronte tem uma aparência alta. A proptose ocular é um achado característico, associado com hipertelorismo. O terço médio da face é hipoplásico, com um prognatismo relativo da mandíbula. Sempre é observada a união do segundo, terceiro e quarto dedos das mãos e dos pés. Na boca, os lábios têm forma trapezoidal quando relaxados, e fenda no palato mole ou úvula bífida podem estar presentes. A hipoplasia maxilar produz um arco em forma de V e apinhamento dos dentes.

A descrição apresentada se refere à síndrome de:

- A) Crouzon (disostose craniofacial).
- B) Eagle (estiloioide).
- C) Apert (acrocefalossíndactilia).
- D) Treacher-Collins (disostose mandibulofacial).

QUESTÃO 39 – Em relação à anatomia da face, analise as assertivas abaixo:

- I. O sangramento pulsátil de uma artéria no fundo de um alvéolo mandibular recebe o fluxo sanguíneo em sua origem da artéria maxilar.
- II. A órbita é composta por sete ossos.
- III. A ossificação da mandíbula e do corpo do esfenóide é totalmente do tipo endocondral.
- IV. A fratura da lâmina crivosa do etmoide, em uma fratura Le Fort III, pode gerar anosmia no paciente.
- V. As fraturas do tipo Le Fort I, II e III são conhecidas, respectivamente, como maxilar transversa, fratura piramidal e disjunção craniofacial.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, III e V.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas I, II, IV e V.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 40 – Em relação às infecções odontogênicas, analise as assertivas abaixo:

- I. A flora bacteriana nas celulites faciais é mista (aeróbia e anaeróbia).
- II. A infecção odontogênica pode ser considerada como exógena, biologicamente dinâmica, polimicrobiana e mista.
- III. Os principais micro-organismos envolvidos nas infecções odontogênicas são os *Streptococcus milleri*, *Peptostreptococcus*, *Prevotella*, *Porphyromonas* e *Fusobacterium*.
- IV. O espaço submandibular frequentemente é atingido por infecções advindas do terceiro e segundo molar inferior.
- V. A cefalotina é um antibiótico de primeira escolha nas infecções periapicais para pacientes alérgicos à penicilina.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e V.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas II, III e V.
- D) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 41 – Segundo a Portaria nº 2.436/2017, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de Atenção Básica.

- A) Atendimento domiciliar e hospitalização domiciliar realizada exclusivamente por equipes especializadas em pacientes críticos.
- B) Atendimento de urgência e emergência oferecido pelas UPAs ou hospitais.
- C) Conjunto de ações e serviços de saúde em unidade de saúde e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) pertencente a uma rede de atenção cujo atendimento é exclusivo para grupos de risco, como crianças e idosos.
- D) Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde.

QUESTÃO 42 – Qual é a importância do Projeto SB 2010 para a saúde bucal no Brasil?

- A) Introdução de novas tecnologias odontológicas para tratamento de idosos a partir de índices e documentos oficiais.
- B) Capacitação e formação de novos profissionais da equipe de saúde da família com experiência em realizar levantamentos epidemiológicos.
- C) Redução dos custos de tratamentos odontológicos baseado em evidências microbiológicas, físicas e temporais.
- D) Avaliação da saúde bucal da população brasileira e planejamento de políticas públicas de saúde bucal.

QUESTÃO 43 – A cárie é uma doença multifatorial. Entre seus fatores etiológicos, são agentes causadores de cárie dentária:

- I. Presença constante de biofilme maduro sob uma superfície dentária.
- II. Excesso de carbonato de cálcio na água de abastecimento.
- III. Consumo excessivo de sacarina.
- IV. Exposição inadequada ao flúor.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I e IV.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 44 – Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente metade das mortes por trauma é causada por lesões na região da cabeça e da face. As fraturas alvéolo-dentárias, quando não associadas a outras fraturas na face, podem ser tratadas pelo cirurgião-dentista. Em relação a traumas faciais, analise as assertivas abaixo:

- I. É importante observar presença de lesão na região do mento, principalmente em crianças, pois é sugestiva de fratura da cabeça da mandíbula.
- II. Os dentes devem ser acompanhados quanto à futura necessidade de tratamento endodôntico, permanecendo sob os cuidados do cirurgião bucomaxilofacial, exclusivamente.
- III. Dentes avulsionados podem ser mantidos em leite ou soro fisiológico e ser reimplantados em até algumas horas após o trauma, porém o maior percentual de sucesso será em reimplantes realizados precocemente após a avulsão.
- IV. Antes de reposicionar o dente no alvéolo, deve-se limpar a superfície dentária com gaze e álcool 70% e realizar a raspagem radicular vigorosa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.

QUESTÃO 45 – Qual é a abordagem recomendada para o manejo de urgências odontológicas na Atenção Básica?

- A) Encaminhamento imediato para hospitais.
- B) Uso imediato de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios no acolhimento quando o paciente referir sintomas de edema em evolução ou trauma.
- C) Aplicação de técnicas de relaxamento e aconselhamento psicológico para identificação dos sintomas objetivos.
- D) Realização de procedimentos de alívio da dor e controle de infecções, seguida de encaminhamento para tratamento definitivo.

QUESTÃO 46 – Segundo Silva *et al.* (2020), a prevalência de hipomineralização molar-incisivo é de 15% em crianças brasileiras. Frente a esse agravo, qual é o diagnóstico diferencial da hipomineralização molar-incisivo com outros defeitos de estrutura do esmalte dentário?

- A) Descoloração castanho-escuro dos dentes.
- B) Presença de cáries múltiplas.
- C) Manchas brancas ativas sem cavitação.
- D) Sensibilidade dentária exacerbada.

QUESTÃO 47 – Preconiza-se que uma medida preventiva seja capaz de seguir as prerrogativas do SUS, especialmente os princípios da equidade e universalidade. Considerando essa premissa, a OMS relata que a principal medida preventiva para a cárie dentária no âmbito coletivo, com o melhor custo-benefício, é o(a):

- A) Uso de selantes dentários.
- B) Educação em saúde bucal.
- C) Distribuição de escovas e pastas dentais.
- D) Fluoretação da água de abastecimento.

QUESTÃO 48 – “O território é base material da existência humana, e sua apropriação para as diversas formas de uso é condição necessária para que a vida seja possível” (Goldin; Molken, 2017). Este conceito permite descrever e entender os modos de vida e como pessoas e grupos se organizam e se relacionam dentro de um território. O profissional da Atenção Básica/Saúde da Família deve realizar a territorialização com o intuito de:

- A) Melhorar a gestão de recursos financeiros do território adscrito à sua unidade de saúde.
- B) Facilitar a construção de hospitais-escola próximos à unidade de saúde para a formação de recursos humanos capazes de responder às necessidades daquela população.
- C) Identificar e intervir nos determinantes sociais da saúde do território.
- D) Aumentar o número de profissionais de saúde conforme a solicitação da população.

QUESTÃO 49 – Atualmente, a fluorose dentária não é um problema grave de saúde pública na maioria das cidades do Brasil, pois, em áreas com água fluoretada, sua prevalência é de 30%. Segundo o SB Brasil 2010, em crianças de 12 anos, a prevalência de fluorose “moderada” foi identificada em 1,5% das crianças e a “grave” foi considerada nula. Partindo do pressuposto de que “o grau de alterações no processo de mineralização é função direta da dose de fluoreto a que a criança está sujeita (mg F/kg/dia) e o tempo de duração da dose” (Fejerskov *et al.*, 1994 *apud* Ministério da Saúde, 2018), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Após a infância, os dentes que seguirem a cronologia normal de desenvolvimento não serão mais acometidos por fluorose.
- B) Na fase adulta, não há mais risco de fluorose dentária mesmo que se utilize terapias com flúor com doses acima de 2000 ppm/dia.
- C) Todo indivíduo exposto a altas doses de flúor apresentará fluorose “moderada” em algum dente.
- D) Indivíduos que ingerirem flúor em altas doses poderão ter fluorose somente nos dentes que estiverem em fase de formação da coroa dentária no período dessa exposição.

QUESTÃO 50 – A 14ª Conferência Nacional de Saúde tinha como temática “Acesso e acolhimento com qualidade: um desafio para o SUS”, dada a importância desse tema para a melhoria do diagnóstico e tratamento dos usuários que buscam um serviço de saúde. Conforme o Ministério da Saúde, analise as assertivas abaixo sobre o acolhimento na Atenção Básica:

- I. Inclui somente a triagem e o atendimento odontológico de urgência.
- II. É realizado tanto pela recepção da unidade pelo atendente, porteiro ou segurança, bem como por toda a equipe de saúde, que pode identificar situações que apresentem maior risco ou que gerem sofrimento ao usuário/paciente.
- III. Abrange a recepção e a escuta qualificada das demandas da população, de forma a garantir um atendimento humanizado, resolutivo e que propicie a criação de vínculo entre as equipes e os usuários.
- IV. É uma tecnologia que visa determinar os fatores de risco social para o encaminhamento a serviços de média e alta complexidade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.

QUESTÃO 51 – Segundo Maltz *et al.* (2016), qual é a abordagem recomendada para o diagnóstico precoce de cáries em crianças?

- A) Exames clínicos e radiográficos anuais.
- B) Inspeção visual e tátil com sonda da OMS em casos de difícil diagnóstico e realização de consultas regulares ao cirurgião-dentista.
- C) Testes de saliva para detecção de bactérias cariogênicas.
- D) Exames clínicos a cada 6 meses com inspeção tátil com sonda exploradora em superfícies rugosas.

QUESTÃO 52 – A doença periodontal pode ser prevenida através de educação em saúde, profilaxia e instrução de higiene bucal, entre outros fatores modificadores. Porém, quando presente, à medida que avança, há sinais e sintomas que devem ser observados para definir o comprometimento do dente e do periodonto e a necessidade de encaminhamento ao CEO periodontia. São alguns dos critérios para o encaminhamento ao CEO:

- I. Profundidade de sondagem até 3 mm.
- II. Mobilidade dentária.
- III. Lesão de furca grau II.
- IV. Sensibilidade térmica nos dentes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, III e V.

QUESTÃO 53 – Wannmacher e Rösing (2023) relatam que, para pacientes diabéticos, hipertensos e com coronariopatas sob controle médico e medicamentoso, recomenda-se:

- A) Utilização de dose máxima de 6 tubetes de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100 para pacientes com aproximadamente 70 kg.
- B) Procedimentos odontológicos de no máximo 5 horas em pacientes tratados com insulina e bem controlados, que apresentam glicemia de jejum entre 70 mg/dl e 99 mg/dl e inferior a 140 mg/dl.
- C) Em pacientes diabéticos que necessitaram de colocação de prótese valvar com stents, não é necessária a profilaxia com antibiótico antes da realização de biópsia ou raspagem subgengival.
- D) Se estiverem com medo ou ansiedade, está indicada a prescrição de um ansiolítico, tal como Diazepam 5 mg, que pode ser ajustado em conjunto com o médico.

QUESTÃO 54 – A fase de erupção dos dentes decíduos muitas vezes interfere na dinâmica familiar e na irritabilidade e ingesta alimentar da criança, além de causar irritação gengival, aumento da salivação, discreto aumento da temperatura corporal, não caracterizado como febre, diarreia ou infecções. Essa é uma situação frequente de queixa nos consultórios odontológicos. Sobre os agentes prescritos para minimizar esses sinais e sintomas, segundo Paiva, Vieira-Andrade e Santos (2023 *apud* Wannmacher; Rösing, 2023), assinale a alternativa correta.

- A) Analgésicos tópicos, como géis de benzocaína ou salicilato de colina, estão contraindicados para alívio de sinais e sintomas locais da erupção, pois se associam a risco de toxicidade e de interferência no reflexo de vômito e subsequente engasgo.
- B) Camomilina® C é indicada para alívio de sintomas e desconfortos da erupção. Sua cápsula deve ser aberta e seu conteúdo aplicado diretamente sobre a gengiva, não devendo ser ingerido.
- C) Recomenda-se o emprego de mordedores gelados sob a supervisão de pais/cuidadores e massagem da região do(s) dente(s) em erupção durante 8 horas por dia até alívio completo dos sintomas. Indica-se a troca do mordedor para manter a superfície sempre gelada.
- D) Recomenda-se Nenê Dent® para reduzir desconfortos na erupção, pois esse medicamento tem ação anti-inflamatória e anestésica e é composto por lidocaína e polidocanol.

QUESTÃO 55 – O relatório de monitoramento clínico do HIV mostrou um aumento importante do número de pessoas diagnosticadas (de 69% para 84%), em tratamento (de 44% para 63%) e com carga viral suprimida (de 38% para 58%) entre 2012 e 2017 no Brasil. O cirurgião-dentista é um importante auxiliar no monitoramento e diagnóstico precoce das pessoas vivendo com HIV/AIDS, pois a infecção bucal por _____ representa um marcador da progressão da doença HIV/AIDS e é um preditivo para o aumento da imunossupressão. Entre as formas de infecção, a mais comumente encontrada na primo-infecção pelo HIV (fase aguda) é o(a) _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) *Candida ssp.* – candidíase pseudomembranosa
- B) herpes vírus tipo 8 – sarcoma de Kaposi
- C) vírus Epstein-Barr – leucoplasia pilosa
- D) citomegalovírus – eritema gengival linear

QUESTÃO 56 – Estratégia de tratamento com alta taxa de sucesso recomendada no manejo de pacientes com osteonecrose dos maxilares relacionada a medicamentos (metotrexato, bifosfonatos, imunoterapias) nos estágios 2 e 3. O trecho refere-se ao(à):

- A) Suspensão imediata e permanente do medicamento, sem retomada.
- B) Terapia antibiótica e fechamento da ferida operatória em primeira intenção, cobrindo adequadamente o osso exposto.
- C) Uso de antibióticos profiláticos.
- D) Terapia com oxigênio hiperbárico.

QUESTÃO 57 – Qual é a lesão bucal com potencial de malignização mais frequentemente associada ao tabagismo?

- A) Leucoplasia.
- B) Eritroplasia.
- C) Candidíase.
- D) Líquen plano.

QUESTÃO 58 – O carcinoma mucoepidermoide é o tumor maligno de glândula salivar mais frequentemente encontrado na cavidade bucal. Dor e paralisia facial usualmente estão associadas a tumores da parótida. A principal característica clínica do carcinoma mucoepidermoide de baixo grau de pequenas dimensões é:

- A) Crescimento rápido e doloroso.
- B) Ulceração extensa.
- C) Lesão nodular indolor de crescimento lento.
- D) Infiltração óssea.

QUESTÃO 59 – Sobre as técnicas radiográficas odontológicas, analise as assertivas abaixo:

- I. Das técnicas intraorais, a radiografia periapical com a técnica do paralelismo é a mais indicada para visualização de lesões periapicais, pois há menor chance de ampliação das estruturas na área de incidência, resultando em uma imagem mais fiel.
- II. A técnica de Clark é indicada somente quando o dente não está irrompido em maxila, pois a dissociação das imagens possibilita ter uma visão tridimensional das estruturas, definindo se o dente está mais para vestibular ou mais para palatina.
- III. O movimento do paciente é considerado a principal causa de artefatos em radiografias panorâmicas.
- IV. As principais vantagens da radiografia digital em comparação com a convencional são a redução da área irradiada e menor erro nos princípios e técnicas radiográficas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.

QUESTÃO 60 – Qual é o mecanismo patogênico primário da mucosite oral induzida por quimioterapia?

- A) Ação direta dos quimioterápicos sobre o epitélio oral.
- B) Reação inflamatória mediada por citocinas.
- C) Infecção secundária por *Candida albicans*.
- D) Lesão mecânica devido à mastigação.