

Sábado de tarde

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE FDT 2025

PROFISSÃO: ODONTOLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **60 QUESTÕES LEGÍVEIS**;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES REFERE-SE **À PROFISSÃO OU ÁREA** PARA A QUAL REALIZOU A INSCRIÇÃO;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 04 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.



Concursos

fundatec

ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

HUMANIZAÇÃO, SAÚDE COLETIVA; LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 01 – Considerando as reflexões apresentadas por Macedo e Medeiros (2025) acerca dos marcadores sociais da diferença, interseccionalidade e saúde coletiva, analise as assertivas abaixo sobre a interseccionalidade e assinale a alternativa correta.

- I. Não se limita ao acúmulo de identidades, mas funciona sobretudo como uma lente analítica que revela como estruturas sociais interagem e produzem efeitos políticos e legais.
 - II. Considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária estão inter-relacionadas e moldam-se mutuamente.
 - III. É uma forma de entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

QUESTÃO 02 – Considerando a divisão do território na Estratégia de Saúde da Família (ESF) a partir de três níveis de atuação, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Território-área.
- 2. Território-microárea.
- 3. Território moradia.

Coluna 2

- () Corresponde à área de atuação do ACS.
- () Espaço de menor agregação social, permite aprofundar o conhecimento para o desenvolvimento de ações de saúde.
- () Representa o espaço-população adstrita.
- () Espaço onde se estabelece vínculo com uma unidade de saúde, permitindo melhor relação e fluxo população-serviços.
- () Subdivisão do território-área.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
- B) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
- C) 2 – 1 – 3 – 3 – 3.
- D) 1 – 3 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 03 – Considerando a organização das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no SUS, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma rede oficialmente estabelecida atualmente.

- A) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).
- B) Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
- C) Rede de Atenção à População Geral.
- D) Rede Alyne.

QUESTÃO 04 – Nos termos do artigo 200 da Constituição Federal de 1988, além de outras atribuições, ao Sistema Único de Saúde compete, EXCETO:

- A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- B) Formular políticas e executar ações de saneamento básico.
- C) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- D) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 05 – Sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde de que trata a Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção.
- () Toda pessoa tem a obrigação de participar dos conselhos e conferências de saúde.
- () Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.
- () Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V.
- B) F – V – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) V – F – V – V.

QUESTÃO 06 – A telessaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes. São princípios da telessaúde:

- I. Autonomia do profissional de saúde.
- II. Consentimento livre e informado do paciente.
- III. Dignidade e valorização do profissional de saúde.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Diversos indicadores englobam fatores determinantes da saúde e, por isso, devem ser considerados no planejamento, monitoramento e avaliação da situação de saúde. Informações relacionadas à escolaridade, renda e condições de moradia estão associadas a qual indicador?

- A) Saúde ambiental.
- B) Demográfico.
- C) Socioeconômico.
- D) Nutrição, crescimento e desenvolvimento.

QUESTÃO 08 – Conforme Carvalho, Pinho e Garcia (2017) sobre os conceitos e aplicações dos indicadores de mortalidade, taxas elevadas de mortalidade _____ podem refletir condições de baixo desenvolvimento socioeconômico, precária infraestrutura ambiental, bem como acesso e qualidade de recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Nesse contexto, a mortalidade _____ estima o risco de um nascido vivo morrer até os 27 dias de vida; a taxa de mortalidade _____ estima o risco de um nascido vivo morrer dos 28 aos 364 dias de vida; e a mortalidade _____ refere-se ao número de óbitos ocorridos no período compreendido entre 22 semanas completas de gestação e 7 dias completos após o nascimento por mil nascimentos totais na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) infantil – neonatal – pós-neonatal – perinatal
- B) infantil – perinatal – pós-neonatal – neonatal
- C) pós-neonatal – neonatal – infantil – neonatal
- D) neonatal – pós-neonatal – infantil – perinatal

QUESTÃO 09 – Considerando o acolhimento da demanda espontânea na Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A equipe deve atender todas as pessoas que chegarem na UBS, conforme sua necessidade, e não apenas determinados grupos populacionais ou agravos mais prevalentes e/ou fragmentados por ciclo de vida.
- B) A coexistência de agendas programadas e de demanda espontânea não amplia o acesso aos serviços de saúde.
- C) A implantação do acolhimento pode provocar mudanças no modo de organização das equipes, relação entre trabalhadores e modo de cuidar.
- D) Organizar a partir do acolhimento exige que a equipe reflita sobre o conjunto de ofertas que ela tem apresentado para lidar com as necessidades de saúde da população e do território.

QUESTÃO 10 – Considerando o debate apresentado por Costa (2017) acerca da Educação Interprofissional em Saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A educação interprofissional em saúde define-se a partir de um processo de aprendizagem com, para e sobre outras profissões.
- () A finalidade da Educação Interprofissional em Saúde é formar profissionais colaborativos e integrados, rompendo com a formação uniprofissional tradicional.
- () A colaboração se sustenta em quatro pilares: compartilhamento, parceria, interdependência e poder.
- () Os termos multidisciplinar e interprofissional podem ser usados como sinônimos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F.
- B) V – V – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – V.

QUESTÃO 11 – O SUS será _____ com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, também de outras fontes. A Lei ainda presume que a aplicação de _____ mínimos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios no setor de saúde será feita de forma progressiva, de acordo com critérios definidos em lei complementar, possibilitando a progressividade dos investimentos.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) regulado – padrões
- B) regulado – serviços
- C) financiado – serviços
- D) financiado – recursos

QUESTÃO 12 – De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde efetua-se preferencialmente por meio da:

- A) Autonomia da escolha dos usuários entre os estabelecimentos da rede privada.
- B) Porta de entrada do SUS, definida pela Atenção Primária à Saúde.
- C) Porta de entrada principal do SUS, representada pelos serviços hospitalares de alta complexidade.
- D) Atenção domiciliar e serviços de pronto atendimento.

QUESTÃO 13 – As Políticas Públicas de Saúde são instrumentos fundamentais para garantir o direito à saúde, previsto constitucionalmente. No Brasil, o SUS representa uma das maiores redes de saúde pública do mundo, sustentada por princípios como a universalidade, integralidade e equidade (Albuquerque, 2005). Sobre o processo histórico da construção do SUS no Brasil, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A Reforma Sanitária brasileira teve como um de seus principais marcos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986 e defendeu a saúde como direito de cidadania e dever do Estado.
- () O SUS foi oficialmente instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado posteriormente pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1991.
- () Antes da criação do SUS, o sistema de saúde brasileiro era universal, com acesso garantido a toda a população por meio do INAMPS.
- () As Ações Integradas de Saúde (AIS) representaram uma tentativa de municipalização da saúde antes da Constituição de 1988.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – V.
- B) V – F – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) F – F – V – F.

QUESTÃO 14 – Em relação à organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) conforme o Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas abaixo:

- I. A RAS é composta unicamente por serviços da Atenção Primária à Saúde.
- II. A atenção às urgências e emergências é considerada componente da RAS.
- III. A coordenação do cuidado e o acesso regulado são princípios da RAS.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 15 – Em relação aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), analise as assertivas abaixo:

- I. A PNH defende a ampliação da autonomia dos sujeitos, o protagonismo e a corresponsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários.
- II. De acordo com a Política, a humanização restringe-se ao bom atendimento, com foco na cordialidade no trato com os usuários.
- III. Uma das diretrizes da PNH é a valorização do trabalho e do trabalhador da saúde.
- IV. A PNH propõe a indissociabilidade entre atenção e gestão dos serviços.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16 – A PNH tem como propósito a transversalização nas práticas de saúde por meio do reconhecimento dos sujeitos envolvidos no processo de cuidado. Nesse contexto, um dos dispositivos utilizados na transversalização da PNH é o(a):

- A) Acolhimento com classificação de risco e sistema de ausculta qualificada.
- B) Centralização do cuidado nas ações médicas e hospitalares.
- C) Hierarquização rígida dos processos decisórios nas instituições de saúde.
- D) Fortalecimento das relações verticalizadas entre gestores e usuários.

QUESTÃO 17 – Considerando os mecanismos para a ordenação da Rede de Atenção à Saúde no SUS instituídos pelo Decreto nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta em relação aos Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde (COAPs).

- A) Sua celebração é facultativa e não interfere na pactuação das responsabilidades dos entes federativos.
- B) Definem as responsabilidades sanitárias, metas, indicadores e formas de monitoramento e avaliação entre os entes da federação.
- C) Substituem os instrumentos de planejamento como o Plano de Saúde e a Programação Anual de Saúde.
- D) Definem somente as responsabilidades sanitárias e formas de monitoramento e avaliação entre os entes dos Estados.

QUESTÃO 18 – Sobre os princípios e diretrizes do SUS na sua interface e relação com as Políticas Públicas de Saúde e na implementação destas, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A equidade como princípio do SUS denota tratar igualmente todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades específicas.
- () A descentralização com comando único é uma diretriz do SUS que garante maior autonomia a estados e municípios na gestão da saúde.
- () A contribuição da comunidade na formulação e controle das políticas de saúde é garantida por meio dos conselhos e conferências de saúde.
- () A integralidade implica que o usuário deve ter acesso a todos os níveis de atenção, desde a promoção até o cuidado de alta complexidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V.
- B) F – V – F – V.
- C) V – V – V – F.
- D) V – F – V – F.

QUESTÃO 19 – As equipes eMulti são formadas por profissionais de saúde de várias áreas, que trabalham juntos de forma complementar e integrada com as demais equipes da Atenção Primária à Saúde. Sobre as equipes eMulti, assinale a alternativa correta.

- A) Devem ser compostas somente por profissionais nutricionistas e fisioterapeutas, respeitando as necessidades locais e a composição mínima estabelecida.
- B) Devem ser compostas somente por profissionais fisioterapeutas e assistentes sociais, mantendo uma composição fixa em todo o território nacional.
- C) Podem ser compostas por profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros, respeitando as necessidades locais e a composição mínima estabelecida.
- D) Podem ser compostas por profissionais como nutricionistas, assistentes sociais, entre outros, mantendo uma composição fixa em todo o território nacional, independentemente de necessidades locais.

QUESTÃO 20 – Considerando o documento “Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?” (Ministério da Saúde, 2018), relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada elemento ou princípio da PNEPS às suas respectivas características.

Coluna 1

1. Educação Permanente em Saúde (EPS).
2. Planejamento ascendente.
3. Integração ensino-serviço.
4. Cogestão dos processos de trabalho.

Coluna 2

- () Presume a escuta de trabalhadores e de usuários na definição de prioridades formativas.
- () Apoia-se na problematização das práticas e faltas reais dos serviços de saúde.
- () Busca articular instituições formadoras e os serviços de saúde na construção dos saberes.
- () Valoriza a construção coletiva e participativa dos processos de gestão e educação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3 – 4.
- B) 4 – 2 – 3 – 1.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 3 – 2 – 1 – 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Em relação ao atendimento do paciente traumatizado de face, analise as assertivas abaixo:

- I. Nos traumas craniofaciais, a avaliação da região bucomaxilofacial deve ser adiada até que se tenha completado rigorosa estabilização sistêmica do paciente. Esse momento é chamado de avaliação secundária.
- II. As lacerações dos tecidos moles caracterizam-se por apresentar perda das camadas epitelial e papilar da pele, deixando uma ferida superficial e sangrante, muito dolorosa, em razão da exposição das terminações nervosas.
- III. Na inspeção clínica do paciente, equimoses atrás da orelha ou sinal de *Battle* sugerem fratura do complexo zigomático e arco zigomático.
- IV. As fraturas de mandíbula podem ser denominadas em favoráveis ou desfavoráveis, dependendo do traço de fratura e da força de tração muscular da região. Nas fraturas desfavoráveis, a tração muscular resultará em um deslocamento dos segmentos fraturados.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 22 – No acesso cirúrgico pré-auricular para a articulação temporomandibular, o nervo aurículo temporal, os vasos temporais superficiais e o nervo facial encontram-se logo abaixo de determinado plano anatômico. Qual é esse plano?

- A) Fáscia Temporal Profunda.
- B) Fáscia Temporoparietal.
- C) Tecido Subcutâneo Denso.
- D) Tecido Subaponeurótico Frouxo.

QUESTÃO 23 – Em relação ao diagnóstico e tratamento das fraturas faciais, analise as assertivas abaixo:

- I. A oftalmoplegia é originada pelo aprisionamento ou encarceramento do ligamento cantal (placa tarsal) no traço de fratura do assoalho da órbita.
- II. Nas fraturas do complexo zigomático, a limitação da abertura bucal, quando de origem mecânica, pode ser justificada pelo deslocamento póstero-inferior do zigomático, que colide direto com o processo zigomático.
- III. Fraturas *blow-out* são definidas como fraturas em que há explosão do assoalho da órbita ou da parede medial da órbita, com herniações dos tecidos adiposos oculares para o interior do seio maxilar ou para região das células etmoidais.
- IV. O acesso cirúrgico de Weber Ferguson é uma incisão indicada para grandes exposições da região da maxila.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24 – Nas formulações anestésicas utilizadas em Odontologia, o anestésico local é associado a diferentes substâncias com funções complementares. Considerando a composição do tubete anestésico, qual é a principal função do cloreto de sódio presente nessas soluções?

- A) Ser o diluente (veículo) para fornecimento do volume de solução no tubete.
- B) Tornar a solução isotônica aos tecidos do corpo.
- C) Agir como bacteriostático.
- D) Evitar a oxidação do vasoconstrictor pelo oxigênio.

QUESTÃO 25 – As fraturas traumáticas, classificadas como LeFort III, têm potencial de causar anosmia, quando determinada estrutura anatômica papirácea é lesada. Qual é essa estrutura?

- A) Lâmina crivosa do etmoide.
- B) Vômer.
- C) Lâmina horizontal do osso palatino.
- D) Asa maior do esfenóide.

QUESTÃO 26 – É uma infecção bacteriana oportunista de progressão rápida causada por componentes normais da flora bucal, que se tornam patogênicos durante os períodos de comprometimento imunológico, inclusive podendo desenvolver necrose nos tecidos moles sem contiguidade com a gengiva. A necrose pode estender-se profundamente nos tecidos, e nos dias seguintes desenvolver zonas de coloração negro-azulada na superfície da pele. O trecho refere-se à:

- A) Sífilis secundária.
- B) Noma.
- C) Guna.
- D) Lepra.

QUESTÃO 27 – De acordo com Hupp, Ellis e Tucker no livro "Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea" (2015), relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando técnicas cirúrgicas às suas principais indicações anatômicas e procedimentos.

Coluna 1

1. Acesso submandibular (Risdon).
2. Acesso retromandibular.
3. Acesso pré-auricular.
4. Acesso intraoral.
5. Acesso coronal.

Coluna 2

- () Abordagem de fraturas do côndilo mandibular alto e região da fossa glenoide.
- () Abordagem estética e funcional de fraturas do terço médio e frontal do crânio.
- () Acesso direto a fraturas do ângulo e corpo mandibular, com preservação da estética facial.
- () Indicado para exposição do ramo mandibular e fraturas subcondilares baixas.
- () Usado para procedimentos de redução aberta na região parotídea e côndilo médio.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
- B) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
- C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
- D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.

QUESTÃO 28 – Em relação aos Defeitos de Face e a Cirurgia Ortognática, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O avanço mandibular isolado é sempre suficiente para corrigir a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) grave, não sendo necessário o avanço maxilar concomitante.
- () A discrepância esquelética anteroposterior e vertical, e a interrelação angular entre os incisivos superiores e inferiores são parâmetros importantes para o diagnóstico de uma deformidade dentoalveolar na análise facial e cefalométrica.
- () A adoção de tecnologias de simulação virtual cirúrgica (*Virtual Surgical Planning* – VSP) proporcionou o aumento do grau de precisão de movimentos, melhora da comunicação entre a equipe cirúrgica, a equipe de ortodontia e os pacientes e a previsibilidade de resultados dos movimentos esqueléticos.
- () Na abordagem minimamente invasiva, o trajeto da osteotomia na região da face lateral do corpo da mandíbula direciona-se para o ângulo mandibular, o que acaba facilitando a clivagem óssea e diminuindo o percentual de casos com parestesia pós-operatória.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) F – V – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – V.

QUESTÃO 29 – O canal óptico é uma estrutura presente no osso humano _____, o qual faz parte da composição do esqueleto denominada _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) lacrimal – viscerocrânio
- B) etmoide – neurocrânio
- C) esfenóide – viscerocrânio
- D) esfenóide – neurocrânio

QUESTÃO 30 – É uma cirurgia que visa reposicionar e fixar o disco articular da articulação temporomandibular (ATM). O procedimento é indicado quando há deslocamento do disco, causando dor, estalos, travamento e dificuldade de movimentação da mandíbula. O trecho anterior refere-se à:

- A) Artroscopia nível III.
- B) Discopexia aberta.
- C) Eminectomia.
- D) Condilectomia.

QUESTÃO 31 – Segundo Miloro *et al.* (2016), os fatores que mais contribuem para o desenvolvimento da fascíte necrotizante são:

- A) Tabagismo e desnutrição.
- B) Alcoolismo e desnutrição.
- C) Uso de drogas e diabetes.
- D) Diabetes e imunossupressão.

QUESTÃO 32 – Segundo Mallamed (2016), um kit de emergência básico deve estar presente em todos os consultórios odontológicos. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os medicamentos aos casos de emergência médica para os quais são recomendados como tratamento.

Coluna 1

1. Adrenalina.
2. Midazolan.
3. Aspirina.
4. Broncodilatador.

Coluna 2

- () Crises convulsivas.
- () *Angina pectoris* instável.
- () Episódio agudo de asma.
- () Anafilaxia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 4 – 1 – 3.
- B) 4 – 3 – 2 – 1.
- C) 2 – 3 – 4 – 1.
- D) 1 – 4 – 2 – 3.

QUESTÃO 33 – Atendimento odontológico de uma paciente jovem, ansiosa e com histórico de desmaios em situações de estresse. No transcorrer da exodontia, ela apresenta movimentos corporais desordenados, gritos intermitentes e olhos firmemente cerrados. O dentista observa que não há cianose, rash cutâneo e tremor nas mãos. Considerando o disposto por Malamed (2016), qual das condutas abaixo é mais adequada diante dessa situação?

- A) Interromper o procedimento, garantir segurança física, manter comunicação verbal tranquila e evitar medicação, tratando como crise conversiva.
- B) Administrar diazepam intramuscular imediatamente, considerando uma crise epiléptica prolongada.
- C) Manter a paciente em posição supina, administrar oxigênio e aguardar a cessação espontânea dos movimentos, sem estimular contato verbal.
- D) Administrar glicose oral e deitar a paciente em posição lateral de segurança, considerando hipoglicemia reacional.

QUESTÃO 34 – Em relação à cirurgia periapical, assinale a alternativa correta.

- A) Apicectomia consiste em um procedimento no qual há apenas curetagem do ápice radicular.
- B) A cirurgia do paraendodôntica está indicada para todos os dentes, porém os molares têm sua indicação restrita, devido ao grau de dificuldade.
- C) A maioria das lesões da região periapical são de origem odontogênica de desenvolvimento.
- D) A cirurgia periapical corrige o tratamento endodôntico mal realizado, sem necessidade de um retratamento.

QUESTÃO 35 – Em relação aos acessos cirúrgicos da região orbitária, é correto afirmar que as incisões sempre deverão acompanhar as linhas tencionais da face, também chamadas de linhas de _____, e sempre devem ser suficientes para redução e osteosíntese da fratura. Dessa forma, no acesso, _____ realiza-se a incisão paralela de 1 a 2 mm da linha ciliar, medialmente à palpebra inferior, em direção ao canto lateral, na prega da pele palpebral. Já no acesso _____, a incisão é realizada abaixo da borda da lâmina tarsal com distância de 4 a 5 mm da linha ciliar, na prega natural da pele.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Lynch – subciliar – subtarsa
- B) Lynch – subtarsal – subciliar
- C) Langer – subciliar – subtarsal
- D) Langer – infraorbitário – subciliar

QUESTÃO 36 – Em relação às cirurgias dos dentes retidos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O mau posicionamento dos dentes retidos é um estado anormal e que a proposta de tratamento do tratamento cirúrgico deve ser considerada, mesmo nos casos sem manifestações patológicas e assintomáticos, simplesmente para manutenção ou otimização da saúde bucal.
- () Nos pacientes adultos, são encontrados tecidos de sustentação dos dentes mais desenvolvidos, além de maior compactação do osso alveolar. Acredita-se que a melhor época para extração dos terceiros molares anteceda a rizogênese do primeiro terço radicular.
- () A alveolite é um processo inflamatório que ocorre ao redor da coroa de um dente parcialmente erupcionado, sendo mais frequente nos terceiros molares mandibulares.
- () Terceiros molares inferiores ou caninos inferiores retidos mantêm área de menor resistência às fraturas mandibulares e aumentam o risco dessas fraturas na região de suas localizações. A remoção destes dentes é justificada para a prevenção das fraturas mandibulares.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) F – F – F – V.
- C) V – V – V – F.
- D) V – V – F – V.

QUESTÃO 37 – Segundo os princípios básicos de cirurgia bucomaxilofacial, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os termos às suas respectivas descrições.

Coluna 1

- 1. Diérese.
- 2. Divulsão.
- 3. Exérese.
- 4. Síntese.

Coluna 2

- () Manobras cirúrgicas pelas quais são retirados todo o órgão ou tecido ou parte deles, sendo muitas vezes o objetivo da cirurgia.
- () Pode ser definida como um processo ou manobra realizada para reaproximação dos tecidos seccionados ou ressecados.
- () Método que consiste na separação ou divisão dos tecidos por meio de instrumentos cirúrgicos geralmente com ponta romba.
- () Conjunto de manobras que visam romper ou interromper a integridade tecidual, penetrando no interior dos tecidos e alcançando áreas anatômicas de interesse do cirurgião.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 4 – 2.
- B) 3 – 4 – 1 – 2.
- C) 3 – 4 – 2 – 1.
- D) 1 – 2 – 4 – 3.

QUESTÃO 38 – São músculos classificados como infra-hióideo, EXCETO:

- A) Estilo-hióideo.
- B) Esterno-hióideo.
- C) Esternotireóideo.
- D) Omo-hióideo.

QUESTÃO 39 – Em relação à anestesiologia geral na área bucomaxilofacial, analise as assertivas abaixo:

- I. A classificação Mallampati classe II diz respeito à visualização do palato mole e base da úvula visíveis.
- II. O paciente ASA III é considerado o paciente com doença sistêmica moderada à grave (angina, diabetes melito não controlada e insuficiência renal em diálise).
- III. Pacientes saudáveis e com idade inferior a 40 anos podem ser operados apenas com exames laboratoriais de rotina e uma radiografia simples do tórax.
- IV. O jejum em procedimentos cirúrgicos eletivos deve ser de 2 horas para líquidos claros (água, chá e sucos sem polpa), de 6 horas para líquidos com resíduos, fórmulas lácteas e refeições leves, e de 8 horas para refeições completas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 40 – Considerando a Farmacologia Clínica na área da Odontologia, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Dependência corresponde à necessidade de aumentar progressivamente as doses de certos fármacos para manter a intensidade de seus efeitos iniciais.
- () Chamamos de efeitos idiossincráticos a resposta peculiar de um indivíduo à ação de um medicamento, ou seja, em reação qualitativamente diferente da esperada na população geral.
- () A distribuição de um medicamento descreve a proporção (expressa em porcentagem) da quantidade administrada do fármaco (dose) que chega ao sítio de ação ou aos fluídos orgânicos.
- () A biotransformação submete o fármaco a reações químicas, geralmente mediada por enzimas, que o convertem em um composto diferente do originalmente administrado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.

QUESTÃO 41 – Segundo o art. 2º da Lei nº 8.080/1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Reforçando isso, a Lei nº 14.572/2023, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal, estabelece em suas diretrizes princípios doutrinários que todo o servidor público, em especial os que desenvolvem suas atividades laborais no SUS, devem respeitar. Estão entre esses princípios, EXCETO:

- A) Possibilitar o acesso universal, equânime e contínuo a serviços de saúde bucal de qualidade, dando resolução para toda demanda manifesta, espontânea ou programada, e viabilizar a obtenção e alocação dos recursos destinados à eliminação da demanda reprimida na área.
- B) Estabelecer que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a previdência social, proteção e defesa da saúde, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência e proteção à infância e à juventude.
- C) Estimular e promover a prática da gestão participativa, assegurando a atuação de representações populares e o controle público ou social, em todas as esferas de governo, na formulação e na discussão de estratégias de saúde bucal.
- D) Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde.

QUESTÃO 42 – Em relação à Lei nº 14.572/2023, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS e altera a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas abaixo:

- I. É um conjunto de diretrizes que configura modelo de organização e atuação direcionado à atenção à saúde bucal no País e que se constitui em instrumento para orientar as ações direcionadas à produção social da saúde bucal e, especificamente, as ações odontológicas em todos os níveis de atenção à saúde no âmbito do SUS.
- II. Estabelece que se deve desenvolver ações considerando o princípio da singularidade dos indivíduos, das comunidades e das equipes de saúde, o qual deve compreender somente ações do âmbito intersetorial, garantindo-se o acolhimento e a organização do serviço de saúde de forma usuário-centrado, realizados por equipe especializada nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar.
- III. Estabelece que deve haver uma política de educação permanente em saúde para os trabalhadores em saúde bucal, com o objetivo de implementar projetos de mudança na formação em nível técnico, de graduação e de pós-graduação, de modo a atender às necessidades da população e aos princípios do SUS.
- IV. As ações e os serviços de saúde bucal devem se sobrepor às demais políticas públicas de saúde de acordo com os princípios e as diretrizes do SUS, com vistas a garantir verba própria na articulação de ações públicas e privadas e concretização de ações integrais de saúde que viabilizem intervenção sobre fatores comuns de risco.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43 – Sobre o papel do acolhimento na Atenção Básica, de acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH) e na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), instituída pela Portaria nº 2.436/2017, analise as assertivas abaixo:

- I. O acolhimento constitui uma diretriz da PNH que amplia o acesso ao SUS, pautando-se na escuta qualificada, no vínculo e na corresponsabilização entre usuários e equipe de saúde.
- II. A PNAB reconhece o acolhimento como ferramenta organizadora dos processos de trabalho, voltada à garantia da integralidade e da longitudinalidade do cuidado.
- III. Tanto a PNH quanto a PNAB reduzem o acolhimento a um instrumento administrativo de triagem e organização de filas, priorizando apenas a resolubilidade técnica dos serviços.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 44 – Em um município com abastecimento público de água fluoretada cuja dosagem de flúor é aproximadamente 0,7 mg F⁻/L, há elevada prevalência de cárie em pré-escolares (2–5 anos). De acordo com o “Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil” (2024), qual das seguintes estratégias é a mais adequada para um programa de prevenção e controle da cárie nessa população?

- A) Implementar escovação coletiva diária nas creches com dentifrício fluoretado de 500 ppm F⁻ (quantidade equivalente a um grão de arroz para crianças <3 anos), incluir aplicações verniz fluoretado anualmente em todas as crianças e introduzir enxaguatório com NaF 0,05% como medida coletiva a partir dos 4 anos.
- B) Implementar escovação supervisionada diária nas creches usando dentifrício 1.000–1.500 ppm F⁻ (quantidade: grão de arroz até 3 anos; após grão de ervilha); incluir aplicações de verniz fluoretado duas vezes por ano em crianças de maior risco (ou naquelas que não usam métodos adequados de fluoretação); considerar fluoreto diamino de prata (DFP) 38% para lesões cavitadas quando a restauração não for viável, com consentimento dos responsáveis.
- C) Substituir a fluoretação da água do município por um programa exclusivamente tópico (verniz e escovação com dentifrício), como estratégia de precaução diante do risco de fluorose; estimular escovação supervisionada com uso de dentifrício 1.000–1.500 ppm F⁻ em casa no mínimo 2 vezes ao dia.
- D) Manter dentifrício 1.000–1.500 ppm F⁻ em casa; incluir aplicações de verniz fluoretado mensalmente em crianças de maior risco (ou naquelas que não usam métodos adequados de fluoretação); e aplicar DFP 38% semestralmente em todos os pré-escolares, além de instituir enxaguatório escolar com NaF 0,2% a partir dos 5 anos como medida coletiva.

QUESTÃO 45 – De acordo com Maltz *et al.* (2016), relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os fatores determinantes e modificadores da cárie dentária aos seus respectivos exemplos.

Coluna 1

- 1. Fatores determinantes.
- 2. Fatores modificadores.

Coluna 2

- () Fluxo e composição da saliva, biofilme e substrato alimentar.
- () Presença de flúor no meio bucal.
- () Estrutura dental e tempo de exposição a episódios cariogênicos.
- () Condições socioeconômicas e acesso aos serviços de saúde.
- () Hábitos de higiene bucal e frequência do consumo de sacarose.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 1 – 2 – 2.
- B) 1 – 1 – 2 – 1 – 1.
- C) 2 – 2 – 1 – 2 – 2.
- D) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.

QUESTÃO 46 – Um paciente adulto apresenta trauma dentário com luxação extrusiva de um incisivo superior permanente. Não há fratura radicular aparente no exame radiográfico inicial. Segundo Estrela e Bueno (2023), qual é a conduta inicial mais adequada?

- A) Reposicionamento imediato do dente seguido de contenção flexível por 2 semanas, com monitoramento clínico e radiográfico.
- B) Extração imediata do dente afetado devido ao risco potencial de necrose pulpar e reabsorção radicular, seguida de planejamento para reabilitação protética ou implante, ignorando a possibilidade de recuperação periodontal e pulpar.
- C) Aplicação de flúor tópico na superfície dentária traumatizada, com acompanhamento clínico/radiográfico restrito, sem reposicionamento nem estabilização alveolar, subestimando o risco de deslocamento residual e comprometimento da cicatrização periodontal.
- D) Fixação prolongada (6 semanas) com contenção elástica ou rígida, sem reposicionamento do dente extraído, devido ao risco aumentado de anquilose, reabsorção radicular e comprometimento da revascularização pulpar.

QUESTÃO 47 – Uma das principais causas da busca por atendimento odontológico no SUS são as dores de origem pulpar. Todo cirurgião dentista deve reconhecer seus sinais e sintomas, bem como ter conhecimento sobre a patogênese e o manejo clínico das doenças pulpares e periapicais. Em relação a esse tema, analise as assertivas abaixo:

- I. A necrose pulpar sempre evolui para dor intensa, sendo um indicador confiável para diagnóstico clínico sem necessidade de exames complementares.
- II. O tratamento endodôntico minimamente invasivo visa preservar estrutura dentária saudável enquanto remove tecido pulpar necrosado ou infectado, reduzindo risco de fraturas futuras.
- III. A inflamação pulpar crônica pode apresentar sinais clínicos discretos, mas ainda assim desencadear alterações histopatológicas e expressão gênica específica que justificam intervenção precoce.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 48 – Um paciente de 27 anos apresenta uma lesão proximal profunda em molar inferior vital, próxima à polpa, sem envolvimento periodontal. O exame radiográfico confirma ausência de fratura radicular, mas se evidencia estreita proximidade do ligamento periodontal. O paciente relata boa higiene bucal, mas consumo frequente de açúcares. Considerando as recomendações de Baratieri e Monteiro Jr. (2024), qual é a conduta restauradora mais adequada?

- A) Remoção seletiva da dentina contaminada, preservando a dentina desorganizada, seguida de aplicação de adesivo universal em modo *self-etch*, isolamento absoluto com dique de borracha, uso de resina composta convencional em técnica incremental e matriz proximal; monitoramento clínico e radiográfico.
- B) Remoção completa da dentina até dentina desorganizada, aplicação de adesivo *total-etch* de 3 passos, restauração com resina *bulk-fill* sem uso de matriz ou isolamento absoluto; prioriza adaptação marginal mecânica em detrimento da proteção pulpar.
- C) Aplicação de ionômero de vidro modificado com resina (RMGIC) sobre toda cavidade, sem remoção seletiva, apenas polimerização superficial; monitoramento clínico periódico, confiando no efeito tamponador do material.
- D) Uso de resina composta *flowable* em camada única, sem isolamento absoluto e sem adesivo universal; contenção rígida com cunha elástica, visando contorno proximal mecânico, ignorando preservação pulpar.

QUESTÃO 49 – Um paciente de 55 anos apresenta queixas de ardência e placas esbranquiçadas na mucosa oral, associadas a sensação de boca seca e episódios frequentes de dor gengival. O histórico clínico revela diabetes melito tipo 2 descompensado, uso recente de antibióticos de largo espectro e tratamento endodôntico incompleto em molares inferiores. Com base em Neville *et al.* (2009), em relação às infecções e suas manifestações bucais, analise as assertivas abaixo:

- I. A candidíase pseudomembranosa, causada pela *Candida albicans*, é a forma mais comum de infecção fúngica oral, frequentemente associada a uso recente de antibióticos, imunossupressão ou desequilíbrio metabólico, como diabetes mal controlada.
- II. Infecções endodônticas não tratadas podem evoluir para bacteremia, disseminação hematogênica de microrganismos como *Streptococcus viridans*, e formação de abscessos sistêmicos, representando risco potencial para pacientes imunocomprometidos.
- III. A xerostomia, comum em pacientes diabéticos não controlados ou em uso de medicações anticolinérgicas, diminui a atividade antimicrobiana da saliva e favorece a colonização de *Candida* e bactérias cariogênicas, aumentando o risco de infecções orais recorrentes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 50 – Um paciente de 42 anos, portador de HIV em tratamento antirretroviral, com histórico de carga viral indetectável, contagem de linfócitos T-CD4+ de 380 células/mm³ (350–499 células/mm³ → imunossupressão leve) e anemia significativa, necessita de exodontia de um molar inferior com periodontite avançada. Ele faz uso de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, e relata hipersensibilidade gástrica ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Com base nas recomendações do Ministério da Saúde (2022) e nos princípios de Puricelli e Corsetti (2023), qual é a conduta anestésica e terapêutica mais adequada?

- A) Utilizar anestesia infiltrativa com articaína a 4% sem vasoconstritor, para evitar risco de interação com antirretrovirais, associada a prescrição profilática de antibióticos devido ao estado imunológico.
- B) Realizar bloqueio do nervo alveolar inferior com lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000, respeitando dose máxima segura, sem necessidade de antibioticoprofilaxia de rotina, e analgesia preferencial com paracetamol.
- C) Indicar anestesia tópica seguida de exodontia imediata, visto que o paciente encontra-se com carga viral indetectável, sem necessidade de bloqueio nervoso profundo ou cuidados adicionais.
- D) Utilizar prilocaína associada à felipressina, pois essa combinação é preferida em pacientes com HIV, eliminando risco cardiovascular e a necessidade de monitoramento hemodinâmico.

QUESTÃO 51 – A seleção adequada do anestésico local e do vasoconstritor é essencial para garantir eficácia, segurança e previsibilidade em procedimentos odontológicos. Considerando as propriedades farmacológicas, as indicações clínicas e as técnicas anestésicas descritas por Puricelli e Corsetti (2023) e Puricelli (2013), assinale a alternativa correta.

- A) A associação de lidocaína a vasoconstritor adrenérgico em concentração de 1:50.000 é recomendada em pacientes com comprometimento cardiovascular, pois permite maior controle hemodinâmico e reduz o risco de arritmias.
- B) A mepivacaína, por apresentar menor ação vasodilatadora intrínseca, pode ser utilizada sem vasoconstritor em procedimentos de curta duração, sendo uma alternativa em pacientes que não toleram adrenalina.
- C) A articaína é contraindicada em bloqueios do nervo alveolar inferior, devido ao seu potencial neurotóxico aumentado em relação aos demais anestésicos locais de amida.
- D) A felipressina, vasoconstritor de escolha em gestantes, possui afinidade seletiva por receptores alfa-adrenérgicos, sendo mais eficaz que a adrenalina no prolongamento da anestesia em tecidos moles.

QUESTÃO 52 – Em relação à interpretação radiográfica odontológica, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Lesões periapicais de origem inflamatória apresentam-se inicialmente como áreas radiolúcidas mal delimitadas, podendo evoluir para imagens mais definidas com halo esclerótico.
- () A corticalização óssea ao redor de cistos é achado típico que auxilia na diferenciação em relação a lesões malignas, as quais tendem a apresentar margens irregulares e mal definidas.
- () A reabsorção radicular externa induzida por processos inflamatórios geralmente mostra continuidade entre a lâmina dura e a lesão radiolúcida, enquanto a reabsorção interna preserva os contornos externos da raiz.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) F – V – V.
- C) V – F – F.
- D) F – F – F.

QUESTÃO 53 – Em relação à dor orofacial e suas diferentes origens segundo Okeson (2008) e Neville (2009), analise as assertivas a seguir:

- I. A dor de origem odontogênica, como em abscessos periapicais agudos, apresenta tipicamente caráter contínuo, pulsátil e bem localizado, diferindo da dor miofascial, que tende a ser difusa e referida. Porém, em alguns casos de abscessos periapicais, a dor pode irradiar para dentes adjacentes ou regiões faciais, bem como inflamações crônicas podem gerar dor intermitente e não pulsátil, mimetizando dores musculares e confundindo o diagnóstico.
- II. O carcinoma espinocelular *in situ* geralmente manifesta-se por dor orofacial semelhante a uma odontalgia pulpar quando há infiltração neural periférica causando dor lancinante ou formigamento (parestesia) ou ulceração epitelial com exposição de terminações nervosas.
- III. Na disfunção temporomandibular de origem articular, a dor é predominantemente preauricular, podendo irradiar para região temporal, ouvido ou lateral da cabeça. Geralmente a piora está relacionada a movimentos mandibulares, mastigação ou abertura máxima e pode ser acompanhada de sinais como estalidos ou limitação de abertura.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 54 – Em relação ao uso de antissépticos bucais, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A clorexidina a 0,12% é eficaz na redução do biofilme em pacientes com gengivite ou mucosite, mas seu uso deve ser monitorado em imunossuprimidos devido ao risco aumentado de irritação da mucosa, potencial de ulceração e possibilidade de infecções oportunistas.
- II. Bochechos contendo álcool apresentam baixa eficácia sobre biofilme dental e podem causar irritação mucosa, sendo restritos em pacientes pediátricos, gestantes e com mucosite.
- III. Triclosan, incorporado em dentifrícios ou enxaguantes, atua como coadjuvante na redução de placa bacteriana e gengivite, não substitui a higiene mecânica e seu efeito é potencializado quando associado à clorexidina. Não é indicado como primeira escolha em mucosa fragilizada.
- IV. Peróxido de hidrogênio em concentrações baixas (1–3%) é indicado para clareamento dental domiciliar e controle de biofilme em mucosa saudável; entretanto, seu uso frequente em pacientes com mucosite ou ulcerações pode agravar irritação e retardar cicatrização.

- A) Apenas I e II estão corretas, pois apresentam indicações seguras para controle de biofilme em pacientes oncológicos.
- B) Apenas III e IV estão corretas, pois clorexidina e álcool apresentam restrições absolutas em pacientes com mucosite e pediátricos.
- C) Apenas I, II e IV estão corretas, pois apresentam métodos seguros para uso contínuo em pacientes imunossuprimidos.
- D) Todas estão corretas, mas apenas I e III têm indicações clínicas seguras em pacientes oncológicos.

QUESTÃO 55 – Considerando o tratamento endodôntico, anatomia radicular complexa e escolha de materiais intracanaís, segundo Almeida e Ferreira, (2022), Estrela e Bueno, (2023) e Passos *et al.*, (2022), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Lixas e limas manuais ou rotatórias são essenciais para o preparo biomecânico dos canais, mas não eliminam completamente a microbiota. O uso combinado de irrigantes químicos, como hipoclorito de sódio e EDTA, e o tempo de instrumentação são determinantes para a desinfecção efetiva de canais complexos e acessórios.
- B) Hidróxido de cálcio é utilizado como medicação intracanal temporária, induz barreira mineral, controla infecção e dessensibiliza o canal, especialmente em canais com anatomia complexa, devendo ser combinado com irrigação química para otimizar o tratamento.
- C) Dor persistente após estímulo térmico intenso indica pulpite irreversível, enquanto dor breve e transitória sugere pulpite reversível, podendo ser manejada com observação, profilaxia e acompanhamento clínico.
- D) Radiografias periapicais digitais isoladas permitem identificação de todos os canais acessórios e de reabsorções radiculares internas e externas, por apresentarem maior gradação de tons de cinza que as radiografias convencionais, dispensando exames tridimensionais.

QUESTÃO 56 – Sobre as manifestações bucais de condições infecciosas, reacionais e neoplásicas, analise as assertivas abaixo:

- I. O granuloma piogênico é uma lesão inflamatória reacional que pode estar associada a trauma crônico ou alterações hormonais, mas sua regressão espontânea é improvável, sendo a excisão cirúrgica sempre mandatória para evitar recidivas.
- II. A candidíase eritematosa pode simular clinicamente lesões potencialmente malignas, como a leucoplasia, mas seu curso clínico e resposta a antifúngicos permitem diferenciação. Contudo, a ausência de dor não exclui candidíase nessa forma clínica.
- III. O carcinoma espinocelular em assoalho bucal, fortemente relacionado ao tabagismo, tende a apresentar padrão radiolúcido irregular nas fases iniciais de invasão óssea; já as áreas radiopacas descritas em alguns relatos são mais compatíveis com lesões metastáticas ou processos reacionais como osteomielite crônica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 57 – Em relação à conduta odontológica preventiva e terapêutica em pacientes sob uso de bisfosfonatos ou anticorpos monoclonais humanos, assinale a alternativa correta.

- A) A suspensão temporária da terapia antirreabsortiva ou antiangiogênica é amplamente comprovada como medida preventiva eficaz, havendo consenso sobre o período ideal de interrupção antes de procedimentos cirúrgicos orais.
- B) Exodontias em pacientes sob terapia antirreabsortiva podem ser realizadas com segurança utilizando técnicas cirúrgicas convencionais, desde que a área seja bem irrigada e suturada, mesmo em contextos de exposição prolongada ao fármaco ou com comorbidades sistêmicas controladas.
- C) A gravidade da condição oncológica, o potencial de progressão da doença e a susceptibilidade do paciente a complicações orais sempre devem ser analisados na suspensão de terapias sistêmicas, cujo risco-benefício individual é preponderante.
- D) O risco de osteonecrose mandibular relacionada ao uso de medicamentos (MRONJ) é equivalente em pacientes tratados com bisfosfonatos orais contínuos para osteoporose e naqueles sob terapias intravenosas de alta dose para câncer metastático.

QUESTÃO 58 – Segundo Paim e Almeida-Filho (2023) e Pereira (2013), ao planejar uma intervenção para reduzir cárie em uma comunidade com alta vulnerabilidade, há iniciativas coerentes com princípios de saúde coletiva e com as recomendações para prevenção de doenças bucais. Sobre elas, assinale C, se corretas, ou I, se incorretas.

- () Estabelecer programa clínico intensivo: montar ações periódicas de adequação do meio bucal realizando restaurações, exodontias e selamentos de fósulas e fissuras, associadas a políticas públicas de promoção da saúde.
- () Preconizar campanhas nacionais por meios digitais sobre educação, prevenção e hábitos saudáveis bucais para grupos de risco.
- () Realizar intervenções intersectoriais de políticas públicas locais com negociação com escolas, comércio local, segurança pública e conselhos locais de saúde para garantia de continuidade e adaptabilidade.
- () Subsídio direto para compra de produtos de higiene bucal distribuído a todas as famílias do território sanitário, dependendo os determinantes biológicos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) C – C – I – I.
- B) I – C – I – C.
- C) I – I – C – C.
- D) C – I – C – I.

QUESTÃO 59 – Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

- I. A avaliação contínua de indicadores epidemiológicos, cobertura dos serviços e determinantes sociais de saúde é crucial para orientar estratégias de intervenção em saúde bucal, permitindo priorizar áreas de maior vulnerabilidade e alocar recursos de forma eficiente.

PORQUE

- II. A ausência de monitoramento sistemático limita a capacidade de avaliar efetividade das ações preventivas, podendo resultar em impacto reduzido sobre a incidência de cárie em dentes decíduos e permanentes e perpetuar desigualdades em populações socialmente vulneráveis.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

QUESTÃO 60 – A PNH do SUS propõe diretrizes para a qualificação do cuidado, visando melhorar a experiência do usuário e a integração das equipes de saúde. Considerando os princípios e estratégias dessa Política, assinale a alternativa correta.

- A) A PNH prioriza a padronização de protocolos assistenciais e hierarquização rígida de fluxos, reduzindo a autonomia das equipes multiprofissionais para garantir uniformidade no atendimento.
- B) O foco da PNH está restrito à atenção hospitalar de alta complexidade, sem diretrizes aplicáveis à atenção primária, e enfatiza procedimentos clínicos sobre o vínculo com o usuário.
- C) A PNH integra dimensões técnicas, éticas e relacionais do cuidado, promovendo acolhimento, responsabilização compartilhada e participação social no planejamento e avaliação dos serviços.
- D) A PNH incentiva a contenção de custos, utilizando métricas financeiras como principal critério de avaliação da qualidade do cuidado.