2025 년 4 월 24 일 목요일 1, 2 교시 <정신과학> 왕성민 교수님

노인정신질환 1

작성자 코멘트

2025 년 정신과학 노인정신질환 1(여의도성모병원 왕성민 교수님) 강의입니다. 슬라이드 136 장, 스크립트 ¶1–30 을 강의 자체의 목차대로 5 개 장 20 개 소절로 정리했습니다(긴 강의 지침 docs/long_lecture.md). 그림은 MOM 정리본의 슬라이드 그림만 가져왔고, 기출(PAD)이 없어 파랑 글씨는 없습니다.

교수님이 시험에 자주 나온다고 한 곳(뇌노화, MMSE, 정상 노인의 변화, 4 대 부작용)은 요약 표에 모았습니다.

회상과 재인의 대비는 세 번 나오므로 요약의 회상·재인 표 하나로 기억하세요.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분

회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

목차

I. 노인정신의학 개론과 뇌노화.....**3p**
II. 노인 환자의 정신과적 평가.....**5p**
III. 노인의 심리사회적·생물학적 특징.....**9p**
IV. 노년기의 주요 정신장애.....**13p**
V. 노인의 약물치료와 정신치료.....**18p**
VI. Take home messages.....**19p**

[강조점 세가지]

1. 정상 노화 **= frontal lobe, caudate, putamen** 감소 **/** 알츠하이머병 **= medial temporal lobe, hippocampus** 감소

- Scheltens' scale 로 내측 측두엽 위축 0–4 점

2. 노인 우울증 **=** 신체적 호소**,** 가성치매는 **'**몰라요**'**와 재인 보존

- 우울증은 치매의 전구 증상이거나 위험 요인

3. 노인 약물 **= Start low, go slow**


- 4 대 부작용: 항콜린성, 벤조디아제핀, 리튬, 항정신병약물

학습목표

1. 정상 노화와 알츠하이머병의 뇌 변화, 노인 환자의 평가(MMSE, CERAD)를 설명할 수 있다.
2. 노년기 주요 정신장애의 특징과 노인 약물치료 원칙, 정신치료를 설명할 수 있다.

요약 강의 전체 지도, 시험 포인트와 회상·재인

노인정신질환 1은 개론과 노화, 노인 환자의 평가, 노인의 심리사회적·생물학적 특징, 노년기 정신장애 각론, 약물치료와 정신치료 순서로 진행됩니다.



도식 1. 강의 전체 지도: 다섯 부분과 시험 포인트(★)

시험 포인트	핵심
뇌노화 **(I-[2])**	정상 노화 = frontal lobe, caudate, putamen 감소 알츠하이머병 = medial temporal lobe, hippocampus 감소
MMSE (II-[2])	선별검사, 확진 불가 나이, 성별, 학력의 영향이 큼
정상 노인의 변화 **(III-[5])**	IQ 80 세까지 유지, 재인 정상 정신운동 속도, 부호화, 단순 회상 저하
노인 우울증 **(IV-[2])**	신체적 호소, 가성치매 = '몰라요', 재인 보존
섬망 **(IV-[4])**	1년 내 사망률 50%, 소량 haloperidol
4대 부작용 **(V-[1])**	항콜린성, 벤조디아제핀, 리튬, 항정신병약물

회상과 재인의 대비는 신경심리검사, 정상 노인의 변화, 가성치매에서 세 번 다시 나옵니다. 한 표로 묶어 두고 본문에서는 이 표를 가리킵니다.

대상	회상**(recall,** 힌트 없이**)**	재인**(recognition,** 힌트를 주고 고름**)**
알츠하이머 치매	회상 저하	재인도 저하 (힌트를 줘도 못 맞힘)
전두엽 기능 저하, 우울증	회상 저하	재인에서 점수가 확 올라감
정상 노화	단순 회상(simple recall) 저하	재인 능력 정상 (객관식 문제 풀기)

I. 노인정신의학 개론과 뇌노화

[1] 고령화와 노화의 이론 **:** 한국은 고령화가 가장 빠르고**,** 노화는 나쁘기만 한 것이 아닙니다**.**




그림 1. 세계와 한국의 인구구조 (2019 년, 2067 년)

인구 피라미드는 2023 년과 2067 년을 비교한 것입니다. 오른쪽 한국 막대를 보면, 2067 년에는 65 세 이상 노인 비율이 46.5%가 됩니다. 길에서 만나는 두 명 중 한 명이 노인이라는 뜻입니다.

UN 은 노인을 65 세 이상으로 규정합니다. 신체 기능이 떨어지고 질병이 잦아지므로, 정신건강의학과와 노인 전문 의사의 역할이 커질 수밖에 없습니다.

(1) 노화 **=** 배아 발생부터 죽음까지의 전반적인 변화

노화는 나쁘기만 한 것이 아닙니다. 생물학적으로 노화는 암을 억제하는 내적 안전장치이고, 조직 손상을 완화시키는 작용도 합니다.

노화의 원인	예
유전학적 이론	예정된 노화 텔로미어(telomere, 종말체)의 단축
확률론적 이론	자유라디칼(free radical)에 의한 세포 손상 미토콘드리아 기능 장애

이 현상들은 몸뿐 아니라 뇌노화에서도 똑같이 중요하게 작용합니다.

[2] 뇌노화**:** 구조**,** 백질**,** 기능**,** 대사★ **:** 정상 노화는 전두엽·선조체**,** 알츠하이머병은 내측 측두엽·해마가 줄어듭니다**.** **[시험 빈출]**

뇌노화는 시험에도 자주 나오고 임상적으로도 아주 중요하다고 강조하셨습니다.

(1) 구조 **=** 뇌 부피와 피질 두께 감소**,** 어느 부위가 줄어드는지가 핵심★

대상	용적이 주로 줄어드는 부위
비치매 노인 **(**정상 노화**)**	frontal lobe(전두엽) caudate(미상핵), putamen(피각)
치매 노인 **(**특히 알츠하이머병**)**	medial temporal lobe(내측 측두엽) hippocampus(해마)




그림 2. Normal, mild cognitive impairment, Alzheimer's disease 의 MRI

사진을 왼쪽에서 오른쪽으로 보면 hippocampus 부위가 점점 쪼그라들고 빈 공간이 넓어집니다. 이 내측 측두엽 위축을 0~4 점으로 매기는 척도가 Scheltens' scale(셸텐스 척도)입니다.

(2) 백질 **=** 심부백색질 고음영과 뇌실주변 고음영

미세혈관이 막히거나 혈액이 저류되면 MRI 에서 하얗게 보이는 deep white matter hyperintensities(심부백색질 고음영)나 뇌실주변 고음영이 관찰됩니다. DTI 영상에서는 신경섬유의 연결성 저하가 확인됩니다.




그림 3. 백질 병변: DWM, banding, capping(PWM)

그림에서 뇌실 주변(PWM)에 모자 모양으로 하얀 것이 capping, 띠 모양이 banding 이고, 그 바깥쪽 깊은 곳의 병변이 DWM(심부백색질 병변)입니다.

(3) 기능 **=** 영역 간 통합이 떨어져 보상 작용

대상	보상 방식
인지기능이 떨어지는 노인	젊은 사람이 쓰는 부위 주변까지 끌어다 씀
인지기능이 유지되는 노인	반대쪽 뇌반구가 함께 활성화되어 보상

(4) 대사 **=** 정상 노화와 알츠하이머병은 처음 떨어지는 부위가 다름

대상	대사 저하
정상 노화	해마의 subiculum(경계부), dentate gyrus(치아이랑)의 에너지 대사 감소
알츠하이머병	entorhinal cortex(내후각피질) 대사장애가 가장 먼저 나타남

II. 노인 환자의 정신과적 평가

[1] 정신과적 평가와 일상생활 기능 **:** 면담은 환자 단독으로 먼저**,** 치매 초기에는 **IADL** 부터 떨어집니다**.**

노인 환자는 기억력이나 인지기능 문제로 말의 신뢰도(reliability)가 떨어질 수 있어서, 믿을 만한 보호자의 객관적인 정보가 꼭 필요합니다.

원칙은 면담을 환자 단독으로 먼저 시작하고, 그다음 환자의 동의를 얻어 가족과 면담하는 것입니다. 그래야 환자의 자존심을 지키고 라포를 형성할 수 있습니다.

정신상태검사(MSE)와 함께 MMSE, CDR, GDS, CERAD, SNSB 같은 신경인지기능평가를 하고, 일상생활 기능평가도 꼭 합니다.

구분	예
기본적 일상생활동작 **(ADL)**	목욕하기, 옷 입기, 대소변 가리기, 밥 먹기 원초적인 생존 활동
도구적 일상생활동작 **(IADL)**	운전하기, 전화하기, 요리하기, 돈 관리하기 고차원적인 도구 사용 → 치매 초기에 먼저 떨어짐

[2] MMSE: 선별검사와 보정★ **: MMSE** 는 선별검사이고 나이·성별·학력에 따라 보정합니다**.** **[국시]**

MMSE(간이정신상태검사)는 임상 실습과 국시에서 아주 중요하다고 강조하셨습니다.

우리나라에서는 MMSE-KC, MMSE-K, K-MMSE 세 버전을 주로 쓰고, 항목이 조금씩 다릅니다.

(1) MMSE = 선별검사**(screening test),** 점수만으로 확진 불가★

나이, 성별, 학력의 영향을 많이 받아서, 글자를 모르는 무학 노인이나 반대로 고학력자에서는 해석에 주의합니다.

버전	학력 보정 방법
MMSE-K (예전**)**	보정점수: 무학이면 시간 지남력 +1, 주의력 +2, 언어 +1
MMSE-KC, K-MMSE (요즘**)**	나이, 학력, 성별에 따른 표준편차(Z-score)로 평가

[3] MMSE 항목별 시행과 채점

항목마다 무엇을 묻고 어떻게 채점하는지가 핵심이라 표로 정리합니다.

항목	방법	채점 포인트
시간 지남력 **(5** 점**)**	연, 월, 일, 요일, 계절	환절기에는 융통성 있게 채점 예: 8 월 말에 '가을' → 이유를 물어 합리적이면 정답
장소 지남력 **(5** 점**)**	도/시/구/동, 몇 층, 이곳 이름	건물이 몇 층짜리가 아니라 '지금 몇 층에 있는지' '병원'만 답하면 병원 이름을 다시 물어 구체적이어야 1 점
기억 등록	나무, 자동차, 모자	첫 번에 말한 개수로 채점 못 외우면 외울 때까지 반복 (MMSE-KC 3 회, K-MMSE 5 회)
주의력	'삼천리강산' 거꾸로 ('산강리천삼')	생략, 자리 바뀜, 삽입, 2 글자 이상 위치 이탈 → 5 점에서 각 1 점 감점
주의력	100-7 연속 다섯 번	처음에만 '100 에서 7 을 빼면?', 이후 '거기서 또 7 을 빼면요?' 검사자는 환자의 숫자를 다시 말하지 않음 93 대신 92 라도 다음에 85 면 그 단계는 정답

항목	방법	채점 포인트
기억 회상	아까의 세 단어	다시 물어봄
이름대기	열쇠, 도장 (또는 시계, 볼펜)	'키', 사투리 '쇳대'도 정답 '문 열 때 쓰는 거' 같은 용도는 0 점 → '그것의 이름이 뭘까요?' 재질문
따라 말하기	'간장공장공장장'	한 번만 불러준다고 미리 알림, 다시 불러주지 않음 한 글자라도 틀리면 0 점
명령 이행 **(3 점)**	오른손으로 받아, 반으로 접어, 무릎 위에	다 말한 뒤에 종이를 건넴 각 동작 1 점
구성 행동	겹친 오각형 두 개 따라 그리기	다섯 각 유지 + 겹친 가운데가 사각형이어야 1 점
이해 및 판단 **(MMSE-KC, MMSE-K 만)**	옷은 왜 빨아 입나 남의 주민등록증을 주우면	위생, 청결 → 1 점 우체통, 우체국, 우편함만 정답 파출소, 동사무소 → '다른 방법은?' 한 번 더 물어 우체통이면 1 점

[4] 정밀 신경심리검사**(CERAD-K, SNSB) :** 선별에서 이상이면 **CERAD-NP** 나 **SNSB** 로 **6** 개 인지 영역을 봅니다**.**

선별검사에서 이상이 의심되면 정밀 신경심리검사인 CERAD-NP 나 SNSB 를 시행합니다.




그림 4. CERAD-NP 와 SNSB 가 평가하는 인지 영역

표의 왼쪽 열이 평가하는 6 가지 인지 영역, 즉 전반적 인지, 주의력, 언어, 시공간, 기억력, 전두엽/실행기능입니다.

CERAD-K 세부 검사	방법
언어유창성 검사	1 분 동안 동물 이름을 최대한 많이
보스톤 이름대기 검사	그림을 보고 이름 대기
단어목록기억 검사	10 개 단어를 세 번에 걸쳐 외움
구성행동 검사	원, 마름모, 사각형, 입체 도형 그리기
단어목록회상 검사	시간이 지난 뒤 10 개 단어를 힌트 없이 떠올림
단어목록재인 검사	외운 단어와 새 단어를 섞어 보여주고 맞힘

[작성자가 헷갈려서 정리]
회상 = 힌트 없이 떠올림 / 재인 = 보기를 주고 고름
- 알츠하이머 치매: 회상도, 재인도 낮음
- 전두엽 기능 저하·우울증: 회상은 낮아도 재인에서 점수가 확 오름
- 같은 대비가 III-[5] 정상 노인의 변화, IV-[2] 가성치매에서 다시 나옵니다(요약의 회상·재인 표).

(1) 전두엽·실행기능**(executive function)** 검사 **= TMT, Stroop test**




그림 5. 길 만들기 검사(Trail Making Test) A 형, B 형

검사	방법
길 만들기 검사 **(TMT)**	A 형: 1 부터 25 까지 숫자를 순서대로 이음 B 형: 1-가-2-나처럼 숫자와 한글을 번갈아 이음
스트룹 검사 **(Stroop test)**	빨간 잉크로 쓴 '파랑' → 글자가 아니라 잉크 색 '빨강'으로 답함 자동화된 반응을 억제하는 능력

치매가 진행될수록 전두엽 기능이 떨어져 이 검사들의 수행 속도가 현저히 느려지고 오류가 많아집니다.

III. 노인의 심리사회적·생물학적 특징

[1] 노년기의 성격과 상실 **:** 성격은 노년기에도 안정적이고**,** 부정적 변화는 상실에 대한 반응입니다**.**

흔히 노인이 되면 우울해지고, 내향적·수동적이 되며, 고집이 세지고(경직성 증가) 조심성과 의존심이 커지고, 인색해진다고 생각합니다.

성격은 개인이 환경에 반응하는 일관성 있고 안정적인 양식입니다.




그림 6. 성격 5 요인 모델 (McCrae 와 Costa)

McCrae 와 Costa 가 표의 다섯 요인(외향성, 친화성, 성실성, 신경증, 개방성)을 성인기부터 노년기까지 추적했더니, 노년기에도 성격 특성은 큰 변화 없이 안정적이었습니다.

따라서 앞의 부정적인 변화는 노화에 따른 본질적인 성격 변화라기보다 노년기의 스트레스와 상실에 대한 반응으로 봅니다.

(1) 노년기의 심리를 한 단어로 요약하면 바로 상실**(Loss)★**

상실의 요인	예
환경적 요인	배우자나 친구의 죽음, 은퇴, 경제력 상실
내적 요인	신체 질환, 기능 저하

[2] 인지 특성**:** 주의력**,** 기억**,** 실행기능 **:** 지속주의력·절차기억은 유지되고 선택·분할주의력**,** 일화기억은 떨어집니다**.**

노화가 되면 정보처리 속도가 느려집니다. 주의력은 세 가지로 나누고, 노화에 따른 변화가 서로 다릅니다.

주의력**(attention)**	예	노화
선택주의력	시끄러운 식당에서 친구 목소리에만 집중	뚜렷하게 떨어짐
분할주의력	라디오를 들으며 운전	뚜렷하게 떨어짐
지속주의력	한 가지 일에 계속 집중	비교적 잘 유지됨




그림 7. 기억의 분류

그림의 갈래를 따라 노화의 영향을 보면, 감각기억은 별 상관이 없고 작업기억과 장기기억 중 서술기억(일화기억)이 떨어집니다.

기억(memory)	노화
감각기억	노화와 별 상관 없음
작업기억 **(working memory)**	45 세 이후부터 계속 감퇴
삽화기억 **(일화기억)**	어제 누구를 만나 무슨 대화를 했는지 → 노화에 가장 민감하게 떨어짐
비서술기억 **(절차기억)**	자전거 타기 → 잘 유지됨

복잡한 목표를 계획하고 통제하는 실행기능(executive function)도 노화에 매우 민감해서, 노인은 익숙한 행동을 억제하고 새로운 상황에 빠르게 대처하기 어렵습니다.

[3] 노년기의 사회적 문제**,** 사별**(bereavement)**과 노인학대

문제	내용
사회경제적 지위**,** 은퇴	우리나라 노인은 은퇴 준비가 안 되어 2 년 이내에 다시 일터로 돌아가는 경우가 많음
노인차별 **(ageism)**	노인을 무능하고 까다로운 존재로 봄 노인 인구의 80% 이상이 만성 질환 1개 이상 → 건강 문제와 엮여 차별이 많음
성적 활동	성호르몬 저하로 줄지만, 노인 스스로의 부정적 편견으로 위축되는 면도 큼 3 대 결정 요소: 자신의 건강, 배우자 생존 여부, 젊었을 때의 성적 활동 수준 → 갖춰지면 노년기에도 건강한 성생활 가능
죽음에 대한 불안	에릭슨: 자아통합을 이루면 불안이 줄어듦 퀴블러 로스: 부정 → 분노 → 타협 → 우울 → (수용)

(1) 사별 **=** 정상 애도와 주요우울장애를 구분★

사별을 겪으면 누구나 우울해지므로, 정상적인 애도 반응과 치료가 필요한 주요우울장애를 구분할 줄 알아야 합니다.

구분	정상적인 애도	사별 후 주요우울장애
경과	수일, 수주 지나며 슬픔의 강도가 점차 줄어듦	시간이 지나도 호전되지 않음, 사회적 기능이 망가짐
주된 내용	공허감, 고인에 대한 그리움	'나는 쓸모없는 인간이야' 같은 자기비판적이고 비관적인 반추

상황	영향
폭력적 죽음 **(**자살**,** 타살**,** 사고사**)**	PTSD 로 이어지기 쉬움
65 세 이하 남성	여성보다 신체적·정신적 타격(자살, 심혈관 질환 등)이 훨씬 큼
사별 직후 면역	림프구 증식 감소, NK 세포(자연살해세포) 기능 저하

(2) 노인학대 **=** 신체적**,** 심리적**,** 재정적 학대 **+** 의학적 방임

구분	내용
유형	신체적 폭력, 욕설 같은 심리적 학대, 돈을 가로채는 재정적 학대 병원에 안 데려가거나 약을 안 챙기는 의학적 방임
가해자	대부분 가족, 특히 함께 사는 아들이나 며느리
발견	자식에게 해가 갈까 봐 숨기고 협조하지 않아 어려움
조치	법적 조치와 분리 피해자와 가해자 모두 정신의학적 진료

노인의 4 대 고통(경제적 빈곤, 건강악화, 역할상실, 고독)은 나이 들면 당연히 겪는 것이 아니라 사회가 해결해야 할 문제로 접근합니다.

[4] 성공적인 노화와 자아통합 **:** 노년기 과제는 자아통합 대 절망이고**,** 자아통합을 이루면 지혜를 얻습니다**.**

에릭슨의 심리사회적 발달 8 단계 중 마지막 노년기의 과제는 자아통합 대 절망(integrity vs despair)입니다.

결과	모습
자아통합	'참 의미 있는 삶이었다'며 감사하고 받아들임 → 지혜라는 덕목을 얻음
절망	'내 인생은 실패했어, 다시 시작하기엔 너무 늦었어' → 투사, 합리화, 퇴행 같은 미성숙한 방어기제 → 우울증, 알코올 의존 같은 정신장애

그 밖에 교육 수준과 소득이 높을수록, 가족과 친구의 사회적 지지체계가 탄탄할수록, 종교적 믿음과 죽음에 대한 수용적 태도를 가질수록 성공적인 노화의 가능성이 높아집니다.

친구 관계는 보통 여성이 남성보다 잘 유지한다고 덧붙이셨습니다.

[5] 정상 노인의 변화와 약물학★ : IQ·언어·재인은 유지되고, 지용성 약물은 지방에 쌓여 오래갑니다. [시험 빈출]

정상 노인의 변화는 시험에 보기 문항으로 잘 나오는 내용이라고 강조하셨습니다.

구분	정상 노인
유지됨	새로운 학습 (시간은 걸리지만 완벽하게 가능) IQ: 80 세까지 유지 언어 능력(verbal ability) 재인 능력 (객관식 문제 풀기)
떨어짐	정신운동 속도(psychomotor speed) 주의력 전환 작업 부호화(encoding) 단순 회상(simple recall)
신경전달물질	노르에피네프린 감소 세로토닌을 분해하는 MAO 증가

재인은 정상이고 회상은 떨어지는 점은 요약의 회상·재인 표와 같은 축입니다.

(1) 약동학 변화 **=** 체지방 증가 **→** 지용성 약물 축적★

변화	내용
흡수, 대사, 배설	위산 감소 간 크기 감소 → 간 대사 효소 활성 저하 신장 배설 기능 저하
체성분	체내 수분, 근육량(lean body mass) 감소 체지방(body fat) 비율 증가
결과	정신과 약물은 대부분 지용성(lipid soluble) → 지방 조직에 축적되어 약효가 오래가고 부작용이 쉽게 나타남
수용체	뇌 피질의 수용체 민감도 변화

그래서 노인은 약물 부작용에 극도로 취약하다는 것을 항상 명심해야 합니다.

IV. 노년기의 주요 정신장애

[1] 경도인지장애와 치매 : 인지 저하가 있어도 **ADL** 이 유지되면 **MCI, ADL** 까지 무너지면 치매입니다.

각론의 첫 번째는 신경인지장애, 그중 경도인지장애(MCI)입니다. 65 세 이상 노인의 약 28%가 겪을 정도로 흔합니다.

Petersen 진단기준	내용
주관적 호소	환자나 가족이 기억력 저하를 호소
객관적 저하	신경심리검사에서 나이, 학력 대비 인지기능이 유의하게 낮음 (보통 -1.5 표준편차 이하)
일상생활	ADL 은 온전히 유지 → 치매는 아님

MCI 의 약물 치료는 효과가 입증된 것이 없습니다. 아세틸콜린 분해효소 억제제, 은행잎 제제(징코), 비타민 등이 일관된 효과를 보이지 못했습니다.

따라서 기억훈련, 인지 자극, 사회적 활동 같은 비약물적 치료를 권고합니다.

(1) 치매(주요신경인지장애) = 인지 저하 + **ADL** 장애

알츠하이머병이 55~70%로 가장 흔하고 그다음이 혈관성 치매입니다. 치매는 적극적인 약물치료로 진행 속도를 늦추고 행동 증상을 조절합니다.

[2] 노인 우울증과 가성치매★ : 신체 호소가 많고, 가성치매는 '몰라요'라고 답하며 재인이 보존됩니다.

노인 우울증은 유병률이 10~15%이고, 젊은 사람의 우울증과 양상이 다릅니다.

노인 우울증의 특징	내용
신체적 호소 **(somatic complaints)**	'우울해요'보다 '온몸이 쑤시고 소화가 안 되고 머리가 아파요'
멜랑콜리아 양상	아침에 더 우울, 새벽에 일찍 깸, 식욕과 체중 감소
정신병적 증상	망상 등이 젊은 환자보다 자주 동반

(1) 가성치매(pseudodementia) = 우울증으로 치매처럼 보임★

구분	진짜 치매	가성치매 (우울증)
대답 태도	틀려도 어떻게든 대답하려 애씀, 작화증	조금만 어려워도 노력하지 않고 '몰라요'
주의집중력		편차가 큼
언어 기능		잘 보존
회상, 재인	회상과 재인 모두 저하	자유 회상(free recall)은 못 해도 재인(recognition)은 잘 맞힘




그림 8. 알츠하이머병의 위험 요인 또는 전구 증상으로서의 우울증

그림처럼 우울증은 알츠하이머병보다 앞서 나타날 수 있습니다. 우울증이 나은 뒤 수년 후 알츠하이머병으로 진행하는 경우가 많아, 노년기 우울증은 치매의 전구 증상이거나 위험 요인일 수 있습니다.

고혈압, 당뇨 등 뇌혈관 질환으로 대뇌 백질 병변이 생기며 발생하는 혈관성 우울증도 노인에서 매우 흔합니다.

치료는 SSRI, SNRI 같은 항우울제이고, 약이 듣지 않거나 자살 위험이 너무 높거나 정신병적 증상이 심하면 전기경련요법(ECT)이 아주 효과적입니다.

[3] 양극성장애와 불안장애

(1) 노년기 양극성장애 **=** 이차성 조증부터 감별★

노년기 양극성장애는 절반 정도가 우울삽화로 시작해 평균 15 년의 긴 잠복기를 거쳐 조증으로 나타납니다.

노인이 갑자기 조증으로 오면 가장 먼저 일차성 양극성장애인지, 내과적·신경학적 질환이나 약물에 의한 이차성 조증인지를 감별합니다.

노인에서는 뇌졸중, 뇌종양, 스테로이드나 파킨슨병 약(도파민 효현제)에 의한 이차성 조증이 많아서, 반드시 뇌영상 검사(MRI)와 혈액 검사를 철저히 합니다.

(2) 노인 불안장애

질환	노인에서의 특징	감별, 치료
공포증 **(phobia)**	유병률 4~8%로 가장 흔함, 그중 광장공포증	
범불안장애	주요우울증과 동반이 아주 많음	항우울제, 반감기가 짧은 저역가 항불안제
공황장애	노년기에 새로 발병하는 경우는 드묾	심장, 폐 질환, 약물 부작용부터 감별
강박장애	노년기에 새로 발병하는 경우는 드묾	우울증 노인의 반추를 강박사고로 오인하지 않음
PTSD	재경험보다 과각성 증상이 더 흔함	

[4] 섬망(delirium)★ : 급성 발생과 일중 변동이 특징이고, 원인 제거가 제 1 원칙입니다.

섬망은 입원 환자에서 정말 흔합니다. 감염, 뇌졸중, 약물, 대사장애가 원인이 됩니다.

상황	섬망 발생
고관절 골절 수술 후 회복기	40~50%
심장절개 수술 후	90% 이상

섬망은 수 시간이나 수일 내에 급성으로 시작하고, 낮에는 괜찮다가 밤이 되면 헛소리를 하는 식으로 일중 변동이 큽니다.

원인을 빨리 교정하면 좋아지지만, 노인에서 섬망을 방치하면 비가역적 뇌 손상으로 이어지고 1년 내 사망률이 50%에 달할 만큼 예후가 무섭다고 강조하셨습니다.

치료	내용
제 1 원칙	원인 제거
초조, 환각, 망상이 심할 때	소량의 haloperidol(할로페리돌)
피해야 할 약	항콜린성 작용이 강한 약물, 반감기가 긴 벤조디아제핀 → 섬망 악화

[5] 신체화 장애, 건강염려증, 화병 : '신경성'이라 말하지 말고, 고통이 실제 질병임을 공감합니다.

노인은 신체 증상 호소가 많습니다. 검사 결과가 깨끗하다고 '신경성이고 마음의 병'이라고 말하는 것이 의사들이 흔히 하는 실수입니다.

그러면 노인은 자기가 마음을 잘못 써서 병을 만들었다고 오해하거나, 의사가 병을 못 찾는다고 생각해 치료를 거부하고 병원 쇼핑을 합니다.

따라서 환자의 고통이 실제 질병이며 치료가 필요하다고 공감해 줍니다.

건강염려증 노인에게 의학적 근거가 없는 침습적 검사는 금기이지만, 주기적으로 만나 반복 진찰하고 안심(reassurance)시키는 것은 도움이 됩니다.

(1) 화병(Hwabyung) = 한국형 신체화 장애, 문화증후군

구분	내용
배경	가부장적 문화, 고부갈등이나 남편의 외도 억울하고 분한 감정을 평생 참음('한')
증상	열감, 치밀어 오름, 가슴 답답함 목이나 가슴에 덩어리가 걸린 느낌(매핵기), 한숨, 구갈 + 분노

[6] 노인 수면장애와 수면 위생**(sleep hygiene) :** 서파·렘수면이 줄고 일찍 자고 일찍 깨며**,** 수면 위생 교육이 먼저입니다**.**

정상 노화	변화
수면 구조	서파 수면(3, 4 단계), 렘수면 감소 잠이 얕아져 밤중에 자주 깸 (각성 증가)
일주기 리듬	앞당겨짐 → 저녁 일찍 자고 새벽 일찍 깸

노인 수면장애	내용
수면관련 호흡·운동장애	수면무호흡증, 하지불안증후군이 흔함
렘수면행동장애 **(RBD)**	꿈 내용을 행동으로 옮겨 자다가 주먹질 거의 노인에 국한된 특징적인 사건수면(parasomnia)
알코올	잠들기만 쉽게 함 수면을 조각내고 새벽에 일찍 깨게 함, 수면무호흡증 악화
진정수면제	전향성 기억상실, 낮 동안의 잔여 진정 작용, 반동성 불면 보행 장애 → 낙상, 골절

따라서 약을 쓰기 전에 낮잠 피하기, 일정한 시간에 일어나기 같은 수면 위생(sleep hygiene) 교육부터 시행합니다.

[7] 후기 정신병과 노인 자살 **:** 최만발성 조현병은 여성에 많고**,** 노인 자살은 치명적 방법으로 한 번에 사망합니다**.**

(1) 후기 정신병**(late-onset schizophrenia)**

구분	내용
만발성 **(late-onset)**	40 세 이후 발병
최만발성 **(very late-onset)**	60 세 이후 발병, 남성보다 여성에 많음
특징	병전 기능 양호, 사고의 와해와 음성증상은 드묾 피해망상(persecutory delusion)과 환각이 뚜렷
치료 반응	소량의 항정신병 약물에 반응이 좋음
만발성 편집증 **(paraphrenia)**	치매와 무관하게 피해망상이 수년에 걸쳐 서서히 발생 (과거 용어)

(2) 노인 자살 **=** 한국이 **OECD** 압도적 **1** 위★




그림 9. 자살률 추이와 OECD 국가 연령표준화 자살률

우리나라 자살률은 나이가 올라갈수록 계단식으로 가파르게 치솟아, 80 대 이상은 인구 10 만 명당 70 명에 육박합니다. 한국의 노인 자살률은 2 위 국가와도 큰 격차가 나는 압도적 1 위입니다.




그림 10. 노인이 자살을 생각한 이유와 노인 상대빈곤율 국제비교

오른쪽 막대처럼 노인 상대빈곤율도 압도적 1 위입니다. 미국 교과서 번역서는 주원인을 신체 질병과 상실로만 쓰지만, 우리나라 노인 자살에는 경제적 빈곤, 건강 악화, 외로움이 복합적으로 작용합니다.

노인은 치명적인 방법을 써서 한 번의 시도로 실제 사망하는 비율이 매우 높고, 사망한 노인 대다수가 우울증이 있었는데도 정신과적 치료를 제대로 받지 못했습니다.

독거노인, 최근 배우자와 사별한 노인, 만성 통증이나 신체 질환이 있는 노인이 우울 증상을 보이면 자살 위험성을 적극적으로 평가하고 개입해야 한다고 강조하셨습니다.

V. 노인의 약물치료와 정신치료

[1] 정신약물치료 지침과 4 대 부작용★ : Start low, go slow: 성인 용량의 1/3~1/2 로 시작해 천천히 올립니다. [꼭 암기]

노인은 간과 신장 기능이 떨어지고 지방 비율이 높아 약물 부작용이 잘 생깁니다(III-[5]). 그래서 대원칙은 'Start low, go slow'입니다.

지침	내용
용량	일반 성인 용량의 1/3~1/2 로 시작해 천천히 증량
처방 전 검사	심전도, 간·신장 기능 검사
복용 약 파악	내과, 다른 병원의 약, 일반의약품(OTC), 한약, 건강기능식품까지 → 다중약물요법(polypharmacy)의 상호작용 위험
순응도	기억력, 시력 저하로 잊거나 헷갈림 → 처방 단순화, 부작용 미리 설명

노인에게 약을 쓸 때 주의할 4 대 부작용은 꼭 외워 두라고 강조하셨습니다.

약물	주의할 부작용
1. 항콜린성 약물 **(anticholinergics)**	구갈, 시야 흐림, 변비, 빈맥, 요저류(urinary retention) 뇌: 인지기능 저하, 섬망 (삼환계 항우울제, 일부 항정신병약, 감기약)
2. 벤조디아제핀 **(**항불안제**,** 수면제**)**	혼동, 기억력 장애 같은 인지장애 근육 이완, 진정 → 낙상(골절) 위험 증가
3. 리튬 **(lithium)**	신장 배설 + 노인의 신기능 저하 + 좁은 치료역(therapeutic range) → 조금만 과해도 리튬 독성
4. 항정신병약물	추체외로 증상(EPS), 지연성 운동장애(TD)가 젊은 사람보다 잘 생김 clozapine: 무과립구증(agranulocytosis) 위험 증가

[2] 노인의 정신치료 : 목표는 상실 적응과 죽음 수용이고, 치료자는 더 적극적이고 지지적입니다.

노인 정신치료의 목표는 상실이나 은퇴에 잘 적응하고 다가오는 죽음을 수용하도록 돕는 것입니다. 치료자는 성인을 치료할 때보다 더 적극적이고 지지적이며 융통성을 발휘합니다.

학자	견해
프로이트	50 세가 넘으면 정신작용의 유연성이 부족해 정신분석에 적합하지 않음 (비관적)
칼 아브라함	실제 나이보다 신경증이 얼마나 오래되었는지가 중요
칼 구스타프 융	중년기 이후 전 생애에 걸친 성격 발달 강조

역동정신치료로 환자가 '내 인생은 완전히 실패했고 보상할 기회도 없다'는 절망적인 통찰만 얻게 된다면 역동정신치료는 금기입니다. 건전한 방어기제를 지지하는 방향으로 갑니다.

치료 기법	내용
인지행동치료 **(CBT)**	'늙는 것은 약해지는 것이다', '노인은 가족에게 짐이 되어선 안 된다' 같은 왜곡된 사고를 찾아 교정
대인관계치료 **(IPT)**	사별, 은퇴 후 무너진 사회적 네트워크 재건, 역할 변화 적응
회상요법 **(reminiscence therapy)**	사진첩, 아끼던 물건, 옛 노래로 지난날을 돌아보며 이야기 → 인생의 의미, 자아통합감 치매에서 인지기능은 못 올려도 우울 증상 개선 효과
가족치료	가족의 부양 부담(caregiver burden) 이해와 지지 부모 모시는 문제 등 가족 갈등 중재

- (강의 끝에 궁금한 점은 언제든 질문하라는 안내가 있었습니다.)

VI. Take home messages

1. 뇌노화 **=** 정상은 전두엽 중심**,** 알츠하이머병은 내측 측두엽 중심★

2. MMSE = 선별검사**,** 나이·성별·학력으로 보정★

3. 정상 노인 **= IQ**·언어·재인 유지**,** 정신운동 속도·부호화·단순 회상 저하★

4. 노인 우울증 **=** 신체적 호소**,** 가성치매는 **'**몰라요**'**와 재인 보존★

5. 섬망 **=** 원인 제거 **+** 소량 **haloperidol,** 방치하면 **1** 년 내 사망률 **50%**★

6. 노인 약물 **= Start low, go slow + 4** 대 부작용★