Wenn der Zähler und der Nenner eines Bruches durch dieselbe Zahl geteilt wird, bleibt der Wert des Bruches gleich.

$$\frac{20}{25} = \frac{20:5}{25:5} = \frac{4}{5}$$
 man schreibt $\frac{4}{8} = \frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{8}_{2}} = \frac{1}{2}$

Diesen Vorgang bezeichnet man als $k\ddot{u}rzen$. Es ist sinnvoll, einen Bruch so früh wie möglich mithilfe des ggT zu kürzen.

1 Kürze

(1)
$$\frac{2}{8} =$$
 (5) $\frac{3}{6} =$

(2)
$$\frac{4}{24} =$$
 (6) $\frac{2}{8} =$

(3)
$$\frac{4}{24} =$$
 (7) $\frac{2}{8} =$

(4)
$$\frac{4}{20} =$$
 (8) $\frac{3}{12} =$

2 Finde den ggT und kürze

(9)
$$\frac{8}{24} =$$
 (14) $\frac{4}{12} =$

$$(10) \quad \frac{12}{24} = \qquad (15) \quad \frac{20}{35} =$$

$$(11) \quad \frac{15}{35} = \qquad (16) \quad \frac{20}{30} =$$

$$(12) \quad \frac{8}{12} = \tag{17} \quad \frac{6}{14} =$$

$$(13) \quad \frac{6}{10} = \tag{18} \quad \frac{15}{35} =$$