Um zwei beliebige Brüche vergleichen zu können, muss man sie gleichnamig machen.

Dazu erweitertman beide Brüche so, dass sie das kgVals Nenner haben.

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12} < \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

$$kgV(4;6) = 12$$

$$\frac{3}{4} \xrightarrow{\text{erweitert mit}} \frac{9}{12:4=3}$$

$1 \hspace{0.1cm} \text{F\"{u}ge} > \text{,} < \text{oder} = \text{ein}$

$$(1) \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{7}$$

(11)
$$\frac{6}{5}$$

$$\frac{7}{2}$$

$$(2) \quad \frac{5}{2}$$

$$\frac{2}{7}$$

$$(12) \frac{5}{4}$$

$$\frac{5}{4}$$

$$(3) \quad \frac{7}{5}$$

$$\frac{8}{8}$$

$$(13) \quad \frac{6}{5}$$

$$\frac{3}{8}$$

$$(4) \quad \frac{3}{8}$$

$$\frac{9}{7}$$

$$(14) \quad \frac{3}{6}$$

$$\frac{3}{5}$$

$$(5) \quad \frac{5}{4}$$

$$\frac{9}{3}$$

$$(15) \frac{7}{8}$$

$$\frac{2}{4}$$

(6)
$$\frac{7}{5}$$

$$\frac{8}{4}$$

$$(16) \quad \frac{6}{5}$$

$$\frac{5}{4}$$

$$(7) \quad \frac{7}{5}$$

$$\frac{1}{5}$$

$$(17) \quad \frac{7}{4}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$(8) \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{6}{4}$$

(18)
$$\frac{5}{10}$$

$$\frac{7}{10}$$

(9)
$$\frac{3}{7}$$

$$\frac{1}{2}$$

(19)
$$\frac{4}{4}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$(10) \frac{7}{2}$$

$$\frac{3}{4}$$

(20)
$$\frac{4}{9}$$

$$\frac{5}{3}$$