# Simulacro PAES M1 · 20 ítems con solucionario razonado

Tuprofeindustrial · Matemática y Física para Ingeniería · versión 29 de octubre de 2026

**Descarga libre.** No cuesta nada y no tiene letra chica: está escrito para que lo uses, lo imprimas y se lo mandes a quien rinde contigo.
**Qué imita y qué no.** Cada ítem tiene 4 alternativas, como la prueba real. No se usa calculadora y no hay descuento por responder mal, así que nunca dejes una en blanco.
La PAES M1 completa tiene **65 preguntas** (60 puntúan, 5 son de pilotaje) en **140 minutos**, sin penalización y con calculadora no permitida. Este simulacro es **un tercio de eso**: 20 ítems, y aquí el tiempo honesto son **45 minutos**.
**No trigonometría:** seno, coseno y tangente se evalúan en la M2, no en la M1.

## Cómo usarlo

1. **45 minutos, cronómetro en mano,** sin apuntes y sin calculadora. Si un ítem te toma más de 3 minutos, márcalo con un asterisco y sigue: aprender a soltar también se entrena.
2. **Tapa el solucionario.** Está al final, separado por una línea. Rendir con la solución a la vista es la forma más rápida de sentir que sabes algo que no sabes.
3. Corrige con la **clave de la página 5** y anota tus errores en la tabla de la página 6, con el eje al que pertenecen. Ahí está el dato útil, no en el número final.
4. No botes esa tabla: al final del documento te digo cómo mandármela y te respondo **qué repasar primero**, gratis.

## Los cuatro ejes

| EJE | ÍTEMS | QUÉ TE PIDE |
|---|---|---|
| Números | 1 – 5 | porcentajes, fracciones, potencias, raíces, razones |
| Álgebra y funciones | 6 – 11 | ecuaciones, sistemas, modelar con una función, proporción |
| Geometría | 12 – 16 | Pitágoras, área, volumen, ángulos, isometrías |
| Probabilidad y estadística | 17 – 20 | promedio, mediana, probabilidad simple y compuesta |

**Lo que este simulacro no te dice**

Tu puntaje PAES. El puntaje oficial no sale de contar respuestas correctas: se calcula con un modelo estadístico sobre los ítems que puntúan, comparando con miles de personas. Un 16/20 acá no equivale a ningún número de la tabla de Demre. Sirve para ver **dónde** te caes, no para estimar tu puntaje.

# La prueba · ítems 1 al 20

45 minutos · sin calculadora · marca una alternativa por ítem

**1** · NÚMEROS · PORCENTAJES SUCESIVOS

El precio de una mochila es $32.000. Primero sube un 25% y después, sobre el precio nuevo, baja un 25%. ¿Cuánto cuesta al final?

A ☐ $28.000

B ☐ $30.000

C ☐ $32.000

D ☐ $40.000

**2** · NÚMEROS · FRACCIONES

El resultado de $3/4 - 2/5$ es

A ☐ $1/20$

B ☐ $7/9$

C ☐ $23/20$

D ☐ $7/20$

**3** · NÚMEROS · POTENCIAS

El valor de la expresión $(2^3 \cdot 2^4) / 2^2$ es

A ☐ 32

B ☐ 16

C ☐ 64

D ☐ 512

**4** · NÚMEROS · RAÍCES

La expresión $\sqrt{50}$ escrita en su forma más simple es

A ☐ $2\sqrt{5}$

B ☐ $10\sqrt{5}$

C ☐ $5\sqrt{2}$

D ☐ $25\sqrt{2}$

**5** · NÚMEROS · RAZONES

En un curso de 30 estudiantes, 18 aprobaron la guía. La razón entre los que aprobaron y los que reprobaron es

A ☐ $1 : 2$

B ☐ $2 : 3$

C ☐ $3 : 5$

D ☐ $3 : 2$

**6** · ÁLGEBRA · ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

La solución de $3(x - 2) = x + 8$ es

A ☐ $x = 1$

B ☐ $x = -1$

C ☐ $x = 7$

D ☐ $x = 5$

**7** · ÁLGEBRA · SISTEMA 2×2

El par que satisface las dos ecuaciones $2x + y = 7$ y $x - y = 2$ es

A ☐ $(3\ ;\ 1)$

B ☐ $(1\ ;\ 3)$

C ☐ $(2\ ;\ 3)$

D ☐ $(3\ ;\ 2)$

**8** · ÁLGEBRA · MODELAR CON FUNCIÓN LINEAL

Un taxi cobra $900 de bajada de bandera y $350 por cada kilómetro recorrido. Si $k$ es la distancia en kilómetros, ¿cuál expresión da el costo $C$ de un viaje?

A ☐ $C = 1250k$

B ☐ $C = 900k + 350$

C ☐ $C = 350k - 900$

D ☐ $C = 350k + 900$

**9** · ÁLGEBRA · ECUACIÓN CUADRÁTICA

Las soluciones de $x^2 - 5x + 6 = 0$ son

A ☐ $-2$ y $-3$

B ☐ $2$ y $3$

C ☐ $1$ y $6$

D ☐ $-1$ y $-6$

**10** · ÁLGEBRA · PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Si 3 kg de manzanas cuestan $2.400, ¿cuánto cuestan 7 kg al mismo precio?

A ☐ $5.600

B ☐ $4.800

C ☐ $6.300

D ☐ $7.200

**11** · ÁLGEBRA · EVALUAR UNA FUNCIÓN

Si $f(x) = 2x^2 - 3$, el valor de $f(-2)$ es

A ☐ $-11$

B ☐ $-7$

C ☐ $5$

D ☐ $13$

**12** · GEOMETRÍA · PITÁGORAS

Un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

A ☐ $2\sqrt{7}$ cm

B ☐ 10 cm

C ☐ 14 cm

D ☐ 48 cm

**13** · GEOMETRÍA · ÁREA

Un triángulo tiene base de 8 cm y altura de 3 cm. Su área es

A ☐ 11 $cm^2$

B ☐ 18 $cm^2$

C ☐ 24 $cm^2$

D ☐ 12 $cm^2$

**14** · GEOMETRÍA · VOLUMEN

Un cilindro recto tiene 3 cm de radio y 10 cm de altura. Su volumen, expresado en función de $\pi$, es

A ☐ $90\pi$ $cm^3$

B ☐ $30\pi$ $cm^3$

C ☐ $60\pi$ $cm^3$

D ☐ $180\pi$ $cm^3$

**15** · GEOMETRÍA · TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS

Un segmento de 5 cm gira 90° alrededor de un punto del plano. Después de la rotación, su longitud es

A ☐ 2,5 cm

B ☐ $5\sqrt{2}$ cm

C ☐ 5 cm

D ☐ 10 cm

**16** · GEOMETRÍA · ÁNGULOS

En un triángulo, dos de sus ángulos miden 40° y 65°. El tercer ángulo mide

A ☐ 55°

B ☐ 75°

C ☐ 105°

D ☐ 115°

**17** · PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROMEDIO

Cuatro estudiantes promedian nota 5,0. Tres de ellos obtuvieron 4,0 ; 5,2 y 6,0. La nota del cuarto es

A ☐ 4,2

B ☐ 5,0

C ☐ 5,8

D ☐ 4,8

**18** · PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROBABILIDAD SIMPLE

En una bolsa hay 3 fichas rojas, 5 azules y 2 verdes. Se saca una ficha sin mirar. La probabilidad de que **no** sea verde es

A ☐ 1/5

B ☐ 2/5

C ☐ 4/5

D ☐ 3/5

**19** · PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · EVENTOS DEPENDIENTES

De la misma bolsa (3 rojas, 5 azules, 2 verdes) se sacan dos fichas seguidas sin devolver la primera. La probabilidad de que ambas sean rojas es

A ☐ 1/15

B ☐ 1/10

C ☐ 3/10

D ☐ 9/100

**20** · PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · MEDIANA

Cinco estudiantes se demoraron 12, 8, 20, 15 y 8 minutos en resolver la guía. La mediana del grupo es

A ☐ 8

B ☐ 12

C ☐ 12,6

D ☐ 15

## Clave de respuestas

Corrige contando nada más: anota en la tabla siguiente **en qué eje** fallaste.

| ÍTEM | CLAVE | EJE | ÍTEM | CLAVE | EJE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **B** | Números | 11 | **C** | Álgebra |
| 2 | **D** | Números | 12 | **B** | Geometría |
| 3 | **A** | Números | 13 | **D** | Geometría |
| 4 | **C** | Números | 14 | **A** | Geometría |
| 5 | **D** | Números | 15 | **C** | Geometría |
| 6 | **C** | Álgebra | 16 | **B** | Geometría |
| 7 | **A** | Álgebra | 17 | **D** | Prob. y est. |
| 8 | **D** | Álgebra | 18 | **C** | Prob. y est. |
| 9 | **B** | Álgebra | 19 | **A** | Prob. y est. |
| 10 | **A** | Álgebra | 20 | **B** | Prob. y est. |

### Diagnóstico por eje

| EJE | ÍTEMS | CORRECTAS | QUÉ HACER SI FALLASTE 2 O MÁS |
|---|---|---|---|
| Números | 1 – 5 | / 5 | El error casi nunca es de cuenta, es de lectura: ¿el 25% se aplica sobre qué precio? Repasa porcentaje sucesivo, denominador común y definición de razón (a : b, no a : total). |
| Álgebra y funciones | 6 – 11 | / 6 | Distribuir el signo dentro del paréntesis y elevar un negativo son los dos hoyos que más cuestan puntos. Escribe la línea siguiente del cálculo en el papel, no de memoria. |
| Geometría | 12 – 16 | / 5 | Fórmulas con la ÷2 olvidada y radio leído como diámetro. Escribe la fórmula completa antes de reemplazar, y quédate con el resultado en función de π. |
| Probabilidad y estadística | 17 – 20 | / 4 | Distinguir mediana de promedio y "sin devolver" de "con reemplazo". Ordena los datos de menor a mayor antes de buscar la mediana, siempre. |

### Tu registro de errores

La parte que vale de este simulacro. Escríbelo con tus palabras: el día antes de la prueba no vas a leer 20 solucionarios, vas a leer esta tabla.

| ÍTEM | LO QUE HICE | LO QUE DEBÍ HACER | SE REPITE EN LA VIDA REAL CUANDO… |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Solucionario razonado

La cuenta recta, la trampa por la que entraste y la regla que te sirve para cualquier ítem del mismo tipo.

**1 · B** **$30.000**

Sube 25%: $32.000 \times 1{,}25 = 40.000$. Baja 25% **sobre 40.000**, no sobre 32.000: $40.000 \times 0{,}75 = 30.000$.

> Si marcaste C ($32.000), asumiste que "sube 25% y baja 25%" se anulan. Nunca se anulan: el segundo porcentaje se aplica sobre un número más grande, así que siempre pierde.

**Regla:** dos porcentajes iguales de signo opuesto nunca devuelven al precio original. En general, ×1,25 y ×0,75 = ×0,9375 → una pérdida del 6,25%.

**2 · D** **7/20**

Denominador común 20: $3/4 = 15/20$ y $2/5 = 8/20$. Entonces $15/20 - 8/20 = 7/20$.

> A (1/20) sale de restar numeradores sueltos: 3 – 2 = 1 sobre 20. C (23/20) sale de sumar en vez de restar los numeradores ya convertidos. B (7/9) sale de operar arriba y abajo por separado.

**Regla:** el denominador común se construye multiplicando cada fracción completa (arriba y abajo) por el mismo número. Si convertiste 3/4 a /20, multiplica el 3 por 4: no toques el resultado después.

**3 · A** **32**

Misma base: arriba se suman los exponentes ($3 + 4 = 7$) y abajo se resta ($7 - 2 = 5$). $2^5 = 32$.

> D ($512 = 2^9$) sale de sumar los tres exponentes sin mirar que uno estaba dividiendo. B ($16 = 2^4$) sale de restar 3 – 4 + 2 o de multiplicar mal. C ($64 = 2^6$) es el error de "sumo 3 + 4 y resto 1".

**Regla:** multiplicando se suman exponentes, dividiendo se restan. Nunca se multiplican exponentes entre sí, y $(2^3)^2 = 2^6$ sí es producto del paréntesis con el exponente.

**4 · C** $5\sqrt{2}$

Busca el cuadrado perfecto más grande dentro de 50: $50 = 25 \times 2$. Entonces $\sqrt{50} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

> B ($10\sqrt{5}$) viene de escribir $50 = 5 \times 10$ y sacar el 10 afuera como si fuera cuadrado perfecto. A ($2\sqrt{5}$) es $\sqrt{20}$ mal simplificado. D ($25\sqrt{2}$) sale de sacar el 25 sin su raíz: $\sqrt{25} = 5$, no 25.

**Regla:** de la raíz solo sale la raíz del cuadrado, no el número. Y si dudas, eleva al cuadrado tu respuesta: $(5\sqrt{2})^2 = 25 \times 2 = 50$. Chequeo de 5 segundos.

---

**5 · D** 3 : 2

Aprobaron 18, reprobaron $30 - 18 = 12$. La razón 18 : 12 simplificada por 6 es 3 : 2.

> C (3 : 5) compara a los 18 contra los 30 del curso. Es la trampa más frecuente del eje: "aprobados **del** curso" es fracción o porcentaje, "aprobados **a** reprobados" es razón.

**Regla:** en una razón no está el total. Si el total aparece, es fracción: 18/30 = 3/5.

---

**6 · C** x = 7

Distribuye: $3x - 6 = x + 8$. Pasa la x: $2x - 6 = 8$. Pasa el $-6$: $2x = 14$, $x = 7$.

> D (x = 5) sale de repartir mal el 3: 3x – 2 = x + 8. El 3 multiplica todo el paréntesis. A (x = 1) sale de hacer 8 – 6 en vez de 8 + 6 al pasar el término.

**Regla:** lo que pasa al otro lado cambia de signo. Y siempre vuelve a reemplazar tu solución en la ecuación original: 3(7 – 2) = 15 y 7 + 8 = 15. Si no empata, el error está en la línea anterior.

---

**7 · A** (3 ; 1)

Suma directa, porque $+y$ y $-y$ se anulan: $2x + y + x - y = 7 + 8 \rightarrow 3x = 9 \rightarrow x = 3$. Con $x = 3$ en $x - y = 2$ queda $3 - y = 2$, así que $y = 1$.

> B (1 ; 3) es la misma pareja al revés: el orden es (x ; y), y cambiarla es el error más caro de este ítem. C (2 ; 3) sale de resolver x – y = 2 como si fuera x + y = 2, o de dividir mal el sistema.

**Regla:** un sistema se chequea con las dos ecuaciones, no con una. (3 ; 1): 2·3 + 1 = 7 ✓ y 3 – 1 = 2 ✓.

**8 · D** C = 350k + 900

El 900 se paga una sola vez, entres o no entres al taxi: es el término independiente. El 350 se repite por kilómetro: es la pendiente. Con $k = 3$: $350 \cdot 3 + 900 = 1.950$.

> A (1250k) suma los dos números y los trata como si ambos dependieran de la distancia. B (900k + 350) intercambió los roles: el 900 quedó multiplicando. C es el signo cambiado.

**Regla:** en un modelo lineal, lo que se paga "por cada uno" multiplica y lo que se paga "una vez" va solo. Prueba con k = 0: si el viaje de 0 km te cuesta $0, tu fórmula está mal.

---

**9 · B** 2 y 3

Factoriza: busca dos números que multiplicados den $+6$ y sumados den $-5$. Son $-2$ y $-3$, entonces $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, y las soluciones son $x = 2$ y $x = 3$.

> A (–2 y –3) es el error de señal: los números que suman –5 son –2 y –3, pero las **raíces** son lo contrario, porque el factor es (x – 2). C (1 y 6) suma 7 en vez de 5.

**Regla:** al factorizar, la suma que buscas es la del medio y las raíces tienen el signo opuesto a los números del paréntesis. Reemplaza: $2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$ ✓.

---

**10 · A** $5.600

Primero el valor unitario: $2.400 \div 3 = 800$ el kilo. Después $800 \times 7 = 5.600$.

> B ($4.800) sale de una regla de tres mal plantada (2.400 × 3/...). D ($7.200) asume 1.000 el kilo, es decir 3.000 ÷ 3: error de división. Si usas la cuenta cruzada, 2.400 × 7 ÷ 3 = 16.800 ÷ 3 = 5.600, y da lo mismo: la segunda vez hazlo así y compara.

**Regla:** hallar el valor de uno primero casi nunca falla y se hace sin calculadora. Si el resultado te da un número más chico que el dato de partida cuando pides más cantidad, algo está invertido.

---

**11 · C** 5

Primero el cuadrado: $(-2)^2 = 4$. Después multiplica: $2 \times 4 = 8$, y resta $3 \rightarrow 5$.

> A (–11) sale de escribir $(–2)^2 = –4$. Un negativo al cuadrado es positivo: $(–2) \cdot (–2) = +4$. B (–7) sale de no elevar y calcular $2 \cdot (–2) – 3$. D (13) sale de sumar 3 en vez de restarlo.

**Regla:** entre el signo menos y un cuadrado, el paréntesis manda: $(–2)^2 = 4$ pero $–2^2 = –4$. Y el orden de operación siempre es potencia → producto → suma.

**12 · B** 10 cm

$h^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, así que $h = 10$. Es el triángulo 3-4-5 escalado al doble.

> C (14) es sumar los catetos, no aplicar Pitágoras. D (48) es el área mal calculada (6·8). A ($2\sqrt{7}$) sale de usar 8 como hipotenusa y restar: $\sqrt{(64 - 36)} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ — ésa es la respuesta correcta si te preguntan por un **cateto**, no por la hipotenusa.

**Regla:** la hipotenusa es siempre el lado opuesto al ángulo recto y la fórmula cambia de signo según qué lado buscas: $h^2 = a^2 + b^2$ para la hipotenusa, $c^2 = h^2 - a^2$ para un cateto. Reconoce las ternas (3,4,5), (6,8,10), (5,12,13) y te ahorras la cuenta.

**13 · D** 12 cm²

Área del triángulo $= (\text{base} \times \text{altura}) \div 2 = (8 \times 3) \div 2 = 24 \div 2 = 12$.

> C (24) es la trampa del eje: olvidaste el ÷2 y calculaste el rectángulo que lo envuelve. B (18) mezcla fórmulas. A (11) es sumar los datos porque no sabes qué fórmula iba.

**Regla:** todo triángulo es la mitad del rectángulo de su misma base y altura. Chequeo rápido: tu respuesta no puede ser mayor que base × altura, y si coincide con base × altura, falta el medio.

**14 · A** 90π cm³

$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 10 = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi$. Se deja el π escrito: la prueba no pide aproximarlo.

> C (60π) usa el diámetro como si fuera el radio, o elevó mal: 6 · 10 = 60. B (30π) es π·r·h sin elevar el radio. D (180π) multiplicó por 2 de más, o usó 2πrh que es el área lateral, no el volumen.

**Regla:** volumen de prisma o cilindro = área de la base × altura. Calcula la base primero (aquí 9π), y recién después multiplica por la altura. Y si el enunciado dice "en función de π", no reemplaces 3,14.

**15 · C** 5 cm

La rotación es una transformación isométrica: mueve el objeto, no lo estira. La longitud sigue siendo 5 cm.

> B ($5\sqrt{2}$) sale de calcular la distancia entre el extremo antes y después de girar, que no es lo que preguntaban. A (2,5) y D (10) asumen que girar acorta o duplica.

**Regla:** isométrica = conserva distancias y ángulos. Traslación, rotación y reflexión conservan; la homotecia (ampliar o reducir) es la única que cambia el tamaño, y ésa se evalúa en la M2.

**16 · B** **75°**

Los ángulos interiores de un triángulo suman 180°. $40 + 65 = 105$, entonces $180 - 105 = 75$.

> C (105) es el resultado de la suma, sin restarlo de 180: respondiste otra pregunta. A (55) y D (115) salen de restar mal (180 – 125 o 180 – 65).

**Regla:** en cualquier triángulo, el ángulo que falta es 180 menos la suma de los otros dos, y un ángulo exterior vale la suma de los dos interiores que no son su adyacente. Suma los tres al final: 40 + 65 + 75 = 180.

---

**17 · D** **4,8**

Si cuatro promedian 5,0, la suma total es $4 \times 5{,}0 = 20{,}0$. Las tres notas conocidas suman $4{,}0 + 5{,}2 + 6{,}0 = 15{,}2$. Falta $20{,}0 - 15{,}2 = 4{,}8$.

> B (5,0) es asumir que la nota que falta es el promedio. C (5,8) sale de sumar mal 15,2. El paso que la mayoría salta: multiplicar el promedio por la cantidad de datos para recuperar la suma.

**Regla:** promedio × cantidad = suma total. Con esa identidad se resuelven todos los ítems de "falta un dato" y también los de "llega un dato nuevo". Verifica: (4,0 + 5,2 + 6,0 + 4,8) ÷ 4 = 20 ÷ 4 = 5,0 ✓.

---

**18 · C** **4/5**

Total: $3 + 5 + 2 = 10$ fichas. No verdes: $3 + 5 = 8$. Entonces $8/10 = 4/5$.

> A (1/5) es la probabilidad de la verde: calculaste el evento contrario y no lo invertiste. B (2/5) son las azules solas. Con "no" en el enunciado, la cuenta directa (8/10) o el complemento (1 – 2/10) dan lo mismo; la segunda es más rápida.

**Regla:** P(no A) = 1 – P(A). Ante un enunciado con "no", "al menos" o "distinto de", calcula el contrario y réstalo de 1.

---

**19 · A** **1/15**

Primera roja: 3/10. Como no la devolvés, quedan 2 rojas de 9 fichas: 2/9. Multiplica: $3/10 \times 2/9 = 6/90 = 1/15$.

> D (9/100) es calcular con reemplazo (3/10 × 3/10) — la trampa grande de este ítem. C (3/10) es la primera extracción sola. B (1/10) sale de multiplicar mal los denominadores.

**Regla:** "sin devolver" cambia el denominador de la segunda extracción: 10 se vuelve 9. Cuenta siempre los dos eventos con lo que queda en la bolsa, no con lo que había al principio.

**20 · B** 12

Ordena de menor a mayor: 8, 8, 12, 15, 20. Con 5 datos, la mediana es el que queda en el medio: el tercero, que es 12.

> C (12,6) es el promedio: 8 + 8 + 12 + 15 + 20 = 63 ÷ 5. Mediana y promedio no son lo mismo: la mediana no usa ningún valor de la suma. A (8) es la moda. Ordenar primero es el paso que casi nadie hace y es el que evita el error.

**Regla:** mediana = dato que parte ordenada queda al centro, así que hay que ordenar siempre antes. Con cantidad par de datos, se promedian los dos del medio. Y con datos muy extremos, la mediana representa mejor al grupo que el promedio.

---

### Y ahora, la parte que sí te sube la nota

Toma la tabla de registro de errores de la página 6, sácale una foto y mándamela por WhatsApp. Te respondo **qué eje repasas primero y con qué**, sin costo y sin tenerte que explicar dos veces. Con eso me alcanza para decirte si tu problema son los porcentajes sucesivos o la lectura del enunciado, que son dos remedios distintos.

**Mándame tu foto por WhatsApp → wa.me/56933843381**

Si prefieres que trabajemos sobre tus errores en sesiones de **Intensivo PAES** antes del 2 de diciembre, en ese mismo mensaje te digo horarios y el valor de la clase individual.

### Este simulacro es gratis: que corra

No lo dejes tirado en la carpeta de descargas. Si te sirvió, mándaselo a quien rinde contigo y dile dónde me encontró: **@tuprofeindustrial** en TikTok e Instagram, y **tuprofeindustrial-web.vercel.app** en el navegador. Así cada copia conserva la vuelta de regreso.

**Simulacro PAES M1 · 20 ítems con solucionario razonado** — hecho por Matías, docente e Ingeniero Industrial. Ítems originales escritos a mano sobre los ejes oficiales de la prueba (Números · Álgebra y funciones · Geometría · Probabilidad y estadística); no son preguntas reproducidas de Demre. Versión del 29 de octubre de 2026.