

PRJ02 | Detecção de divergências entre razão e extrato

Equipe: Conciliação e Dados | Recorte de 18 semanas | Corte: 2025-05-12

Contexto

O razão contábil e o extrato do cliente podiam registrar o mesmo evento com descrições e horários diferentes.

Pergunta registrada

Era possível associar os registros sem depender de uma igualdade exata entre textos e horários?

Referência anterior

Igualdade textual, faixa de valor/tempo e atribuição bipartida de custo mínimo já eram dominadas. A última força pareamento em componentes ambíguos quando dois relógios divergem; não representa causalidade relativa nem abstenção por margem.

Trabalho documentado

1.200 pares, 400 em cada deslocamento de relógio de 0, +90 e -90 segundos; 60 ambíguos por perfil, total 180. Mesma referência lacrada para quatro alternativas. Limites definidos antes da rodada: pelo menos 95% de acerto e no máximo 1% de vínculos falsos. Os 48 pares recusados pelo grafo pertencem ao estrato ambíguo.

Limite da conclusão

Conclusão limitada à associação com sequência confiável e aos três deslocamentos ensaiados. Sem inferência sobre transações reais ou ausência de ordem de origem.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.