小圓頭媽媽　試作版 v0.4



香港版加固入門指南

（開始加副食品）

給第一胎香港媽媽的
六至十二個月固體食物實用路線圖

產品名稱建議（二選一）

① 《六個月開始：香港版加固入門指南》
② 《Baby 食第一口：港媽 Starting Solids 實用手冊》

建議定價

HKD $88

請先閱讀免責聲明：本指南非醫療／營養師診斷或個別建議，不能取代母嬰健康院或醫生意見。 內容參考衞生署家庭健康服務公開資料。詳見第 2 章。

為香港第一胎媽媽而寫 • 溫暖、實用、可打印

目錄

1. 給第一胎媽媽的信
2. 免責聲明與官方來源
3. 寶寶準備好未？檢查表
4. 第 1–2 週：點樣開始
5. 6–7 個月：質感、鐵質與港式簡易食譜
6. 8–9 個月、10–12 個月：質感與手指食物
7. 新食物紀錄表（可打印）
8. 過敏徵狀：幾時求醫（高階原則）
9. 港爸媽常見問題 10 條
10. 下一步：聯絡與回饋

點樣用呢本指南？唔使一次過睇晒。寶寶近六個月時，由第 3、4 章開始； 入咗軌道再睇食譜同進展章；出街、長輩塞糖等情況，直接翻 FAQ。

1. 給第一胎媽媽的信

你好，我係小圓頭媽媽。

我有一個仔，亦同好多第一胎媽媽一樣，喺「開餐」嗰陣又期待又緊張： 街市買咩好？米糊定白粥？公公婆婆又遞嚟甜飲…… 我平時鍾意慢慢研究營養同嬰幼兒餵食資料，再對照香港母嬰健康院會提嘅重點， 想整理成一本實用、唔扮醫生嘅「香港版」加固入門小冊。

過程裏面，我亦親身經歷過仔仔偏食、對某啲質感猶豫、同一日胃口差天共地。 呢啲真實日子，令我更明白：路線圖有用，但每個寶寶節奏都唔同，耐心同觀察往往先至係關鍵。

呢本《加固入門指南》試作版，文字同例子全部重新撰寫， 內容對齊衞生署家庭健康服務（FHS）公開指引， 再加一啲港爸媽先會遇到嘅場景：米糊 vs 白粥、出街點餵、長輩塞糖…… 我唔會話「跟住我做就一定啱」；希望佢可以成為你同母嬰健康院之間嘅「實用地圖」—— 減低焦慮，保留彈性。

如果你用得着，歡迎之後回饋你覺得邊部分最有用；下一版可以更加貼地。

小圓頭媽媽
試作版 v0.4

（註：作者並非醫生／營養師；請以母嬰健康院及醫生意見為準。）

2. 免責聲明與官方來源

重要免責聲明（請細閱）

1. 非醫療／營養專業意見
本指南內容僅供一般育兒參考與教育用途，**並非醫療、營養師、護理或其他專業診斷、治療或個別化建議，亦不能取代**母嬰健康院、家庭醫生、兒科醫生或其他合資格醫護人員的意見。

2. 每個寶寶都不同
寶寶的發展進度、過敏史、早產情況、健康狀況與家庭飲食習慣各有差異。本指南所述時程與做法屬一般參考，並非適用於所有嬰幼兒的標準方案。

3. 過敏、哽噎及其他緊急情況
如懷疑食物過敏、進食困難、哽噎、呼吸困難、持續嘔吐、嚴重濕疹惡化或其他異常徵狀，請**立即尋求專業醫護協助**（包括母嬰健康院、家庭醫生、兒科醫生或急症服務）。本指南中有關過敏或安全的說明僅為高階原則，**不能代替臨床診斷**。

4. 內容來源
本指南主要參考香港衞生署**家庭健康服務（FHS）**公開網頁與小冊子要點整理而成；官方資料或會更新，請自行查閱最新版本。作者並非衞生署或母嬰健康院代表。

5. 作者身分
作者小圓頭媽媽是一位家長，平時喜歡研究營養與嬰幼兒餵食資料，亦有陪伴孩子經歷固體食物與偏食的真實經驗。作者**並非持牌醫生、註冊營養師或其他醫療專業人員**。

6. 購買與使用關係
購買或下載本指南**不會**構成作者與讀者之間的醫療、營養諮詢或其他專業服務關係。

7. 成果不作保證
嬰幼兒進食表現受多種因素影響。作者及出版方**不保證**使用本指南後必達任何特定結果（包括但不限於進食分量、接受新食物、減少偏食或避免過敏），亦**不就**因使用、未能使用或依賴本指南內容而引致的任何直接或間接損失承擔責任。使用本指南即表示你理解並接受以上條款。

官方參考來源（請自行查閱最新版本）

本指南主要參考香港衞生署家庭健康服務公開網頁與小冊子要點，包括：

- 《6至24個月嬰幼兒健康飲食（1）起步篇》
  https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/14727.html
- 《嬰幼兒飲食 — 引進固體食物過渡期》
  https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/30039.html
- 相關延伸：《進展篇（上）6–12個月》、《7日飲食全攻略》（可於 FHS 網站搜尋最新版本）

使用本指南前請記住

- 約六個月開始固體食物；**未足四個月切勿**給固體食物。
- 繼續母乳或配方奶；滿六個月後鐵質需要明顯上升。
- 本指南重點放在約 6–12 個月「入門至進展」，並非取代母嬰健康院跟進。



3. 寶寶準備好未？檢查表

衞生署家庭健康服務指出：將近六個月，大多數寶寶可以開始固體食物。 重點唔係「夠唔夠月份」咁簡單，而係睇發展表現。 早產寶寶可以以預產期計近六個月，並有以下表現時再開始。 若七個月仍未有相關表現，應請教醫護人員。

活動能力

- [ ] 可以靠椅背坐起來
- [ ] 頭部控制穩，能抬起頭部
- [ ] 能伸手抓物件

進食表現

- [ ] 對食物感興趣／望住你食嘢
- [ ] 表現出想吃的樣子
- [ ] 看見匙羹會張嘴
- [ ] 匙羹放進口裏時，嘴唇能合起含着匙羹
- [ ] 能閉上嘴巴吞嚥食物（唔係成日用舌頭頂出嚟）

溫馨提示：如果舌頭總是頂着匙羹、唔會吞嚥或成日吐出嚟， 可能仲未 ready。可以一星期後再試，唔使急。「未足四個月」嘅寶寶，無論幾「醒目」都唔好開始固體食物。

開始前再確認

- 日間餵試（方便觀察反應）
- 寶寶清醒、情緒安定；太肚餓或太攰都唔係好時機
- 餵奶前約 30 分鐘嘗試固體，之後再以母乳／配方奶補充

- 準備柔軟、唔太深嘅匙羹；餐椅安全舒適



4. 第 1–2 週：點樣開始

呢兩星期嘅目標唔係「食得多」，而係**學習吞嚥、適應匙羹、觀察反應**。 奶仍然係主食。

分量同時間

- 每天一次，由 **1–2 茶匙**開始
- 可在餵奶前約 30 分鐘給予固體食物
- 選擇日間時段，方便觀察有無過敏或不適
- 願意食可以稍為加，但仍以奶為主；唔好硬塞

匙羹技巧（實用版）

1. 清潔小手同面，圍上口水肩，移開電視／玩具干擾。
2. 讓寶寶坐好（高餐椅較理想），你同佢面對面。
3. 讓佢睇到匙羹上嘅食物。
4. 等佢張嘴，把匙羹放在下唇。
5. 佢合嘴後，以水平方向抽出匙羹——**唔好將食物倒入口內**。
6. 跟住佢嘅節奏；表現吃飽（避開匙羹、推開、拗背）就停。

新食物原則

- 每次只引入一種新食物
- 由少量開始，連續試 **2–4 天**，觀察過敏
- 食物要煮熟透；無固定先後次序
- 初時可選加鐵嬰兒穀物糊／粥糊，再加入肉蓉、菜蓉或果蓉

第一週超簡計劃例：第1–3日加鐵米糊／粥糊； 第4–6日加入南瓜蓉或番薯蓉；第7日起再試一種軟水果（如香蕉或啤梨）。 只係例子，可按家中食材調整。記得一次一樣新食材。



5. 6–7 個月：質感、鐵質與港式食材

滿六個月後，單靠母乳往往未能滿足鐵質需要。 固體食物除咗補充營養，亦幫助咀嚼發展同接受多樣味道。 質感由**幼滑糊**開始，適應後轉**較稠**。

家常第一口（無固定次序）

- **穀物：**粥糊、加鐵嬰兒穀物糊（米／麥／燕麥等）
- **瓜菜：**南瓜、莧菜、菠菜、番薯（煮軟磨蓉）
- **水果：**香蕉、啤梨、桃、蘋果、木瓜（熟軟）
- **肉蛋魚：**肉蓉、蛋黃、魚、豬／雞肝（適量、煮熟）

鐵質豐富例子：蛋黃、深绿葉菜、肝、豆腐、豆蓉、魚、肉。 可把一兩茶匙蛋黃加少量暖水／奶調成糊；亦可混入粥或穀物糊。

暫時避免／特別小心

- **一歲以下忌蜜糖**（肉毒桿菌芽胞風險）
- 寶寶無需要果汁；避免含糖飲品、汽水、茶、咖啡
- 高甲基汞魚類（如鯊魚、劍魚、旗魚、部分吞拿魚等）
- 未煮熟食物、未經巴士德消毒奶製品
- 調味料：鹽、豉油、雞粉等（濃味不利接受淡食，鈉亦偏高）
- 哽噎風險：硬細小、滑溜黏性食物；去骨去籽

過敏性食物（奶製品、蛋、花生、魚、甲殼類、果仁、小麥、大豆等） 可在約六個月、寶寶準備好時引入；嚴重濕疹或已知過敏應先咨詢醫生。 延遲引入並不能降低過敏病發機會（按 FHS 公開資訊）。

關於 BLW

Baby-led weaning（BLW）係一開始就畀長條軟食，讓寶寶自己拿着食。 前提係：坐穩、對食物有興趣、會伸手抓放入口。 若六個月仍未會主動拿食物入口，宜先用匙羹餵鐵質豐富食物蓉，優先滿足營養；待就

緒再加手指食物。 試 BLW 兩星期仍只把玩唔食，建議先轉回匙羹鐵質蓉。

維他命 D：吃母乳（全母乳或以母乳加配方奶）的寶寶， 應繼續每天服用 **10 微克（10µg）**維他命 D 補充劑至 12 個月大（按 FHS）。

港式簡易食譜 8 款（少工具、家常）

以下食譜為一般家庭做法示例，分量可按寶寶胃口微調。工具：濾網／磨板／叉／攪拌機其中一樣即可。唔加鹽豉油。

① 加鐵米糊／穀物糊

材料：加鐵嬰兒穀物粉；溫開水／母乳／配方奶。

做法：按包裝說明，分數次加入液體拌至幼滑；可調稀稠度。適合最初期練習匙羹。

② 白粥糊（過濾版）

材料：白米少量、適量水。

做法：煲至極腍，用濾網壓成幼滑粥糊。後期可減少過濾，保留少少質感。（初期鐵質通常不及加鐵米糊，可與蛋黃／肉蓉同用。）

③ 南瓜蓉

材料：南瓜小塊。

做法：蒸／煮至軟，用匙壓蓉或磨板磨蓉；太稠可加少許暖水／奶。可單獨食，或混入已接受嘅米糊。

④ 番薯蓉

材料：番薯小塊。

做法：去皮煮軟，趁熱壓蓉；可用濾網令質感更滑。甜味天然，好多寶寶易接受。

⑤ 菠菜／莧菜蓉

材料：菠菜或莧菜嫩葉。

做法：洗淨煮軟，切碎，用濾網壓成蓉。可混入粥糊。深绿葉菜有助鐵質多樣性。

⑥ 香蕉／啤梨／木瓜蓉

材料：熟軟香蕉、啤梨、蘋果或木瓜。

做法：匙刮蓉；有顆粒則過濾。蘋果／啤梨可先蒸軟再壓。一次引入一種水果，觀察 2–4 日。

⑦ 蛋黃糊

材料：焓熟雞蛋黃 1 個、少量暖水／奶。

做法：用叉壓碎蛋黃，加液體調成糊。可由半茶匙開始。屬鐵質豐富選擇之一（按 FHS 示例方向）。

⑧ 雞肉／魚肉稀蓉粥

材料：白粥糊、去皮去骨雞肉或魚肉少許。

做法：肉類煮熟剁極碎或攪蓉，混入粥糊至幼滑。魚肉務必徹底去骨。一次只加一種肉／魚。

進階小配搭（寶寶已接受個別食材後）：蛋黃＋菜心米糊；南瓜＋少許雞肉蓉粥；木瓜蓉作茶點。仍遵守「一次一樣新食材」。



6. 8–9 個月、10–12 個月進展

質感要循序漸進：約 6 個月幼滑糊 → 7–8 個月稠糊／泥蓉 → 9–11 個月含柔軟顆粒（如菜肉粥）→ 接近一歲可走向軟飯與切碎肉菜。 始終按寶寶咀嚼能力調整，唔使同人比較。

8–9 個月：加質感、學自己食

- 多數約 8 個月已開始能吃剁得較細的食物；用牙齦磨爛
- 若長期只吃極滑糊，日後可能更難接受粗糙質感
- 轉質感初期可能吃慢、吃少、吐出甚至作嘔——可稍為弄細少少再試
- 可開始提供合適手指食物（軟、腍、條狀約 7–10 cm），旁觀守護
- 約 7–9 個月起可讓寶寶學用杯子；與家人同桌
- 正餐漸包含穀物＋菜＋肉魚蛋豆；分量足時可取代一餐奶（按 FHS 方向）

10–12 個月：更接近家常

- 菜肉粥、柔軟顆粒、切碎軟菜肉；逐步減少「過篩」
- 奶次／奶量通常隨固體增加而自然減少；順應寶寶需要
- 繼續多樣化：穀物、蔬果、肉魚蛋豆；一歲前唔好用普通牛奶取代母乳／配方奶
- 手指食物可改較小塊，練習拇指食指撿拾

哽噎安全提醒

- 避免硬而小、滑溜黏性（如湯丸）、未去骨肉魚、未去籽圓形水果整顆
- 提子／車厘子等須切小塊；進食時坐穩、有大人看管

> **出街簡版：**帶備已適應的食物、匙羹、圍兜；選衛生及有嬰兒座位的食肆； 可選軟瓜菜、白粥、蒸蛋（視乎寶寶已接受食材）。唔使完美，安全同淡味優先。

7. 新食物紀錄表（可打印）

每次只引入一種新食物，連續觀察 2–4 天。可用鉛筆填寫，影印多頁。

日期	新食物	分量	第幾日	皮膚／腸胃／其他	結果

結果欄可寫：OK／再觀察／暫停咨詢醫生。懷疑過敏請記錄時間、徵狀同進食內容，方便求醫說明。

簡易一週總覽（自行複印）

	一	二	三	四	五	六	日
早餐固體							
午餐固體							
晚餐固體							
新食物？							
備註							

8. 過敏徵狀：幾時求醫（高階原則）

以下為家庭健康服務公開資訊整理的一般原則，**不能代替醫生診斷**。 若你懷疑食物過敏，請咨詢家庭醫生；徵狀嚴重須立即到醫院求診。

可能在進食後數小時內出現

- 較常見：風疹塊（蕁麻疹）、濕疹惡化；眼／舌／臉／嘴／唇腫脹；腹瀉、嘔吐
- 較罕有但嚴重：呼吸困難、休克 → **立即求醫／急救**

可能隔一兩天才較明顯

- 濕疹、持續嘔吐、氣喘、便秘、腹部絞痛等（需專業評估）

家長可以做的事

- 記錄：食物名稱、分量、進食時間、徵狀出現時間
- 暫停該食物，咨詢醫生後再按指示嘗試
- 已確診過敏：必須遵照醫生指示進食
- 嚴重濕疹或已知食物過敏：引入高風險食物前先問醫生

較常被提及的過敏相關食物包括：牛奶及乳製品、蛋、花生、魚、甲殼類海產、 果仁、小麥、大豆、燕窩等。約六個月、準備好時可引入； 延遲引入並非預防過敏的有效做法（按 FHS）。



9. 港爸媽常見問題

Q1. 米糊同白粥，邊樣先開始好？

FHS 指出加鐵嬰兒穀物糊的鐵質通常較白粥多（請睇營養標籤）。初期分量少，有家長覺米糊方便；當分量增加，一般亦可吃米粥，並加入蛋黃、肝、深绿菜、豆腐、魚或肉等，鐵質較易吸收，亦有助學咀嚼。兩者可按家庭情況搭配，唔一定互斥。

Q2. 開始食固體，要唔要轉 2 號奶？

六個月以上可以繼續 1 號或轉 2 號；但轉 2 號並非必要。母乳或配方奶，加上營養合適的固體食物，已可滿足需要（按 FHS）。

Q3. 開始食固體仲要唔要餵母乳？維他命 D 呢？

應繼續母乳，可持續獲得免疫抗體等好處。吃母乳（全母乳或以母乳加配方奶）的寶寶，應繼續每天 10μg 維他命 D 至 12 個月。

Q4. 可唔可以一開始就做 BLW？

要寶寶坐穩、有興趣、會主動抓食物放入口。若未就緒，宜先匙羹餵鐵質豐富食物蓉，優先營養；之後再加手指食物。BLW 兩星期仍不進食，建議先回鐵質蓉匙餵。

Q5. 出街／去酒樓點餵？

帶備熟悉食物同餐具；揀乾淨、有嬰兒座的地方；選淡味、軟腍、已試過無問題的食材。唔好臨時試全新高風險食物。奶仍可按平時節奏。

Q6. 公公婆婆塞糖水、餅乾、蜜糖點算？

一歲以下忌蜜糖；含糖飲品增加蛀牙且營養價值低；寶寶無需要果汁。可溫和解釋「醫生／母嬰健康院話一歲前唔好」，並預備水果蓉或已接受的茶點代替。家庭溝通比爭辯更有效——把呢頁指南傳俾屋企人亦得。

Q7. 寶寶吐低／扮鬼臉係咪唔鐘意？

初試新食物猶疑或特別表情，唔等於拒絕。只要仲張嘴就可以繼續。不願試可隔 1–2 星期再來。有寶寶要試 8–15 次先慢慢接受——耐心係關鍵。

Q8. 食幾多先算夠？可唔可以同隔壁 BB 比較？

剛開始每天一次一兩茶匙就好正常。吃多少應由寶寶飽餓信號主導；多數 15–30 分鐘內吃飽。唔好強迫清碟。生長受遺傳等多因素影響，跟母嬰健康院生長圖同醫護建議最穩陣。

Q9. 過敏食物係咪要拖到一歲之後？

按 FHS：未足四個月不應固體；約六個月開始固體時，可讓準備好的寶寶嘗試這類食物。延遲引入並不能減低濕疹或過敏病發機會。嚴重濕疹／過敏史先問醫生。

Q10. 要唔要買貴價 baby food 機？

唔一定。濾網、叉、磨板、小型攪拌機已夠初期用。重點係熟透、質感合適、衛生、淡味同鐵質食物，而唔係器材價錢。

10. 下一步

如果你覺得呢本試作版有幫助，歡迎之後回饋邊部分最實用； 我亦可能會繼續整理更多港式日常餵食小筆記。

聯絡（佔位符 — 出版前請自行替換）

網站／商店頁：[請貼上你的網址]
電郵：simple.mum.hk@gmail.com
Instagram：@little.round.mama（顯示名：小圓頭媽媽）

給自己的三件小事

- 約六個月、見到準備好信號，先開始；未足四個月絕不動固體。
- 鐵質食物＋繼續奶＋（母乳寶寶）維他命 D 10μg／日至 12 個月。
- 有疑問，找母嬰健康院／醫生——呢本指南係地圖，唔係診斷書。

多謝你信任呢份香港版試作。

小圓頭媽媽　加固入門指南 v0.4

官方參考：
https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/14727.html
https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/30039.html

© 試作版 v0.4　內容為原創撰寫，結構供實用路線圖用途。 轉載或出售前請由 小圓頭媽媽 自行更新聯絡、定價與法律條款。