小圓頭媽媽　試作版 v0.5



《六個月開始：香港台灣版加固入門指南》

加固／副食品　・　六至十二個月固體食物實用路線圖

給第一胎香港同台灣媽媽

產品正式名稱（已鎖定）

《六個月開始：香港台灣版加固入門指南》

香港口語常用「加固」；台灣與書面語多稱「副食品」。本指南兩者並用，方便兩地爸媽對照。

請先閱讀免責聲明：本指南非醫療／營養師診斷或個別建議，不能取代母嬰健康院、兒科或家庭醫生意見。 內容參考香港衞生署家庭健康服務（FHS），以及台灣衛生福利部／國民健康署公開之嬰幼兒副食品相關衛教資料。詳見第 2 章。

為香港・台灣第一胎媽媽而寫　・　溫暖、實用、可打印

目錄

1. 給第一胎香港・台灣媽媽的信
2. 免責聲明與官方來源
3. 寶寶準備好未？檢查表
4. 第 1–2 週：點樣開始
5. 6–7 個月：質感、鐵質與港台簡易食譜
6. 8–9 個月、10–12 個月：質感與手指食物
7. 新食物紀錄表（可打印）
8. 過敏徵狀：幾時求醫（高階原則）
9. 港台爸媽常見問題 10 條
10. 下一步：聯絡與回饋

點樣用呢本指南？唔使一次過睇晒。寶寶近六個月時，由第 3、4 章開始； 入咗軌道再睇食譜同進展章；出街、長輩塞糖等情況，直接翻港台爸媽 FAQ。

1. 給第一胎香港・台灣媽媽的信

你好，我係小圓頭媽媽。

我有一個仔，亦同好多第一胎媽媽一樣，喺「開餐／開始副食品」嗰陣又期待又緊張： 街市／市場買咩好？米糊定白粥？公公婆婆又遞嚟甜飲…… 我平時鍾意慢慢研究營養同嬰幼兒餵食資料，再對照香港母嬰健康院、以及台灣兒科／衛教會提嘅重點， 想整理成一本實用、唔扮醫生嘅「香港台灣版」加固（副食品）入門小冊。

過程裏面，我亦親身經歷過仔仔偏食、對某啲質感猶豫、同一日胃口差天共地。 呢啲真實日子，令我更明白：路線圖有用，但每個寶寶節奏都唔同，耐心同觀察往往先至係關鍵。

呢本《六個月開始：香港台灣版加固入門指南》試作版，文字同例子全部重新撰寫， 內容對齊香港衞生署家庭健康服務（FHS）公開指引，並參考台灣衛生福利部／國民健康署公開之嬰幼兒副食品衛教要點， 再加一啲港台爸媽先會遇到嘅場景：米糊 vs 白粥、街市／市場買菜、出街點餵、長輩塞糖…… 我唔會話「跟住我做就一定啱」；希望佢可以成為你同母嬰健康院／兒科之間嘅「實用地圖」—— 減低焦慮，保留彈性。

如果你用得着，歡迎之後回饋你覺得邊部分最有用；下一版可以更加貼兩地日常。

小圓頭媽媽
試作版 v0.5　香港台灣版

（註：作者並非醫生／營養師；請以母嬰健康院、兒科／家庭醫生意見為準。）

2. 免責聲明與官方來源

重要免責聲明（請細閱）

1. 非醫療／營養專業意見
本指南內容僅供一般育兒參考與教育用途，**並非醫療、營養師、護理或其他專業診斷、治療或個別化建議，亦不能取代**母嬰健康院、兒科、家庭醫生或其他合資格醫護人員的意見。

2. 每個寶寶都不同
寶寶的發展進度、過敏史、早產情況、健康狀況與家庭飲食習慣各有差異。本指南所述時程與做法屬一般參考，並非適用於所有嬰幼兒的標準方案。

3. 過敏、哽噎及其他緊急情況
如懷疑食物過敏、進食困難、哽噎、呼吸困難、持續嘔吐、嚴重濕疹惡化或其他異常徵狀，請**立即尋求專業醫護協助**（包括母嬰健康院、兒科、家庭醫生或急症服務）。本指南中有關過敏或安全的說明僅為高階原則，**不能代替臨床診斷**。

4. 內容來源
本指南主要參考香港衞生署**家庭健康服務（FHS）**公開網頁與小冊子要點，以及台灣**衛生福利部／國民健康署（HPA）**公開之嬰幼兒副食品／兒童衛教相關資料整理而成；官方資料或會更新，請自行查閱最新版本。作者並非上述機構、母嬰健康院或兒科服務之代表。

5. 作者身分
作者小圓頭媽媽是一位家長，平時喜歡研究營養與嬰幼兒餵食資料，亦有陪伴孩子經歷固體食物與偏食的真實經驗。作者**並非持牌醫生、註冊營養師或其他醫療專業人員**。

6. 購買與使用關係
購買或下載本指南**不會**構成作者與讀者之間的醫療、營養諮詢或其他專業服務關係。

7. 成果不作保證
嬰幼兒進食表現受多種因素影響。作者及出版方**不保證**使用本指南後必達任何特定結果（包括但不限於進食分量、接受新食物、減少偏食或避免過敏），亦**不就**因使用、未能使用或依賴本指南內容而引致的任何直接或間接損失承擔責任。使用本指南即表示你理解並接受以上條款。

官方參考來源（請自行查閱最新版本）

香港——衞生署家庭健康服務公開網頁與小冊子要點，包括：

- 《6至24個月嬰幼兒健康飲食（1）起步篇》 https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/14727.html
- 《嬰幼兒飲食 — 引進固體食物過渡期》 https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/30039.html
- 相關延伸：《進展篇（上）6–12個月》、《7日飲食全攻略》（可於 FHS 網站搜尋最新版本）

台灣——衛生福利部／國民健康署公開衛教（高階參考，請以官網最新版為準）：

- 國民健康署《兒童衛教手冊》（含「副食品添加」章節；出版年月見官網最新版）
  https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=1459
- 衛生福利部公開衛教：約六個月後逐步添加副食品等新手爸媽常見問題說明
  https://www.mohw.gov.tw/cp-2704-82800-1.html
- 延伸：可於國健署「健康九九＋」網站搜尋「嬰兒期營養」「副食品」取得更多公開資料

兩地官方細節（例如觀察天數、個別營養素補充建議）或會略有不同；有疑問請以你所在地的母嬰健康院／兒科／家庭醫生指示為準。作者並非代表上述任何機構。

使用本指南前請記住

- 約六個月開始固體食物／副食品；**未足四個月切勿**給固體食物。
- 繼續母乳或配方奶；滿六個月後鐵質需要明顯上升。
- 本指南重點放在約 6–12 個月「入門至進展」，並非取代母嬰健康院／兒科跟進。



3. 寶寶準備好未？檢查表

香港衞生署家庭健康服務指出：將近六個月，大多數寶寶可以開始固體食物。 台灣衛福部／國健署公開衛教亦建議約六個月後逐步添加副食品（細節請查官網最新版）。 重點唔係「夠唔夠月份」咁簡單，而係睇發展表現。 早產寶寶可以以預產期計近六個月，並有以下表現時再開始。 若七個月仍未有相關表現，應請教母嬰健康院／兒科／家庭醫生。

活動能力

- [ ] 可以靠椅背坐起來
- [ ] 頭部控制穩，能抬起頭部
- [ ] 能伸手抓物件

進食表現

- [ ] 對食物感興趣／望住你食嘢
- [ ] 表現出想吃的樣子
- [ ] 看見匙羹會張嘴
- [ ] 匙羹放進口裏時，嘴唇能合起含着匙羹
- [ ] 能閉上嘴巴吞嚥食物（唔係成日用舌頭頂出嚟）

溫馨提示：如果舌頭總是頂着匙羹、唔會吞嚥或成日吐出嚟， 可能仲未 ready。可以一星期後再試，唔使急。「未足四個月」嘅寶寶，無論幾「醒目」都唔好開始固體食物。

開始前再確認

- 日間餵試（方便觀察反應）
- 寶寶清醒、情緒安定；太肚餓或太攰都唔係好時機

- 餵奶前約 30 分鐘嘗試固體，之後再以母乳／配方奶補充
- 準備柔軟、唔太深嘅匙羹；餐椅安全舒適



4. 第 1–2 週：點樣開始

呢兩星期嘅目標唔係「食得多」，而係**學習吞嚥、適應匙羹、觀察反應**。 奶仍然係主食。

分量同時間

- 每天一次，由 **1–2 茶匙**開始
- 可在餵奶前約 30 分鐘給予固體食物
- 選擇日間時段，方便觀察有無過敏或不適
- 願意食可以稍為加，但仍以奶為主；唔好硬塞

匙羹技巧（實用版）

1. 清潔小手同面，圍上口水肩，移開電視／玩具干擾。
2. 讓寶寶坐好（高餐椅較理想），你同佢面對面。
3. 讓佢睇到匙羹上嘅食物。
4. 等佢張嘴，把匙羹放在下唇。
5. 佢合嘴後，以水平方向抽出匙羹——**唔好將食物倒入口內**。
6. 跟住佢嘅節奏；表現吃飽（避開匙羹、推開、拗背）就停。

新食物原則

- 每次只引入一種新食物
- 由少量開始，連續試 **2–4 天**，觀察過敏
- 食物要煮熟透；無固定先後次序
- 初時可選加鐵嬰兒穀物糊／粥糊，再加入肉蓉、菜蓉或果蓉

第一週超簡計劃例：第1–3日加鐵米糊／粥糊； 第4–6日加入南瓜蓉或番薯蓉；第7日起再試一種軟水果（如香蕉或啤梨）。 只係例子，可按家中食材調整。記得一次一樣新食材。



5. 6–7 個月：質感、鐵質與港台食材

滿六個月後，單靠母乳往往未能滿足鐵質需要。 固體食物（副食品）除咗補充營養，亦幫助咀嚼發展同接受多樣味道。 質感由**幼滑糊**開始，適應後轉**較稠**。

以下食材喺香港街市同台灣傳統市場／超市都好容易買到；名稱可能略有不同（例如香港多叫「番薯」，台灣多叫「地瓜」），揀新鮮、易煮軟嘅就得。

家常第一口（無固定次序）

- **穀物：**粥糊、加鐵嬰兒穀物糊（米／麥／燕麥等）
- **瓜菜：**南瓜、莧菜、菠菜、番薯／地瓜（煮軟磨蓉）
- **水果：**香蕉、啤梨、桃、蘋果、木瓜（熟軟）
- **肉蛋魚：**肉蓉、蛋黃、魚、豬／雞肝（適量、煮熟）

鐵質豐富例子：蛋黃、深绿葉菜、肝、豆腐、豆蓉、魚、肉。 可把一兩茶匙蛋黃加少量暖水／奶調成糊；亦可混入粥或穀物糊。

暫時避免／特別小心

- **一歲以下忌蜜糖**（肉毒桿菌芽胞風險）
- 寶寶無需要果汁；避免含糖飲品、汽水、茶、咖啡
- 高甲基汞魚類（如鯊魚、劍魚、旗魚、部分吞拿魚等）
- 未煮熟食物、未經巴士德消毒奶製品
- 調味料：鹽、豉油、雞粉等（濃味不利接受淡食，鈉亦偏高）
- 哽噎風險：硬細小、滑溜黏性食物；去骨去籽

過敏性食物（奶製品、蛋、花生、魚、甲殼類、果仁、小麥、大豆等） 可在約六個月、寶寶準備好時引入；嚴重濕疹或已知過敏應先咨詢醫生。 延遲引入並不能降低過敏病發機會（按 FHS 公開資訊）。

關於 BLW

Baby-led weaning（BLW）係一開始就畀長條軟食，讓寶寶自己拿着食。 前提係：坐穩、對食物有興趣、會伸手抓放入口。 若六個月仍未會主動拿食物入口，宜先用匙羹餵鐵質豐富食物蓉，優先滿足營養；待就緒再加手指食物。 試 BLW 兩星期仍只把玩唔食，建議先轉回匙羹鐵質蓉。

維他命 D：吃母乳（全母乳或以母乳加配方奶）的寶寶， 應繼續每天服用 **10 微克（10µg）**維他命 D 補充劑至 12 個月大（按 FHS）。

港台簡易食譜 8 款（少工具、家常）

以下食譜為一般家庭做法示例，分量可按寶寶胃口微調。材料喺香港街市同台灣市場都易買。工具：濾網／磨板／叉／攪拌機其中一樣即可。唔加鹽、醬油／豉油。

① 加鐵米糊／穀物糊

材料：加鐵嬰兒穀物粉；溫開水／母乳／配方奶。

做法：按包裝說明，分數次加入液體拌至幼滑；可調稀稠度。適合最初期練習匙羹。

② 白粥糊（過濾版）

材料：白米少量、適量水。

做法：煲至極腍，用濾網壓成幼滑粥糊。後期可減少過濾，保留少少質感。（初期鐵質通常不及加鐵米糊，可與蛋黃／肉蓉同用。）

③ 南瓜蓉

材料：南瓜小塊（港台街市／市場均易買）。

做法：蒸／煮至軟，用匙壓蓉或磨板磨蓉；太稠可加少許暖水／奶。可單獨食，或混入已接受嘅米糊。

④ 番薯／地瓜蓉

材料：番薯（台灣常稱地瓜）小塊。

做法：去皮煮軟，趁熱壓蓉；可用濾網令質感更滑。甜味天然，好多寶寶易接受。港台街市／市場都常見。

⑤ 菠菜／莧菜蓉

材料：菠菜或莧菜嫩葉。

做法：洗淨煮軟，切碎，用濾網壓成蓉。可混入粥糊。深绿葉菜有助鐵質多樣性。

⑥ 香蕉／啤梨／木瓜蓉

材料：熟軟香蕉、啤梨、蘋果或木瓜。

做法：匙刮蓉；有顆粒則過濾。蘋果／啤梨可先蒸軟再壓。一次引入一種水果，觀察 2–4 日。

⑦ 蛋黃糊

材料：焓熟雞蛋黃 1 個、少量暖水／奶。

做法：用叉壓碎蛋黃，加液體調成糊。可由半茶匙開始。屬鐵質豐富選擇之一（按 FHS 示例方向）。

⑧ 雞肉／魚肉稀蓉粥

材料：白粥糊、去皮去骨雞肉或魚肉少許。

做法：肉類煮熟剁極碎或攪蓉，混入粥糊至幼滑。魚肉務必徹底去骨。一次只加一種肉／魚。

進階小配搭（寶寶已接受個別食材後）：蛋黃＋菜心米糊；南瓜＋少許雞肉蓉粥；木瓜蓉作茶點。仍遵守「一次一樣新食材」。



6. 8–9 個月、10–12 個月進展

質感要循序漸進：約 6 個月幼滑糊 → 7–8 個月稠糊／泥蓉 → 9–11 個月含柔軟顆粒（如菜肉粥）→ 接近一歲可走向軟飯與切碎肉菜。 始終按寶寶咀嚼能力調整，唔使同人比較。

8–9 個月：加質感、學自己食

- 多數約 8 個月已開始能吃剁得較細的食物；用牙齦磨爛
- 若長期只吃極滑糊，日後可能更難接受粗糙質感
- 轉質感初期可能吃慢、吃少、吐出甚至作嘔——可稍為弄細少少再試
- 可開始提供合適手指食物（軟、腍、條狀約 7–10 cm），旁觀守護
- 約 7–9 個月起可讓寶寶學用杯子；與家人同桌
- 正餐漸包含穀物＋菜＋肉魚蛋豆；分量足時可取代一餐奶（按 FHS 方向）

10–12 個月：更接近家常

- 菜肉粥、柔軟顆粒、切碎軟菜肉；逐步減少「過篩」
- 奶次／奶量通常隨固體增加而自然減少；順應寶寶需要
- 繼續多樣化：穀物、蔬果、肉魚蛋豆；一歲前唔好用普通牛奶取代母乳／配方奶
- 手指食物可改較小塊，練習拇指食指撿拾

哽噎安全提醒

- 避免硬而小、滑溜黏性（如湯丸）、未去骨肉魚、未去籽圓形水果整顆
- 提子／車厘子等須切小塊；進食時坐穩、有大人看管

出街簡版（港台通用）：帶備已適應的食物、匙羹、圍兜；選衛生及有嬰兒座位的食肆／餐廳； 可選軟瓜菜、白粥、蒸蛋（視乎寶寶已接受食材）。唔使完美，安全同淡味優先。

7. 新食物紀錄表（可打印）

每次只引入一種新食物，連續觀察 2–4 天。可用鉛筆填寫，影印多頁。

日期	新食物	分量	第幾日	皮膚／腸胃／其他	結果

結果欄可寫：OK／再觀察／暫停咨詢醫生。懷疑過敏請記錄時間、徵狀同進食內容，方便求醫說明。

簡易一週總覽（自行複印）

	一	二	三	四	五	六	日
早餐固體							
午餐固體							
晚餐固體							
新食物？							
備註							

8. 過敏徵狀：幾時求醫（高階原則）

以下為家庭健康服務等公開資訊整理的一般原則，**不能代替醫生診斷**。 若你懷疑食物過敏，請咨詢母嬰健康院／兒科／家庭醫生；徵狀嚴重須立即到醫院求診。

可能在進食後數小時內出現

- 較常見：風疹塊（蕁麻疹）、濕疹惡化；眼／舌／臉／嘴／唇腫脹；腹瀉、嘔吐
- 較罕有但嚴重：呼吸困難、休克 → **立即求醫／急救**

可能隔一兩天才較明顯

- 濕疹、持續嘔吐、氣喘、便秘、腹部絞痛等（需專業評估）

家長可以做的事

- 記錄：食物名稱、分量、進食時間、徵狀出現時間
- 暫停該食物，咨詢醫生後再按指示嘗試
- 已確診過敏：必須遵照醫生指示進食
- 嚴重濕疹或已知食物過敏：引入高風險食物前先問醫生

較常被提及的過敏相關食物包括：牛奶及乳製品、蛋、花生、魚、甲殼類海產、 果仁、小麥、大豆、燕窩等。約六個月、準備好時可引入； 延遲引入並非預防過敏的有效做法（按 FHS）。



9. 港台爸媽常見問題

Q1. 米糊同白粥，邊樣先開始好？

FHS 指出加鐵嬰兒穀物糊的鐵質通常較白粥多（請睇營養標籤）。初期分量少，有家長覺米糊方便；當分量增加，一般亦可吃米粥，並加入蛋黃、肝、深绿菜、豆腐、魚或肉等，鐵質較易吸收，亦有助學咀嚼。兩者可按家庭情況搭配，唔一定互斥。

Q2. 開始食固體，要唔要轉 2 號奶？

六個月以上可以繼續 1 號或轉 2 號；但轉 2 號並非必要。母乳或配方奶，加上營養合適的固體食物，已可滿足需要（按 FHS）。

Q3. 開始食固體仲要唔要餵母乳？維他命 D 呢？

應繼續母乳，可持續獲得免疫抗體等好處。吃母乳（全母乳或以母乳加配方奶）的寶寶，應繼續每天 10μg 維他命 D 至 12 個月。

Q4. 可唔可以一開始就做 BLW？

要寶寶坐穩、有興趣、會主動抓食物放入口。若未就緒，宜先匙羹餵鐵質豐富食物蓉，優先營養；之後再加手指食物。BLW 兩星期仍不進食，建議先回鐵質蓉匙餵。

Q5. 出街／去酒樓／餐廳點餵？

帶備熟悉食物同餐具；揀乾淨、有嬰兒座的地方；選淡味、軟腍、已試過無問題的食材。唔好臨時試全新高風險食物。奶仍可按平時節奏。港台食肆都一樣：安全、淡味優先。

Q6. 公公婆婆塞糖水、餅乾、蜜糖點算？

一歲以下忌蜜糖；含糖飲品增加蛀牙且營養價值低；寶寶無需要果汁。可溫和解釋「醫生／母嬰健康院／兒科話一歲前唔好」，並預備水果蓉或已接受的茶點代替。家庭溝通比爭辯更有效——把呢頁指南傳俾屋企人亦得。

Q7. 寶寶吐低／扮鬼臉係咪唔鐘意？

初試新食物猶疑或特別表情，唔等於拒絕。只要仲張嘴就可以繼續。不願試可隔 1–2 星期再來。有寶寶要試 8–15 次先慢慢接受——耐心係關鍵。

Q8. 食幾多先算夠？可唔可以同隔壁 BB 比較？

剛開始每天一次一兩茶匙就好正常。吃多少應由寶寶飽餓信號主導；多數 15–30 分鐘內吃飽。唔好強迫清碟。生長受遺傳等多因素影響，跟母嬰健康院／兒科生長圖同醫護建議最穩陣。

Q9. 過敏食物係咪要拖到一歲之後？

按 FHS：未足四個月不應固體；約六個月開始固體時，可讓準備好的寶寶嘗試這類食物。延遲引入並不能減低濕疹或過敏病發機會。嚴重濕疹／過敏史先問醫生。

Q10. 要唔要買貴價 baby food 機／副食品調理機？

唔一定。濾網、叉、磨板、小型攪拌機已夠初期用。重點係熟透、質感合適、衛生、淡味同鐵質食物，而唔係器材價錢。港台超市都有基本工具，唔使一開始就買齊套。

10. 下一步

如果你覺得呢本香港台灣版試作有幫助，歡迎之後回饋邊部分最實用； 我亦可能會繼續整理更多港台日常加固／副食品小筆記。

聯絡（佔位符 — 出版前請自行替換）

網站／商店頁：[請貼上你的網址]
電郵：simple.mum.hk@gmail.com
Instagram：@little.round.mama（顯示名：小圓頭媽媽）

給自己的三件小事

- 約六個月、見到準備好信號，先開始；未足四個月絕不動固體／副食品。
- 鐵質食物＋繼續奶＋（母乳寶寶）維他命 D 10μg／日至 12 個月（請同時跟從你所在地醫護建議）。
- 有疑問，找母嬰健康院／兒科／家庭醫生——呢本指南係地圖，唔係診斷書。

多謝你信任呢份香港台灣版試作。

小圓頭媽媽 《六個月開始：香港台灣版加固入門指南》 v0.5

官方參考（請查最新版）：
香港 FHS：
https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/14727.html
https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/30039.html
台灣國健署《兒童衛教手冊》：
https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=1459
衛福部新手爸媽衛教：
https://www.mohw.gov.tw/cp-2704-82800-1.html

© 試作版 v0.5　香港台灣版　內容為原創撰寫，結構供實用路線圖用途。 轉載或出售前請由 小圓頭媽媽 自行更新聯絡、定價與法律條款。