

Probabilistic Boosting Tree

背景

在真实的机器学习问题中，我们有时不仅要预估目标的均值，还要对目标取值的置信区间进行预估。特别是样本量比较少的场景下，比如广告营销的成本管理、金融产品的定价等，行为频率低，样本获取的成本高昂，单次行为背后往往都有大额的资金成本。这类相对低频的问题往往需要较深的人工干预，预估其目标变量的分布将为商业决策行为提供更充分的参考和依据。

目前我们调研到的一些分布预估方案中，主要方法的优缺点列举如下：

| 方法分类 | 举例 | 优点 | 缺点 |
|--------|---|---------------|--|
| 参数化方法 | LSS 类 (GamLSS/Gamboos 或 R 语言实现方法[1]。LSS 代表 location/shape/skewness。 | 原理简单，有现成实现 | 以 gamlss 为例，它是在广义线性模型上的扩展，缺少对交叉特征的处理能力，不适用于大数据和高维稀疏特征场景。 |
| 非参数化方法 | Gaussian Process Regression[2] / Distributional learning [3] | 不要求目标变量符合某种分布 | 计算量大，求解时间长，不适用于大数据和高维度稀疏特征场景。 |
| 其他方法 | Quantile Regression | 实现较为简单 | 需要对于每个 quantile 训练一个模型，不够灵活，且无法保序。 |

对于我们要解决的生产场景下的成本、曝光、转化分布问题，目前暂无案例可供借鉴，也无成熟的框架可供使用，因此我们提出了 Probabilistic Boosting Tree 的框架。

模型设计

设 y 为要估计的变量， x 是我们观测到的特征，我们需要计算目标变量 y 的分布，也即： $p(y|x)$ 。我们使用 boosting tree 的思路对目标进行估计。设树模型 T_1 的每个叶子节点 l_i 都是一个分布函数 $p_{l_i}(y)$ 。那么单颗树模型可以表示为：

$$p_{T_1}(y|x)$$

包含 d 颗树的概率树 Boosting 模型可以表示为：

$$q(y|x) = \frac{\prod_{i=0}^{d-1} p_{T_i}(y|x)}{C}$$

这里 C 相当于归一化项。从贝叶斯的角度来理解，

$$q_{T_m}(y|x) = \frac{p_{T_m}(y|x) \prod_{i=0}^{m-1} p_{T_i}(y|x)}{C}$$

$q_{T_{m-1}}(y|x) = \prod_{i=0}^{m-1} p_{T_i}(y|x)$ 相当于先验概率， $p_{T_m}(y|x)$ 相当于似然， q_{T_m} 相当于后验概率。

这里我们希望先验概率和后验概率有相同的数学表达，例如都服从 Gamma 分布 (Gamma 分布的定义域为 0 到正无穷，可能比正太分布更适合刻画某些真实场景下的问题)。

$$q_{T_m}(y|x) = \frac{1}{\Gamma(k_m)\theta_m^{k_m}} y^{k_m-1} e^{-\frac{y}{\theta_m}}$$

这时上式子中的似然函数的表达式会比较复杂，但如果我们仅仅对比先验分布与后验分布的差异，可以发现，先验分布乘以似然函数并且归一化以后，后验分布相对于先验分布的变化为： $k_{m-1} \rightarrow k_m$ ， $\theta_{m-1} \rightarrow \theta_m$ 。

设 $k_m = k_{m-1} + \Delta k$ ， $\theta_m = \theta_{m-1} + \Delta \theta$ ，因此我们只需要求解 Δk 和 $\Delta \theta$ 。




Figure 1: PBTree

- $\theta_{2,1} = \theta_0 + \Delta\theta_{1,1} + \Delta\theta_{2,1}$
- $\theta_{2,2} = \theta_0 + \Delta\theta_{1,1} + \Delta\theta_{2,2}$
- $\theta_{2,5} = \theta_0 + \Delta\theta_{1,2} + \Delta\theta_{2,1}$

设有 n 条样本，则第 m 轮的损失函数为：

$$L_m = -\log(\prod_{i=1}^n p(y_i | \theta_{m-1,i} + \Delta\theta_l, k_{m-1,i} + \Delta k_l)), \quad i \in S_{m,l}$$

$$\theta_{m-1,i} = \theta_0 + \sum_{j=0}^{m-1} \theta_l$$

$$k_{m-1,i} = k_0 + \sum_{j=0}^{m-1} k_l$$

$i \in S_{m,l}$ 表示样本 i 在第 m 轮被划分到第 l 个叶子节点。

寻找分裂点和求解 $\Delta\theta$ 、 Δk 的目标是使得上式最小化。

$$\arg \min_{S, \Theta, K} L_m$$

求解

$$L_m = -\log(\prod_{i=0}^n p(y_i | \theta_{m-1,i} + \Delta\theta_{l, \{i \in S_{m,l}\}}, k_{m-1,i} + \Delta k_{l, \{i \in S_{m,l}\}})) = -\sum_{i=0}^n \log(p(y_i | \theta_{m-1,i} + \Delta\theta_{l, \{i \in S_{m,l}\}}, k_{m-1,i} + \Delta k_{l, \{i \in S_{m,l}\}}))$$

设第 m 轮的节点 l 的样本为 $(x_i, y_i), i = \{1 \dots s\}$ 。采用类似梯度下降的方法：

$$\frac{\partial L_m}{\partial k_{m,l}} = -\sum_{i=1}^s (\log(\frac{y_i}{\theta_{m-1,l}}) + (k_{m-1,l}))$$

$$\frac{\partial L_m}{\partial \theta_{m,l}} = -\sum_{i=1}^s (\frac{y_i}{\theta_{m-1,l}^2} - \frac{k_{m-1,l}}{\theta_{m-1,l}})$$

设学习率为 η_1, η_2 ，则

$$\Delta k_{m,l} = \eta_1 \frac{\partial L_m}{\partial k_{m,l}}$$

$$\Delta \theta_{m,l} = \eta_2 \frac{\partial L_m}{\partial \theta_{m,l}}$$