

SOLICITUDE DE APROBACIÓN DE ANTEPROXECTO DO TRABALLO DE FIN DE MÁSTER

Máster universitario en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data

Entréguese na Administración da ETSE como mínimo tres meses antes da data de depósito do TFM.

1. Datos do/a Alumno/a			
Nome:	Raúl Alberto Barrantes Pampillo	DNI:	58057453R
Enderezo:	Rua Fernando III O Santo, 18, 7 Esquerda	Localidade:	Santiago de Compostela
Provincia:	A Coruña	C.P.:	15701
		Teléfono:	644926715
		Correo-e:	raul.pampillo@gmail.com
1. Requisitos			
O alumnado deberá estar matriculado na materia do TFM para poder presentar a proposta de anteproxecto.			
1. Datos do Traballo de Fin de Máster			
Título: Social Big Data y enfermedad mental: aplicación automática de nuevas técnicas discursivas a colecciones de redes sociales en contextos de enfermedades mentales.			
Titor/a:	David Losada Carril	Correo-e:	david.losada@usc.es
Cotitor/a:	Patricia Martín Rodilla	Correo-e:	patricia.martin.rodilla@udc.es
Cotitor/a:		Correo-e:	
(o titor debe ser PDI doutor. En caso de TFM's desenvolvidos en empresa o(s) supervisor(es) do TFM na empresa deben figurar aquí como cotitor(es) do TFM e debe figurar un titor académico (PDI) –artigo 5 do reglamento–)			
Áreas de coñecemento (do titor académico): Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial			
Departamento (do titor académico): Electrónica y computación			
A persoa que asina e cos datos que se indican solicita á Comisión Académica do Máster a aprobación do anteproxecto que se acompaña.			
Santiago de Compostela, de de 20__			
O/A alumno/a		Vº e Pr. O/A Titor(a)/Cotitor(a) do traballo	
Asdo:		Asdo:	

Á atención da Comisión Académica do Máster universitario en Tecnologías de Análisis de Datos
Masivos: Big Data

1. DESCRICIÓN DO ANTEPROXECTO

Título

Social Big Data y enfermedad mental: aplicación automática de nuevas técnicas discursivas a colecciones de redes sociales en contextos de enfermedades mentales.

Introdución

En las redes sociales se encuentran habitualmente textos escritos por personas diagnosticadas con enfermedades mentales. En base a esto se pueden encontrar factores discursivos en común. Se pueden usar métricas y patrones discursivos como factor diferencial e indicativo de textos producidos por personas diagnosticadas con depresión, comparándolos con población no diagnosticada. Estos patrones o pistas lingüísticas pueden indicar una patología mental que podrían facilitar o advertir el diagnóstico de tales enfermedades.

Primeramente, dentro de los textos en general se puede medir la coherencia por medio de la frecuencia de palabras dentro de las oraciones, mediante lo cual se asigna un índice de coherencia discursiva [3]. Por otro lado, existen palabras o tópicos que son más comunes dentro de los encontrados en los foros de redes sociales relacionados a salud mental

[2][11][12][13][14]. Utilizando elementos procedentes de este tipo de análisis se plantea evaluar factores en común entre los textos escritos por los diagnosticados por depresión.

Tomando como base del trabajo diferentes de textos de prueba y varios estudios que se han hecho al respecto, se pretende implementar y comparar una serie de métricas de coherencia discursiva con el fin de determinar qué elementos puede ser diferenciadores de las personas que sufren trastornos psicológicos como la depresión [9].

Motivación

Para el desarrollo del proyecto se van a usar como base colecciones de texto para estudios de depresión [1], se trata de publicaciones (posts o comentarios) realizadas por un conjunto de personas en la red social Reddit.

Se propone usar varios métodos para el análisis de los textos. Por un lado, Latent Semantic Analysis, construye un espacio 'semántico' con los términos más asociados entre sí y que conduce a una representación matricial [6]. Y por medio de su implementación en Genisim se representa esa información por medio de un modelo de espacio vectorial.

Por otro lado el marco de referencia proporcionado por CODRA (COMplete probabilistic Discriminative) analiza la estructura sintáctica de los textos y plantea las relaciones y la coherencia que existe en un texto en forma de árbol [7].

Una vez planteada la estructura semántica de las oraciones se pretende usar métricas de coherencia, con el fin de etiquetar los datos recopilados para su posterior análisis o entrenamiento. Las métricas de coherencia indican la calidad de un documento, y de este modo se puede intentar estudiar la generación de texto y su entendimiento [5][15]. Estas métricas indican lo coherente que es un texto dadas sus palabras y frecuencias de las mismas. Asimismo también se considerarán medidas de correlación entre oraciones del texto de una forma sintáctica y semántica [3].

Se pueden percibir atributos lingüísticos generales en común en textos de pacientes diagnosticados con depresión tales como expresiones relacionadas con conductas afectivas, términos relacionados con soporte social, o aspectos relacionados con elementos de anonimización [2][11][12][13][14]. Además se tendrá en cuenta la legibilidad de los textos, por medio de medidas aplicadas por las fórmulas Flesch Reading Ease y el nivel de grado Flesch-Kincaid [4].

Objetivos

- Buscar patrones que puedan ser usados para detectar índices de depresión.
- Desarrollar software que represente colecciones de textos disponibles en el área de análisis de lenguaje y trastornos depresivos.
- Desarrollar software que analice en términos de coherencia discursiva los textos escritos por distintos grupos de sujetos y visualice los resultados apropiadamente.

Relación con conocimientos e competencias proporcionadas por el Máster

- Modelos de predicción
- Técnicas de extracción de características en el texto
- Procesamiento de lenguaje natural
- Minería de textos

Plan de Trabajo

1. Definición del problema y anteproyecto.
2. Limpieza de datos
3. Análisis y exploración de los datos.
4. Cálculo de métricas de coherencia discursiva.
5. Evaluación de los modelos.
6. Análisis de las métricas evaluadas.
7. Desarrollo de software que integre todos los resultados del proyecto.

Bibliografía

[1] Losada David E., Crestani Fabio, A Test Collection for Research on Depression and Language Use, 2019

[2] Munmun De Choudhury, Sushovan De, Mental Health Discourse on reddit: Self-Disclosure, Social Support, and Anonymity, 2014

[3] Lapata Mirella, Barzilay Regina, Automatic Evaluation of Text Coherence: Models and Representations, 2014

[4] McNamara Danielle S., Louwerse Max M., Graesser Arthur C. , Coh-metrix: Automated cohesion and coherence scores. To predict text readability and facilitate comprehension, 2005

[5] Li Jiwei and Jurafsky Dan , Neural Net Models of Open-domain Discourse Coherence, 2017

[6] Deerwester Scott, Dumais Susan T. , Furnas George W., and Landauer Thomas K. Indexing by Latent Semantic Analysis, 1990

[7] Joty Shafiq, Carenini Giuseppe, Ng Raymond T. CODRA: A Novel Discriminative Framework for Rhetorical Analysis, 2015

- [8] Elsner Micha, Austerweil Joseph, and Charniak Eugene, A Unified Local and Global Model for Discourse Coherence, 2007
- [9] Barzilay Regina, Lapata Mirella, Modeling Local Coherence: An Entity-Based Approach, 2008.
- [10] Petersen Casper, Lioma Christina, Simonsen Jakob Grue, Larsen Birger, Entropy and Graph Based Modelling of Document Coherence using Discourse Entities: An Application to IR, 2015
- [11] Al-Mosaiwi, M., & Johnstone, T., Corrigendum: In an Absolute State: Elevated Use of Absolutist Words Is a Marker Specific to Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation, 2018
- [12] Ríssola Esteban, Losada David, Crestani Fabio. Discovering Latent Depression Patterns in Online Social Media, 2019
- [13] Morales Michelle Renee, Scherer Stefan, Levitan Rivka, A Cross-modal Review of Indicators for Depression Detection Systems, 2017
- [14] Dan Iter, Jong H. Yoon, and Dan Jurafsky, Automatic Detection of Incoherent Speech for Diagnosing Schizophrenia, 2018.
- [15] Duran Nicholas, Bellissens Cedrick, Taylor Roger, McNamara Danielle. Quantifying Text Difficulty with Automated Indices of Cohesion and Semantics
- [16] Lal Alice, Tetreault Joel, Discourse Coherence in the Wild: A Dataset, Evaluation and Methods, 2018
- [17] Rehurek Radim and Sojka Petr. Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora, 2010

Observacións.

FASES DO TRABALLO E ESTIMACIÓN TEMPORAL

Un traballo de fin de máster suporá 450 horas de traballo total do alumno (incluindo titorías, traballo autónomo e avaliación).

Dedicación semanal prevista (en horas/semana): 25 horaa por semana

Fase Estimación temporal (en semanas)	18
1. Definición do problema y anteproyecto.	2
2. Limpieza de datos	2
3. Análisis y exploración de los datos.	2
4. Cómputo de métricas de coherencia discursiva.	3
5. Evaluación de los modelos.	3
6. Análisis de las métricas evaluadas.	3
7. Desarrollo de software que integre todos los resultados del proyecto.	3