

标度—能动量对偶

一个完全无量纲的公理体系及其在 Lean 4 中的零 sorry 形式化

形式化验证于 Lean 4 (v4.32.2) + Mathlib

摘要

本文提出并形式化一个物理公理体系：时空并非预先给定的几何背景，而只有一个无量纲的标量场 σ （对数标度），它在每一点上规定了局域的度量单位；能量标度由对偶关系 $\varepsilon \cdot s = 1$ ($s = e^\sigma$) 确定。曲率不是独立结构，而恰好是标度场的二阶非均匀性。

全部推论均在 Lean 4 中给出机器验证的证明，**无一处 sorry**。核心结果是一条精确的代数恒等式（定理 6.2）：度量 $g = e^{2\sigma}\delta$ 的完整 Riemann 张量等于欧氏记账张量 δ 与标度形变张量 D 的 Kulkarni–Nomizu 乘积。由此依次回归得到：Newton 引力 (Poisson 方程)、引力红移、重整化群与有效场论塔的必然性、粒子寿命的动量依赖、暗物质的“相互作用发生而观测失效”、暗能量作为开放系统的耗散率、时间箭头，以及光的数学本质（标度盲的类光锥）。

我们同时明确划出边界：Lean 验证的是从公理到结论的蕴含关系，而非公理本身为真。第 46 节逐条列出哪些是定理、哪些是仍需外部输入的物理假设。

形式化规模：496 条定理、8640 行 Lean 代码；289 条主定理经 `#print axioms` 审计，仅依赖 Lean 的三条标准逻辑公理 (`propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`)，无 `sorryAx`。

目录

1	引言：把“尺度”而不是“时空”当作基本量	1
2	基底与公理	2
2.1	微分基底	2
2.2	六条公理	2
3	地基重建：拆分不是一个选择	3
4	时间就是标度正在跑的那个方向	4
5	非交换基底：量子力学的回归	4
5.1	一个必须交代的方法论问题	4
5.2	导数就是对易子	4
5.3	经典微积分是对易子的定理	5
5.4	A3 在非交换扇区只能成立到 $\hbar$	5
5.5	形变量子化：经典极限的严格形式化	5
5.6	把“一阶”这个限制取消掉	6

6 几何的涌现：曲率即标度形变	7
6.1 Levi-Civita 数据	7
6.2 主定理	7
6.3 迹与标量曲率	8
6.4 可积 Weyl 几何：没有第二时钟效应	8
6.5 无量纲性是一条定理	9
7 A4 太强：标度必须是方向性的	9
7.1 诊断	9
7.2 旧公理不是没能给出 Schwarzschild，而是禁止了它	9
7.3 一套公理，而不是两套	10
8 曲率就是对易子	10
8.1 避开一次惯性	10
8.2 Yang-Mills 曲率不是被假设的，是被算出来的	10
8.3 究竟是哪一部分在弯曲	11
9 引力与规范场是同一个东西	11
10 回归 I：引力红移与 Newton 极限	12
10.1 引力红移	12
10.2 标度响应律	12
10.3 一阶区域	12
10.4 一阶区域不是“扔掉高阶项”	13
11 回归 II：重整化群与有效场论塔	13
11.1 标度流	13
11.2 自相似只能是幂律	13
11.3 有效场论塔是定理而非窘境	13
11.4 β 函数从哪里来	14
12 回归 III：粒子标度与寿命的动量依赖	14
13 回归 IV：暗物质——相互作用发生，观测失效	14
14 回归 V：暗能量——开放系统的耗散	15
15 回归 VI：时间箭头	15
16 回归 VII：光是什么	16
17 耗散之下的局域广义协变性	16
18 奇点只是极小的尺度	17
19 可检验的预言	17
19.1 耗散指数与暗能量状态方程	17
19.2 代入常数：三项数值核对	18

20 粒子：不用场的产生机制	18
21 禁闭，以及电荷为何成三分之一	19
22 强相互作用：从无到有的一个标度	20
22.1 对谱的推论与检验	20
22.2 与格点数据的正面对撞：一个失败	21
23 内禀对称性无处可去	21
24 跑动不需要圈图	22
25 记账度规也不是公设	22
26 光线偏折：各向同性扇区恰好只给一半	23
26.1 掠日光线的数值	23
27 方向不是给定的：方向就是代数	23
28 把另一半付清	24
29 三维中的绕数缺陷究竟是什么	25
29.1 这独立地解释了质量律为何不确定	26
29.2 框架现在面临的选择	26
30 倒数关系的那个常数从哪来	26
31 点粒子回来了，而“比值”就是原因	27
31.1 哪种花样支撑序参量	27
32 两个拓扑荷，只有一个被禁闭	27
33 第二个数字：水星	28
34 使倒数关系得以成立的那次相消	29
35 审查：色荷的块不是空间的块	29
36 引力扇区闭合	30
37 没有基本粒子	30
38 可检验的预言与换算表	31
38.1 预言：阈值是标度不变过程	31
38.2 数据：标准模型的十二个质量标度	31
38.3 换算表	32
38.4 当前全部数值对照	33
39 我提议的跨扇区检验并不存在	33

40 这个框架究竟能说什么	34
40.1 标度这一路：恰好表达“差”	34
40.2 两路互不通气	34
40.3 框架弱点的诚实表述，因此改变了	35
41 耦合一直都在：两次缩放生成一次转动	35
41.1 耦合由词义强制	35
41.2 一个方向什么也生成不了	36
41.3 这改变了什么	36
42 耦合让标度场做什么	36
42.1 一处更正，以及交换环真正的代价	36
42.2 演化方程就是 Bianchi，其内容是守恒	37
42.3 多重态内部是平的	37
43 到底是哪个代数：公理逼出实秩一	37
43.1 分裂是典范的，不是表示的选择	38
43.2 公理逼出实秩一	38
43.3 这剩下什么	38
43.4 三个等着的项目随之落地	39
44 代数允许的粒子模型	39
44.1 标度花样坍缩为一个矢量	39
44.2 恰好一个阈值速率，而这是可检验的	39
44.3 禁闭荷是二值的，这结清了 ColorAudit	40
44.4 一个粒子是什么	40
45 自我审查：已发现的思维污染	41
45.1 须撤回：质量塔曾被当作结论，其实是假设	41
45.2 已修复：光是标度盲的，红移却要靠光	41
45.3 仍存在：未修复的污染，逐条登记	41
45.4 审查方法本身	42
46 范围声明：什么被证明了，什么没有	42
47 形式化与验证	46
47.1 规模	46
47.2 公理审计	47
47.3 复现	47
48 结语	47

1 导言：把“尺度”而不是“时空”当作基本量

标准图景中，时空流形与度量先验存在，物质在其上运动，Einstein 方程把二者耦合起来。这一图景在量子场论面前是尴尬的：QFT 的核心操作——重整化——是关于能标的，而广义相对

论的核心对象是长度。二者在自然单位制下互为倒数，却被安放在理论结构的两个完全不同的层次上。

本文采取相反的次序。设定如下：

- 基底只有一套平直的欧氏记账结构（一张坐标纸），它不携带任何物理；
- 真正的物理量是每一点上的局域度量单位，记其对数为 σ ；
- 长度不是原始概念，而是“沿路径累加局域单位”的结果，于是 $g = e^{2\sigma}\delta$ ；
- 能量标度是长度标度的倒数： $\varepsilon \cdot s = 1$ ， $s = e^\sigma$ 。

在这个设定下，“不同点的能动量不同”直接表现为“不同点的标度不同”，而标度的空间不均匀性就是曲率。本文的主定理把这句话变成一条精确的恒等式。

全部论证在 Lean 4 中完成。之所以坚持零 sorry，是因为一个公理体系一旦在地基处留下未证之处，其上层的一切“回归”都失去意义。

2 基底与公理

2.1 微分基底

为使一切陈述有限、可机器检验，我们不使用解析意义上的光滑函数空间，而使用它的代数影子。

定义 2.1 (标度代数). 一个 n 维标度代数是一个交换环 A ，配备 n 个两两交换的导子 $\partial_0, \dots, \partial_{n-1} : A \rightarrow A$ ，满足

$$\partial_i(a+b) = \partial_i a + \partial_i b, \quad \partial_i(ab) = (\partial_i a)b + a(\partial_i b), \quad \partial_i \partial_j a = \partial_j \partial_i a.$$

Lean 出处：ScaleUniverse.ScaleAlgebra

由 Leibniz 律立刻得到 $\partial_i 1 = 0$ 、 $\partial_i 0 = 0$ ，因而所有整数常量被导子零化（d_one、d_zero、d_natCast）。Kronecker 记号 δ_{ij} 取值于 A ，是纯记账量，满足 $\partial_k \delta_{ij} = 0$ 。

注 2.2. 选择代数化而非解析化，使得后文所有曲率恒等式成为纯代数恒等式，对任意交换环成立。这既消除了对分析条件的依赖，也使机器验证不留缝隙。

2.2 六条公理

公理 A1 (基底) . 世界的基底是一个环 A ，配备 n 个满足 Leibniz 律且两两交换的导子 ∂_i ，连同平直的 Kronecker 记账 δ 。基底本身不携带物理。

A 不要求交换。交换性是经典扇区的性质，不是基底的公理；第 5 节证明上述微分结构在任意（含非交换）环中由对易子自动实现，而量子力学正是非交换扇区。第 6 节起的几何推导在交换扇区中进行，这是一个物理限制（引力是经典的），而非数学便利。

公理 A2 (标度场) . 存在一个无量纲标量 $\sigma \in A$ （对数标度），及其乘法代表元 $s \in A^\times$ （ $s = e^\sigma$ ），满足指数场的定义性微分方程

$$\partial_i s = s \partial_i \sigma.$$

s 取值于单位群，故处处非零。

Lean 出处: `ScaleUniverse.ScaleField`

公理 A3 (标度—能动量对偶)。局域能量标度是局域长度标度的倒数：

$$\varepsilon \cdot s = 1, \quad \varepsilon := s^{-1}.$$

在自然单位 $\hbar = c = 1$ 下这不是建模选择，而是能量的定义本身。

Lean 出处: `ScaleField.en`, `ScaleField.en_mul_scale`

公理 A4 (测量, 方向性)。局域度量单位是每个方向一个标度 $s_a \in A^\times$ 。被测线元为

$$g_{ab} = \eta_a s_a^2 \delta_{ab}.$$

标度必须有方向，因为能动量是张量：流动的流体沿流向与横向携带的能量密度不同，张量源不可能设定一个标量标度。

各向同性特例（所有 s_a 相等）给出 $g = e^{2\sigma} \delta$ ，这是本文早期版本所用的公理；第 7 节证明它太强（它禁止 Schwarzschild），并证明它恰是本公理的一个子轨迹，故一切在其上证明的结果不失。

Lean 出处: `Frame.DirScale`, `Unify.toMetric_of_isotropic`

公理 A5 (基准协变性)。 σ 只在相差一个全局常数的意义下有定义：基准单位的选择不可观测。形式上，对任意满足 $\partial_i c = 0$ 的 c ，替换 $\sigma \mapsto \sigma + c$ 是理论的对称性。

Lean 出处: `geometry.fiducial_invariant`

公理 A6 (开放性)。宇宙不是封闭系统：其总能量标度单调耗散。

Lean 出处: `Cosmology.dissipation_solution`

A5 正是“完全无量纲化”的精确含义，我们将在定理 6.7 中证明它对全部几何量严格成立。

3 地基重建：拆分不是一个选择

自我审查（第 45 节）指出 A1 白送了太多东西：一组方向、一个维数 n 、以及一个随后在干实的平直度规 δ 。更糟的是有两处本该被导出的结论被假设了：输运可拆为“标度部分”与“转动部分”；且标度部分是可交换、可积的，而转动部分承载全部曲率。

本节把这两处假设去掉。方法是问：在没有坐标纸垫底的情况下，一次标度比较究竟是什么？

把一切剥掉，剩下的是：局域单位的比较可以复合、复合有结合律、每次比较都可撤销。那就是一个群 Γ ——再多的东西没有，再少又不够。

于是整个拆分由一个观察落地。**标度是一种相乘的量**。先按 a 比再按 b 比，必须与先 b 后 a 给出相同的标度，因为标度是比值而比值可交换。所以一次比较所携带的标度，恰是它在 Γ 的最大交换商——即交换化——中的像。**这里没有选择**：交换化是唯一的泛性交换商。

定理 3.1 (对易子不携带标度). $\text{scale}(ghg^{-1}h^{-1}) = 1$, 无条件成立。不可交换性对标度是隐形的。

Lean 出处: `Foundation.scale_commutator`

定理 3.2 (曲率必然对标度隐形). 由第 8 节, 曲率就是两次输运的对易子; 与定理 3.1 合起来, 曲率的标度必然平凡。

第 8 节的定理 8.4 只在假设了拆分之后才证明这一点。这里拆分不是假设——它是交换化——结论被逼出来。

Lean 出处: `Foundation.curvature_is_scale_invisible`

定理 3.3 (拆分是一个划分, 不是一种分解方式). 两次比较携带相同标度, 当且仅当它们相差一个纯转动 (对易子子群中的元素)。故“标度部分”与“转动部分”不是按某种约定挑出的两个分量, 而是一个典范商的两侧。

Lean 出处: `Foundation.scale_eq_iff_differ_by_rotation`

物理读法正是本纲领一直想要、此前却无法辩护的那一句: 引力恰好住在标度看不见的地方。

4 时间就是标度正在跑的那个方向

审查把 Lorentz 号差列为无解释的输入。把它当作输入本身就是惯性——在度规为原始量的理论里它才是输入, 而这里度规不是原始量。

换个问法: 在一个内容只有标度的世界里, 什么可能挑出一个方向? 候选只有一个。A6 说宇宙耗散: 标度在漂移。而漂移有方向。

时间是标度确实在变的那个方向; 空间是标度不变的那些方向。

定理 4.1 (号差形状 $1 + (n - 1)$). 非零漂移的值域是一维的, 故由秩一零化度定理其核的余维恰为一。恰好一个方向被挑出, 其余全部不被挑出——这正是 Lorentz 形状, 由耗散得到而非公设。

Lean 出处: `Signature.codim_ker_eq_one`

定理 4.2 (没有耗散就没有时间). 若标度不漂移, 则每个方向都是空间的: 没有任何方向被挑出, 也就根本没有时间方向。时间不是理论被赠予的一个维度——它就是宇宙开放这件事。

Lean 出处: `Signature.no_time_of_no_drift`, `Signature.spatial_eq_top_of_no_drift`, `Signature.spatial_ne_top_of_drift`

定理 4.3 (时空拆分与基准无关). 把漂移整体重标 (这是基准的改变, 由 A5 不可观测) 不改变空间子空间。故时空的划分是基准无关的, 正如任何物理陈述都必须如此。

Lean 出处: `Signature.spatial_smul`, `Signature.drift_direction_unique`

号差因此不是钦定的 $(-, +, +, +)$ 。它是 $1 + (n - 1)$, 因为漂移是一个线性泛函; 而它之所以存在, 只是因为宇宙是开放的。A5 与 A6 联手做了原先由公设 η 做的事。

注 4.4 (仍未导出). 维数 n 本身, 以及使那个被挑出的方向为类时 (而非仅仅“被挑出”) 的符号约定, 仍是输入。

5 非交换基底：量子力学的回归

5.1 一个必须交代的方法论问题

本文初稿把基底取为交换环。这是一个应当被质疑的选择：它使曲率计算可以由 `ring` 战术封闭，但量子力学的核心 $[\hat{x}, \hat{p}] = \hbar$ 恰恰是非交换的。若基底必须交换，则本纲领从一开始就把量子力学排除在外。

本节给出修正，而修正的结果比补丁更强：**经典扇区的微分结构从来没有用到交换性**。A1 要求的只是 Leibniz 律与混合偏导可交换，而这两条对任意环中的内导子 $\text{ad}_p = [p, \cdot]$ 逐字成立。

5.2 导数就是对易子

定理 5.1 (任意环中的 Leibniz 律). $\text{ad}_p(ab) = \text{ad}_p(a)b + a\text{ad}_p(b)$ 。

Lean 出处: `Quantum.ad_leibniz`

定理 5.2 (Jacobi 恒等式). $\text{ad}_p\text{ad}_q - \text{ad}_q\text{ad}_p = \text{ad}_{[p,q]}$ 。因此两个内导子可交换，当且仅当其生成元可交换。

Lean 出处: `Quantum.ad_jacobi`, `Quantum.ad_comm_of_commute`

定理 5.1、5.2 合起来说明：A1 中的 ∂_i 不必被假定，它们就是对易子；而“选定一个坐标系”在此获得精确含义——**选定一组互相对易的可观测量**。经典时空的存在性因此不是先验的，而是“存在足够大的对易子代数”这一条件的几何影子。

5.3 经典微积分是对易子的定理

只假设正则对易关系 $[P, X] = c$ (c 中心)，不假设任何别的东西：

定理 5.3 (幂律，由对易子导出)。

$$[P, X^{n+1}] = (n+1) X^n c.$$

取 $c = -\hbar$ 、 $\partial := (\hbar)^{-1}\text{ad}_P$ ，这读作 $\partial(x^{n+1}) = (n+1)x^n$ 。

Lean 出处: `Quantum.ad_pow`

即：**微分学的幂律不是分析学的公理，而是关于非交换性的定理**。经典扇区中被假定的导子，在这里被推导出来。

5.4 A3 在非交换扇区只能成立到 $\hbar$

A3 说 $\varepsilon \cdot s = 1$ 。在交换代数中这是精确恒等式，给出经典几何。在非交换代数中它不可能精确成立，而偏差的定量形式就是不确定性关系。

定理 5.4 (Robertson 不等式). 对对称算子 A, B 与单位向量 ψ ,

$$\|\langle \psi, (AB - BA)\psi \rangle\| \leq 2 \|A\psi\| \|B\psi\|.$$

Lean 出处: `Quantum.robertson`

定理 5.5 (Heisenberg 不确定性). 若 $(AB - BA)\psi = i\hbar\psi$, 则

$$|\hbar| \leq 2 \|A\psi\| \|B\psi\|, \quad \text{即} \quad \Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Lean 出处: Quantum.heisenberg

统一的陈述. 标度—能动量对偶 $\varepsilon s = 1$ 有且只有两种实现方式：在对易扇区它精确成立，给出经典几何与广义相对论（第 6 节起）；在非对易扇区它只能成立到对易子，而那个对易子就是 $\hbar$ ，给出量子力学。二者不是两个待调和的理论，而是同一条对偶在仅有的两个可用状态下的读数。

5.5 形变量子化：经典极限的严格形式化

上一小节只说明了对易子满足经典微分公理。真正欠下的是反方向：证明交换的标度代数确实是某个非交换代数的 $\hbar \rightarrow 0$ 极限，从而 ∂_i 就是对易子而非仅仅类似于对易子。

取一阶形变 $A_\hbar = A[\hbar]/(\hbar^2)$ ，星积

$$(f_0 + \hbar f_1) \star (g_0 + \hbar g_1) = f_0 g_0 + \hbar(f_0 g_1 + f_1 g_0 + P(f_0, g_0)),$$

其中 P 是 A 上任意双导子。

定理 5.6 (形变的存在与结合律). 对任意双导子 P ，星积结合。双导子的两条 Leibniz 律恰是一阶 Hochschild 上圈条件。

Lean 出处: Deformation.star_assoc

定理 5.7 (经典极限). $\hbar$ 的零次项恰为 A 的交换乘法，无任何近似。

Lean 出处: Deformation.star_classical

定理 5.8 (对应原理，精确成立). 对易子无经典部分，其 $\hbar$ 系数恰为 P 的反对称化：

$$\hbar^{-1}[f, g]_\star = \{f_0, g_0\}.$$

这里没有极限可取——一阶上该恒等式是精确的。

Lean 出处: Deformation.star_commutator

定理 5.9 (Poisson 括号是导子). $\{\cdot, g\}$ 对交换环 A 满足 Leibniz 律。

Lean 出处: Deformation.Biderivation.poisson_leibniz_left

定理 5.8、5.9 合起来就是所欠的那一步：**A1** 中被假定的导子 ∂_i ，正是 $A_\hbar$ 的内导子除以 $\hbar$ ；非交换性是 $\hbar$ 的一阶效应，在 $\hbar = 0$ 处消失，留下引力扇区的交换几何。

定理 5.10 (正则对易关系). 若 X 只沿方向 p 变化、 Π 只沿 q 变化，则 $\{\Pi, X\} = 1$ ，故在形变代数中 $[\Pi, X]_\star = \hbar$ 。取 $\hbar = i\hbar$ 即 $[\Pi, X] = i\hbar$ 。

Lean 出处: Deformation.ccr_of_canonical

至此闭环：定理 5.10 由经典标度代数产生 CCR，而定理 5.3 由 CCR 复原经典微积分的幂律。引力扇区的交换微分结构与量子力学的正则对易关系，是同一个一阶形变的两端。

5.6 把“一阶”这个限制取消掉

上一小节的形变只做到一阶。那是诚实的，但一阶截断是个不该安放地基的位置。而且它根本不必要——框架里本来就有一个精确的非交换来源。

问：理论实际拥有的是哪两个操作？一个是读取此处的量：乘以 a 。另一个是移到相邻标度：位移 T 。二者不对易，而不对易量不是小参数，是一个有限的、精确的量——标度差本身：

$$[U, M_a] = M_{Ta-a} \cdot U.$$

位置与标度不对易。这是 A3 ($\varepsilon s = 1$) 的算符形式：分辨“在哪里”与分辨“在什么标度上”是不相容的操作，而 $\hbar$ 是标度步长，不是一个形式符号。

定理 5.11 (交换关系与对易子的闭形式). $UM_a = M_{Ta}U$, 且 $[U, M_a] = M_{\delta a}U$, 其中 $\delta a := Ta - a$ 。全程精确，无任何展开。

Lean 出处: `Crossed.shift_mul_eq`, `Crossed.commutator_eq`

定理 5.12 (交换性 $\iff$ 标度步长为零). 代数交换当且仅当标度位移平凡。经典几何不是为方便而取的极限，而是“沿标度什么也没动”的那个情形。

Lean 出处: `Crossed.comm_iff_shift_trivial`

定理 5.13 (有限步长下的精确 Leibniz 律).

$$\delta(ab) = \delta(a)Tb + a\delta(b).$$

规则是扭曲的：第二个因子在位移后的标度上读取。此式对任意大的步长精确成立。当扭曲平凡 ($Tb = b$) 时，它退化为 A1 所假设的普通 Leibniz 律。

Lean 出处: `Crossed.delta_twisted_leibniz`, `Crossed.delta_leibniz_of_untwisted`

于是经典微分结构**不是**“ $\hbar$ 的一阶截断”，而是一条精确关系在零标度步长处取值。上一小节的限制就此被取消，而不是被绕过。

注 5.14 (仍在的限制). 本节给出的是位移与乘法生成的算符代数，未构造完整的交叉积、未讨论其表示论，也未把 $\hbar$ 的数值与任何具体步长联系起来。

6 几何的涌现：曲率即标度形变

6.1 Levi-Civita 数据

由 A4，度量 $g = e^{2\sigma}\delta$ 的 Christoffel 记号为

$$\Gamma_{bc}^a = \delta_{ab}\sigma_c + \delta_{ac}\sigma_b - \delta_{bc}\sigma_a, \quad \sigma_i := \partial_i\sigma. \quad (1)$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.Chr`

值得注意：共形因子 $e^{2\sigma}$ 完全消失。联络只看得见标度的变化，看不见标度本身——这已经预示了 A5。

定义 6.1 (标度形变张量).

$$D_{ij} := 2\sigma_{ij} - 2\sigma_i\sigma_j + \delta_{ij}|\nabla\sigma|^2, \quad (2)$$

其中 $\sigma_{ij} = \partial_i\partial_j\sigma$, $|\nabla\sigma|^2 = \sum_k \sigma_k\sigma_k$ 。它度量局域单位偏离仿射变化的程度。(因子 2 是为避免除法，使一切陈述在任意交换环上成立。)

Lean 出处: `ScaleUniverse.Defm`

6.2 主定理

定理 6.2 (曲率即标度形变). 在任意标度代数中, 对任意 $\sigma \in A$ 与任意指标 a, b, c, e ,

$$2R^a_{bce} = \delta_{ae}D_{bc} - \delta_{ac}D_{be} + \delta_{bc}D_{ae} - \delta_{be}D_{ac} \quad (3)$$

即 $g = e^{2\sigma}\delta$ 的完整 Riemann 张量恰是欧氏记账 δ 与标度形变 D 的 Kulkarni–Nomizu 乘积。

Lean 出处: `ScaleUniverse.two_Rm_eq`

这是全部纲领的核心。它把“欧氏空间在不同点按不同比例缩放, 等价于黎曼几何”从一句口号变成一条恒等式: **几何 = 记账 $\times$ 标度形变, 没有别的成分**。曲率没有任何独立于标度场的自由度。

证明要点. Riemann 张量的导数部分给出

$$\partial_c \Gamma^a_{be} - \partial_e \Gamma^a_{bc} = \delta_{ae}\sigma_{bc} - \delta_{be}\sigma_{ac} - \delta_{ac}\sigma_{be} + \delta_{bc}\sigma_{ae},$$

其中 δ_{ab} 项因混合偏导可交换而相消 (`d_Chr_diff`)。二次部分由一条主收缩恒等式给出:

$$\sum_m \Gamma^a_{cm} \Gamma^m_{be} = 2\delta_{ac}\sigma_b\sigma_e - \delta_{ac}\delta_{be}|\nabla\sigma|^2 + \delta_{ab}\sigma_c\sigma_e + \delta_{ae}\sigma_b\sigma_c - \delta_{bc}\sigma_a\sigma_e - \delta_{ce}\sigma_a\sigma_b$$

(`sum_Chr_Chr_full`; Lean 中通过把九个乘积项整理成可收缩形式, 再用 $\sum_a \delta_{ab}f(a) = f(b)$ 逐项化简)。两部分相加, $|\nabla\sigma|^2$ 项恰好成对相消, 余下即所断言的形式。全部步骤为环上恒等式, 由 `ring` 封闭。□

6.3 迹与标量曲率

定理 6.3 (Ricci 曲率).

$$R_{be} = -(n-2)(\sigma_{be} - \sigma_b\sigma_e) - \delta_{be}(\Delta\sigma + (n-2)|\nabla\sigma|^2). \quad (4)$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.Ric_eq`

定理 6.4 (标量曲率).

$$e^{2\sigma}R = -2(n-1)\Delta\sigma - (n-1)(n-2)|\nabla\sigma|^2. \quad (5)$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.RscBare_eq`

(我们把共形因子显式保留在左侧, 从而无需任何可逆性假设。)

推论 6.5 (真空即标度的仿射变化). 若 2 在 A 中可逆 (对任何 $\mathbb{R}$ -代数模型自动成立), 则

$$D_{ij} \equiv 0 \implies R^a_{bce} \equiv 0.$$

即: 形变自由的标度场给出完全平直的几何, 而非仅仅 Ricci 平坦。

Lean 出处: `Rm_eq_zero_of_Defm_eq_zero`

真空因此不是“没有标度”, 而是“标度均匀地变化”。这与本纲领的直觉一致: 标度处处存在, 引力只是它的不均匀性。

6.4 可积 Weyl 几何：没有第二时钟效应

Weyl 于 1918 年提出：单位长度可以逐点变化，由一个独立的一形式 A_i 描述。Einstein 的反驳是致命的：若 A 不可积，原子谱线将依赖于世界线历史（“第二时钟效应”），与观测矛盾。

本理论中 A_i 不是独立场，而是全局标量的梯度 $A_i = \partial_i \sigma$ 。

定理 6.6 (标度联络平坦).

$$F_{ij} := \partial_i A_j - \partial_j A_i = 0 \quad \text{恒成立.}$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.scaleCurv_eq_zero`

证明只用到混合偏导可交换。因此沿任意闭合回路输运单位后单位不变，第二时钟效应按构造不存在。这正是可积 Weyl 几何成功、而 Weyl 原版失败的原因——本纲领所需的恰是前者。

6.5 无量纲性是一条定理

定理 6.7 (基准协变性). 设 $\partial_i c = 0$ 。则对 $\sigma \mapsto \sigma + c$ ，下列量逐一不变：

$$\sigma_i, \quad \sigma_{ij}, \quad \Delta\sigma, \quad |\nabla\sigma|^2, \quad \Gamma^a_{bc}, \quad R^a_{bce}, \quad R_{be}, \quad D_{ij}, \quad e^{2\sigma} R.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.geometry_fiducial_invariant`

这就是 A5 的精确内容，也是“全部物理量无量纲化”的严格实现：没有任何可观测量依赖于 σ 的零点位置，只有标度差是物理的。

注 6.8 (重整化群的起源). 定理 6.7 说的是几何对基准平移不变。但物质的描述未必不变：为在基准移动时保持预言不变，耦合常数必须相应流动。这一补偿运动就是重整化群（第 11 节）。换言之，RG 不是 QFT 的技术手续，而是 A5 在物质部门的影子。

7 A4 太强：标度必须是方向性的

7.1 诊断

第 6 节的一切都建立在 $g = e^{2\sigma} \delta$ ——一个标量标度，各方向相同。本文早期版本把这当作 A4 本身。它无法承载 Schwarzschild，而原因是物理的，不是技术的。

本纲领说局域能动量决定局域标度。但**能动量是张量**：流动的流体沿流向与横向携带的能量密度不同。张量源不可能设定一个标量标度。**标度必须有方向**。

这就是第 2 节把 A4 直接写成方向性的理由：局域度量单位是每个方向一个标度 $s_a \in A^\times$ ，被测线元为 $g_{ab} = \eta_a s_a^2 \delta_{ab}$ 。各向同性（所有 s_a 相同）是它的特例。

7.2 旧公理不是没能给出 Schwarzschild，而是禁止了它

Schwarzschild（及 Reissner–Nordström）族的定义性关系是 $g_{tt}g_{rr} = -1$ 。在标度语言中它读作

$$s_t \cdot s_r = 1.$$

时间标度与径向标度互为倒数：钟被压缩的因子，恰好等于径向尺子被拉长的因子。这是一句关于标度的陈述，标量理论连表述它的能力都没有。

定理 7.1 (各向同性 + 倒数关系 $\Rightarrow$ 平直). 若所有方向共用一个标度，且 $s_t s_r = 1$ ，则 $s_t^2 = 1$ ，于是每个度量分量都等于裸记账值：几何是平直的。

Lean 出处: `Frame.DirScale.isotropic_reciprocal_forces_flat, isotropic_reciprocal_metric_bare`

这就是诊断的精确形式： $g = e^{2\sigma} \delta$ 并非未能产生 **Schwarzschild**，而是排除了它。公理确实太强。

定理 7.2 (方向性 A4 下该关系有非平凡解). 对任意满足 $u^2 \neq 1$ 的单位 u ，存在方向性标度场使 $s_t = u$ 、 $s_r = u^{-1}$ ，倒数关系成立且非各向同性。

Lean 出处: `Frame.exists_reciprocal_nonisotropic`

7.3 一套公理，而不是两套

若把方向性 A4 与旧的标量 A4 并列，体系就同时挂着两条互斥的公理——`Conformal.lean` 等文件用标量 σ ，而 `Frame.lean` 说标度有方向。这必须消除，消除的办法是**降格旧公理**：方向性 A4 是公理，标量形式是关于其各向同性轨迹的定理。

定理 7.3 (旧公理是新公理的各向同性轨迹). 若所有方向共用一个标度 s ，则方向性 A4 的度量恰好等于共形度量 $\eta_a s^2 \delta_{ab}$ ——无近似、无附加假设。

Lean 出处: `Unify.toMetric_of_isotropic`

定理 7.4 (各向同性轨迹恰是标量理论的像). 一个方向性标度场是各向同性的，当且仅当它形如 `ofScalar(u)`。故旧公理不只是被新公理蕴含，而是新公理限制在一个子轨迹上的全部内容，没有剩余。

Lean 出处: `Unify.isotropic_iff_ofScalar, Unify.sector_coherence`

于是此前一切关于 σ 的定理原封不动保留，只是获得了明确的适用域：它们是关于各向同性扇区的陈述。公理表由两条变回一条。

注 7.5 (相容但尚不完备). 本文未完成各向异性扇区的曲率计算（Cartan 结构方程、Schwarzschild 曲率张量的逐分量验证、光线偏折与近日点进动）。公理体系现在是**相容的**；它还不**完备**——方向性 A4 的几何推论目前只在标度恰为各向同性处被算出。这是当前最优先的下一步。

8 曲率就是对易子

8.1 避开一次惯性

补各向异性曲率的“显然”办法，是写下 Cartan 结构方程然后硬算。那等于把广义相对论的整套机器原样搬过来——正是最该避开的路径依赖。有一条更本原的路，而且它把引力认成了本文早已造好的东西。

问：输运局域单位究竟是什么？沿方向 i 移动，就是把一切改用邻近的单位表述，那是一个算子 D_i 。先 i 后 j 未必等于先 j 后 i 。这个差额就是曲率的全部：

$$F_{ij} = [D_i, D_j].$$

这与 Quantum.ad 是同一个构造。那里的输运是相空间平移，它们的不对易就是 $\hbar$ ；这里的输运是标架输运，它们的不对易就是引力。

曲率与 $\hbar$ 是同一个构造在两族输运上的取值。这比“两个理论之间存在类比”强得多——它们是一件事。

8.2 Yang-Mills 曲率不是被假设的，是被算出来的

定理 8.1 (曲率即输运的对易子). 以 $D_i m = \partial_i m + [A_i, m]$ 为协变输运，则

$$[D_i, D_j] m = [F_{ij}, m], \quad F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j].$$

两件事同时发生：其一，Yang-Mills 曲率不是被写下的，而是左边算出来的结果；其二，结果对 m 是代数作用—— m 的导数全部消失——这正是“曲率是张量”的精确含义。

Lean 出处: `Connection.comm_covD`

定理 8.2 (Bianchi 恒等式). $\sum_{\text{cyc}} D_i F_{jk} = 0$ 。它由 ad 的 Jacobi 恒等式 (定理 5.2) 与混合偏导可交换直接给出。引力场的守恒律就是输运的结合律，别无其他内容。

Lean 出处: `Connection.bianchi`

8.3 究竟是哪一部分在弯曲

定理 8.3 (梯度联络是平的). 若联络是标量的梯度且自对易，其曲率恒为零。这是定理 6.6 在非交换情形下的重述：输运的标度部分是可积的，故无论几何多弯，第二时钟效应都不存在。

Lean 出处: `Connection.curv_gradient_eq_zero`

定理 8.4 (全部曲率都住在不对易的部分). 把输运拆为标度部分 (由 A5 是梯度，故对易、可积) 加标架转动部分：

$$F(\partial\sigma + \omega)_{ij} = F(\omega)_{ij}.$$

标度部分对曲率的贡献恰好为零。

Lean 出处: `Connection.curv_eq_rotation_part, curv_split, curv_pure_scale_eq_zero`

于是引力不是“标度场把空间掰弯了”。引力是**标架转动的不对易**，而标度本身可积地输运。这既解释了可积 Weyl 几何为何能承载引力却不产生第二时钟效应，也正是标量公理 A4 表达不了的那个各向异性曲率——而且全程没有出现一个 Christoffel 记号。

推论：纯标量输运的曲率恒为零，这就是旧公理禁止 Schwarzschild 的结构原因，与定理 7.1 从度量一侧给出的结论一致。

注 8.5 (仍未闭合的一环). 本节给出的是给定联络的曲率。由标架定出联络 (Cartan 第一结构方程，即无挠条件 $de^a + \omega^a_b \wedge e^b = 0$) 尚未形式化。因此各向异性扇区现在有了曲率机器与拆分定理，但还没有“从 s_a 算到 F ”的完整链条，光线偏折与近日点进动仍未导出。缺口比上一版窄，但没有消失。

9 引力与规范场是同一个东西

上一轮留下一个问题：从标架定出联络，是否需要无挠条件？这样问本身就是惯性——“挠率”来自一个把标架与联络当作独立场的理论，所以才需要一个条件把二者拴住。

在这里它们并不独立，也就没有什么可强加的。

从 x 到 y 的输运只有一件事要做：把 x 处每个局域单位送到 y 处对应的单位。两端的标度花样就是全部，于是输运就是“使单位对上”的那个重标号。没有做出任何选择，因而不需要任何条件来消除选择。

定理 9.1 (非简并 $\Rightarrow$ 输运唯一). 若目标处各局域单位互不相同，则输运**唯一**。没有无挠条件、没有度规相容性公设、没有变分原理：联络是标度场的一个函数，它从来就不是一个待约束的独立场。

Lean 出处: `Transport.transport_unique_of_nondegenerate`

定理 9.2 (简并 $\Rightarrow$ 自由度恰是内禀对称性). 两个输运同一花样的重标号相差一个 `stabilizer` 元素，且仅此而已；反之乘上任一稳定子元素仍是输运。故输运集合恰是稳定子的一个陪集。

Lean 出处: `Transport.transport_coset`, `Transport.transports_of_stabilizer`

定理 9.3 (唯一性 $\iff$ 无规范自由). 输运唯一，当且仅当稳定子平凡。

Lean 出 处: `Transport.transport_unique_iff_stabilizer_trivial`, `Transport.nondegenerate_no_gauge_freedom`

输运是一个对象；标度花样的简并把它劈成“被定死的部分”与“自由的部分”。被定死的部分逐点变化并弯曲——那是引力；自由的部分是块内转动——那是规范场。它们不是两个有待统一的场，而是一个场，被“局域单位是否恰好重合”这一件事分开。

10 回归 I: 引力红移与 Newton 极限

10.1 引力红移

定理 10.1 (红移). 对 A_2 、 A_3 的标度场，

$$\partial_i \varepsilon = -\varepsilon \partial_i \sigma.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.ScaleField.d_en`

证明只是对 $\varepsilon s = 1$ 求导。物理读法：标度升高处能量标度降低。一个固定激发从标度大的区域向外传播时能量下降——引力红移是定理，不是附加假设。

10.2 标度响应律

要得到引力，还需要一句话说明什么在源生标度：

公理 A6' (标度响应). $e^{2\sigma} R = \kappa \rho$ ，其中 ρ 是局域无量纲能量密度。 $n = 3$ 时这正是共形平直切片上的 Hamilton 约束。

10.3 一阶区域

定理 10.2 (线性化是精确的). 若 $|\nabla \sigma|^2 = 0$ ，则

$$e^{2\sigma} R = -2(n-1)\Delta\sigma.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.RscBare_linear`

定理 10.3 (Poisson 方程). 在一阶区域, 令 $\Phi := -\sigma$ (*Newton 势*就是负的对数标度), 则

$$2(n-1)\Delta\Phi = \kappa\rho.$$

$n=3$ 时为 $4\Delta\Phi = \kappa\rho$; 取 $\kappa = 16\pi G$ 即得

$$\Delta\Phi = 4\pi G\rho.$$

Lean 出处: `ScaleUniverse.poisson`, `ScaleUniverse.poisson_three`

符号自洽性值得强调: $\sigma = -\Phi$ 意味着引力势阱深处 $\sigma > 0$, 即标度被拉大、尺子被拉长——这与 Schwarzschild 各向同性坐标下径向固有距离大于坐标距离一致; 同时由定理 10.1, $\varepsilon = e^{-\sigma} = e^{\Phi}$, 正是引力红移因子。两个符号都不是调出来的。

10.4 一阶区域不是“扔掉高阶项”

条件 $|\nabla\sigma|^2 = 0$ 看似是把困难项抹去。我们证明它是精确可实现的: 把基底扩张为对偶数环 $A[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 并取无穷小标度场 $\sigma = \varepsilon\varphi$ 。

定理 10.4 (一阶区域的实现). 对偶数环上的导子逐分量延拓后仍是标度代数; 且对任意 $\varphi \in A$,

$$|\nabla(\varepsilon\varphi)|^2 = 0 \quad \text{恒等成立.}$$

因而定理 10.2、10.3 在其上精确成立, 没有任何被丢弃的项。

Lean 出处: `ScaleUniverse.Dual.instScaleAlgebra`, `Dual.gradsq_inr`, `Dual.poisson_exact`

一阶微扰论由此被安置在公理体系内部, 而不是从外部强加。

11 回归 II: 重整化群与有效场论塔

11.1 标度流

定义 11.1 (标度流). 耦合空间 S 上的标度流是 $\Phi_t : S \rightarrow S$, 满足 $\Phi_0 = \text{id}$ 、 $\Phi_{t+u} = \Phi_t \circ \Phi_u$ 。群律由 A5 强制: 基准先移 u 再移 t , 就是移 $t+u$, 没有别的可能。

Lean 出处: `RG.ScaleFlow`

命题 11.2 (不动点即标度不变). 若 $\Phi_t g = g$ 对一切 t 成立, 则任意可观测量 O 满足 $O(\Phi_t g) = O(g)$ 。

Lean 出处: `RG.ScaleFlow.observable_const_at_fixedPoint`

11.2 自相似只能是幂律

定理 11.3 (Callan–Symanzik). 若无量纲可观测量满足 $\frac{dO}{dt} = \gamma O$, 则

$$O(t) = O(0) e^{\gamma t}.$$

特别地 $\gamma = 0$ (不动点) 给出严格标度不变。

Lean 出处: `RG.callan_symanzik`, `RG.scale_invariant_of_fixedPoint`

反常量纲 γ 是标度协变行为的唯一可能形式。值得注意, 这与第 14 节的耗散律是同一条微分方程: 跑动的耦合与膨胀的宇宙, 是同一个数学在两个标度上的读数——这正是本纲领所主张的自相似性。

11.3 有效场论塔是定理而非窘境

设激发 i 携带对数阈值 μ_i 。在对数能标 t 上可用的激发集合为 $\mathcal{A}(t) = \{i : \mu_i \leq t\}$ 。

定理 11.4 (EFT 塔). (i) 单调性: $t \leq t' \Rightarrow \mathcal{A}(t) \subseteq \mathcal{A}(t')$; 新物理只随标度升高而出现, 从不消失。 RG.active_mono

(ii) 阈值间恒定: 若 $(t, t']$ 中无阈值, 则 $\mathcal{A}(t) = \mathcal{A}(t')$ 。有效描述在阈值之间是精确的, 而非近似。 RG.active_eq_of_no_threshold

(iii) 有限性: 有限激发内容只给出有限多个不同的有效理论。 RG.active_finite_range

因此, “不同能标下必须更换理论框架” 不是有效场论的缺陷, 而是一个标度分层世界在如实报告自己的结构。

11.4 β 函数从哪里来

第 22 节把单圈系数 b 当作输入, 是从规范理论借来的。这一步可以往回推一层。

A5 说基准平移是几何的对称性而非描述的对称性: 耦合必须补偿。而需要被补偿的只能是实际在场的内容, 即活跃激发。所以补偿率只能是活跃集合的泛函, 别无依赖。

定理 11.5 (β 系数的形状). 设 β 系数为活跃内容的任意泛函 $\Phi(\mathcal{A}(t))$ 。则

(i) 阈值之间它恒定——那里的跑动精确是单系数的, 而非近似; RG.beta_const_between_thresholds

(ii) 它只取有限多个值, 故是一个阶梯函数, 跳变点恰在质量阈值上; RG.beta_finite_range

(iii) 越过全部阈值后它稳定到完整内容的值。 RG.beta_eq_of_all_active

QCD 的系数正是这样: 在每个夸克阈值处跳变。本框架定出了这个形状, 但**不定出数值**—— Φ 的具体形式 (如 $11N_c - 2N_f$) 仍是输入。这一步只把借来的东西从“一个数”缩小为“一个泛函”, 没有消灭它。

12 回归 III: 粒子标度与寿命的动量依赖

激发携带自己的时钟, 其单位由静止能标 m 设定; 实验室使用另一套单位, 由总能量 $E = \sqrt{p^2 + m^2}$ 设定。寿命是内部“滴答”的纯数目; 实验室报告的是同一数目在它的单位下的读数, 因此要乘以两个标度之比

$$\gamma = \frac{E}{m}.$$

定理 12.1 (寿命). 设 $m > 0$ 、 $\tau_0 \geq 0$, $\tau(p) = \gamma(p) \tau_0$ 。则

(i) $\gamma \geq 1$, 故 $\tau(p) \geq \tau_0$; Particles.one_le_scaleRatio

(ii) $p^2 \leq q^2 \Rightarrow \tau(p) \leq \tau(q)$: 寿命随动量单调增加; Particles.lifetime_mono

(iii) $\tau(0) = \tau_0$: 静止时两个标度重合, 归一化无余项。 Particles.lifetime_at_rest

证明中没有使用任何关于衰变动力学的假设。时间膨胀在此不是“钟走慢了”, 而是 A3 的标度比被读了两次。

13 回归 IV：暗物质——相互作用发生，观测失效

探测器本身是坐落在某个能标 ε_D 上的物理系统；由 A3，这也是它的空间分辨率的倒数。它能登记的不是“一次相互作用”，而是“一次把它自身状态推动了至少阈值 θ 的相互作用”。

定义 13.1. 单次激发的探测响应 $\det(\varepsilon, \varepsilon_D) = \varepsilon/\varepsilon_D$ ；引力响应 $\text{grav}(N, \varepsilon) = N\varepsilon$ （总能量，对能量如何分配是盲的）。

定理 13.2 (相互作用而不可观测). 对任意 $\varepsilon_D > 0$ 与任意阈值 $\theta > 0$ ，存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，使得对一切 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ ，

$$0 < \det(\varepsilon, \varepsilon_D) < \theta.$$

即：耦合严格非零（相互作用确实发生），却严格低于阈值（观测必然失败）。

Lean 出处: `Dark.detection_failure`

定理 13.3 (暗物质). 对任意引力信号 $M > 0$ 、任意探测器标度 $\varepsilon_D > 0$ 、任意阈值 $\theta > 0$ ，存在标度 $\varepsilon > 0$ 与多重度 $N > 0$ ，使得

$$N\varepsilon = M \quad (\text{引力上完全可见}), \quad 0 < \frac{\varepsilon}{\varepsilon_D} < \theta \quad (\text{非引力上不可见}).$$

Lean 出处: `Dark.dark_matter_exists`

引力可见性与非引力不可见性因此并不冲突：它们是同一位形的两个不同泛函，而标度层级可以把二者拉开任意大的倍数。用户直觉中“超大号、能量极低的粒子”在此获得精确表述——关键不在于它是什么粒子，而在于探测器自身的能标远高于它，使得测量（而非相互作用）失效。

14 回归 V：暗能量——开放系统的耗散

由 A6，宇宙不封闭，其能量标度耗散。由 A3，衰减的能量标度就是增长的长度标度。定义宇宙标度因子 $a := 1/\varepsilon$ （它不是独立场）。

定理 14.1 (耗散的历史唯一). 若 $\dot{\varepsilon} = -\lambda\varepsilon$ ，则

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 e^{-\lambda t}.$$

未假设任何拟设；指数形式是被强制的。

Lean 出处: `Cosmology.dissipation_solution`

定理 14.2 (耗散即膨胀，且加速). 设 $\lambda > 0$ 、 $\varepsilon_0 > 0$ 。则

$$a(t) = a_0 e^{\lambda t}, \quad \dot{a} = \lambda a \quad (\text{即 } H = \lambda \text{ 为常数}), \quad \ddot{a} = \lambda^2 a > 0.$$

即精确的 de Sitter 膨胀，全程没有引入任何宇宙学常数。

Lean 出 处: `Cosmology.open_universe_accelerates, hasDerivAt_scaleFactor, hasDerivAt_hubble, acceleration_pos`

结论：所谓“暗能量”在此框架下不是具有负压的物质，而是开放宇宙的耗散率。观测到的加速膨胀是一个倒数的二阶导数， Λ 与 λ^2 同阶。把宇宙自身看作一个“因涨落而诞生、正在耗散的大粒子”，其数学内容恰是定理 14.1——与定理 11.3 的跑动方程同型。

15 回归 VI：时间箭头

基底中没有任何东西区分时间方向：微观动力学是双射。破缺来自观测发生在某个标度上，而标度携带有限分辨率，即一个从微观位形到可分辨对象的非单射映射。

设 X 有限， $\pi : X \rightarrow Y$ 为粗粒化， T 为 X 上的置换（可逆微观动力学）。定义饱和 $\text{sat}_\pi(S) = \{x : \pi x \in \pi(S)\}$ ，观测演化 $F(S) = \text{sat}_\pi(T(S))$ 。

定理 15.1 (H 定理). $|S| \leq |F(S)|$ ，对一切 S 成立。

Lean 出处: `Entropy.entropy_nondecreasing`

证明只用两步：微观步严格保持基数；粗粒化步只能变大。没有任何概率假设。

定理 15.2 (不可逆性). 设 F 满足 H 定理且在某个 S_0 上严格产熵 ($|S_0| < |F(S_0)|$)。则不存在同样满足 H 定理的 G 使 $G \circ F = \text{id}$ 。

Lean 出处: `Entropy.no_reverse_law`, `Entropy.evolve_no_reverse_law`

即：宏观方程无法被同类型的规律倒着跑。微观层面时间反演不变严格成立，宏观层面它被摧毁——这正是 Boltzmann 方程不具时间反演不变性的确切地位。

正反物质不对称。 我们只给出结构性结论，不宣称推出观测到的重子不对称度。Sakharov 第三条件是“偏离热平衡”。在封闭系统中这是精心安排的插曲；在 A6 之下宇宙永不停止耗散，因而该必要条件结构性地恒被满足：

命题 15.3. 若某荷量在一步演化中发生改变，则系统必不处于平衡 ($F(S) \neq S$)；严格产熵本身即构成偏离平衡。

Lean 出处: `Entropy.charge_change_implies_nonequilibrium`, `Entropy.entropy_production_implies_nonequilibrium`

16 回归 VII：光是什么

被测二次型是记账二次型乘以标度因子: $Q_g = s^2 Q_\delta$ 。由于 s 是单位元，乘以它既不能制造零也不能消灭零。

定理 16.1 (光对标度是盲的).

$$Q_g(v) = 0 \iff Q_\delta(v) = 0.$$

类光锥由记账结构单独决定；任何标度场（即任何引力场）都无法改变哪些方向是类光的。两个使用任意不同标度场的观察者，对“何为类光”的判断完全一致。

Lean 出处: `Light.isNull_iff_bare`, `Light.isNull_scale_invariant`

定理 16.2 (物质不是盲的). 若 $Q_\delta(v)$ 是正则元（特别地， v 非类光），则由被测二次型可唯一确定 s^2 。

Lean 出处: `Light.scale_determined_of_nonnull`, `Light.physForm_ne_bareForm`

两条定理合起来给出本框架完整的认识论：

光确定共形（因果）结构，且仅此而已；标度必须用物质去读。

因此，光的数学本质是几何中权重为零的部分——A5 的基准平移作用于其上平凡的 (`Light.null_weight_zero`)，这正是“无质量”的形式内容。它的实在意义是：光是唯一路径

对标度不敏感的探针，因而是唯一能够把局域单位的比较从一个事件无循环论证地传递到另一个事件的比较器。再结合定理 6.6（标度联络平坦），这种传递沿闭合回路无残差，理论自治。

17 耗散之下的局域广义协变性

对 A6 最直接的反驳是：若基准标度永不停止漂移，局域物理岂不被摧毁？氢原子为什么昨天和今天一样大？太阳系为什么不膨胀？

答案由 A5 强制。宇宙耗散是基准的空间常数漂移 $\sigma_t = \sigma + c(t)$, $\partial_i c(t) = 0$ ；而一切几何量都由 σ 的导数构成，漂移逐项相消。

定理 17.1 (局域几何与宇宙时无关). 对任意两个宇宙时刻 t, t' :

$$\sigma_i, \quad \Gamma^a_{bc}, \quad R^a_{bce}, \quad R_{be}, \quad D_{ij}, \quad e^{2\sigma} R$$

逐一相等。

Lean 出处: `Covariance.CosmicHistory.no_local_expansion`

推论 17.2 (场方程形式不变). 若 $e^{2\sigma} R = \kappa \rho$ 在某一时刻成立，则它在每一时刻以相同的 κ 与相同的局域 ρ 成立。全局耗散不重整化局域引力，局域广义协变性严格保持。

Lean 出处: `Covariance.CosmicHistory.field_equation_form_invariant`

物理结论：**束缚系统不膨胀，这是定理而非假设**。膨胀不是空间对物质施加的局域力；它只在比较两个不同基准时才可见——而这恰恰就是一次宇宙学红移测量所做的事。

18 奇点只是极小的尺度

A2 把标度写成 $s \in A^\times$ ，即单位群的元素。这不是技术选择：一个度量单位必须是可以拿来做法除的东西。后果是结构性的。

定理 18.1 (无度规退化). $s \neq 0$ 处处成立； $\varepsilon = 1/s \neq 0$ 处处成立；共形因子 s^2 处处可逆。

Lean 出处: `Singularity.ScaleField.scale_ne_zero, energy_ne_zero, conformal_factor_isUnit`

定理 18.2 (曲率只看标度的变化，不看标度的值). 若两个标度场的一阶、二阶导数相同，则其 Riemann 张量相同，无论二者的标度相差多少。

Lean 出处: `Singularity.curvature_indep_of_scale_value`

由主定理 6.2，Riemann 张量是 σ 导数的多项式， s 根本不出现。因此**标度变小本身不产生任何曲率发散**。广义相对论所报告的奇点，在此框架下是 $\sigma \rightarrow$ 极负的区域：尺度极小、能标极高，但二者都有限且都可逆。理论在那里并不失语。

这与“奇点是数学奇点”的图景相反，而与本纲领的物理直觉一致：奇点是一个尺寸极小的点，不是一个洞。

19 可检验的预言

19.1 耗散指数与暗能量状态方程

把 A6 从 $\dot{\varepsilon} = -\lambda \varepsilon$ 推广为幂律 $\dot{\varepsilon} = -\lambda \varepsilon^q$ 。由 $a = 1/\varepsilon$ 得 $H = \lambda a^{1-q}$ ，故 $\rho \propto H^2 \propto a^{2(1-q)}$ ；与连续性方程 $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ 比较指数，得到

$$\boxed{w = \frac{2q - 5}{3}} \iff \boxed{q = \frac{3w + 5}{2}}$$

定理 19.1 (加速判据与状态方程). (i) $2\dot{\varepsilon}^2 - \varepsilon\ddot{\varepsilon} = \lambda^2\varepsilon^{2q}(2 - q)$, 故 $\ddot{a} > 0 \iff q < 2$.
Predictions.powerlaw_accel_numerator, accelerates_iff

(ii) $w = -1 \iff q = 1$ (预言是尖锐的, 不是通有的). Predictions.eos_eq_neg_one_iff

(iii) $w < -1/3 \iff q < 2$: 与 (i) 的加速判据一致. Predictions.eos_lt_third_iff

(iv) $w < -1$ (幻影区) $\iff q < 1$. Predictions.eos_lt_neg_one_iff

(v) 反演公式是双向的: $w \mapsto q \mapsto w$ 恒等. Predictions.eos_dissipationExponent

这是本框架最容易被杀死的地方, 应当明说:

可证伪性. 纯指数耗散 ($q = 1$) 预言 $w = -1$ 精确成立, 无任何可调参数。若观测确证 $w \neq -1$, 则该情形被直接排除; 此时理论并不崩塌, 而是被数据测定: 由 $q = (3w + 5)/2$ 读出耗散指数。例如观测给出 $w = -0.95$, 则 $q = 1.075$. Predictions.worked_inversion

19.2 代入常数: 三项数值核对

以下公式由本框架给出, 常数取 SI 定义值或 CODATA 值, 算术由 norm_num 验证。

量	本框架公式	计算值	实验值
μ 子寿命	$\tau = \gamma\tau_0$	$64.432 \mu\text{s}$	$64.378 \pm 0.026 \mu\text{s}$
Pound-Rebka	$z = gh/c^2$	2.4551×10^{-15}	$(2.46 \pm 0.03) \times 10^{-15}$
暗能量密度	$\rho_\Lambda = 3\lambda^2/8\pi G$	5.845×10^{-27}	5.86×10^{-27}

- μ 子: CERN 储存环 $\gamma = 29.327$ 、 $\tau_0 = 2.19703 \mu\text{s}$, 由定理 12.1 得 $\tau = 64.432 \mu\text{s}$, 与测量符合到 10^{-3} . Predictions.muon_matches_experiment
- Pound-Rebka: 由定理 10.1 的 $\varepsilon = e^\Phi$ 一阶展开, $h = 22.5 \text{ m}$ 处 $z = 2.4551 \times 10^{-15}$. Predictions.poundRebka_value
- 暗能量: 由定理 14.2, λ 即渐近 Hubble 率 $H_\infty = H_0\sqrt{\Omega_\Lambda} \approx 1.8077 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$, 代入 $\rho_\Lambda = 3\lambda^2/8\pi G$ 得 $5.845 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$. Predictions.darkEnergyDensity_value

需要说明: 前两项是核对而非新预言 (框架落在已知物理的正确数值上); 第三项在 $\lambda \leftrightarrow H_\infty$ 的识别下带有一定循环性, 其真正的预言内容是 $w = -1$ 这一形状, 而非该数值本身。

20 粒子: 不用场的产生机制

量子场论用背景上的场的量子化产生粒子: 粒子是激发, 荷是表示标签, 质量是拉氏量的参数。这些在本框架中一样都没有。与其模仿, 不如照标度图景直说。

若 A5 的连续标度对称性破缺到离散子群——标度只在模 Δ 的意义下有物理——则对数标度不是实值场而是圆值场。绕任一点的闭合回路一周, 标度必须回到模 Δ 的自身, 因而未必精确回到自身; 其偏差是 Δ 的整数倍。

那个整数就是粒子。粒子是度量单位中的缺陷：一处局域标度无法被梳理平整的地方。

定理 20.1 (荷是整数, 且唯一确定). 配置唯一决定其绕数; 没有重新指派的自由。荷之为整数, 不是因为选定了某个表示, 而是因为回路要么闭合、要么差整数个周期。孤立的分数荷因此不可能出现。

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.winding_unique`

定理 20.2 (粒子稳定). 绕数非零的缺陷不是平凡配置: 标度绕它确实不闭合。稳定性是拓扑的, 证明中未使用任何关于力或势的假设。

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.stable_of_winding_ne_zero, winding_eq_zero_of_trivial`

定理 20.3 (荷守恒; 不能单独产生). 绕数可加; 粒子与其反粒子的总绕数为零, 故可以从真空成对产生, 而单个缺陷不能。

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.pair_winding_zero`

定理 20.4 (反粒子质量严格相等). 电荷共轭即取向反转, $|k|$ 不变, 故 $m_{-k} = m_k$ 。这一简并不是作为对称性原理被强加的, 而是荷为绕数的推论。

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.antiparticle_same_mass`

定理 20.5 (几何质量塔——基于一条被假设的质量律). **注意:** 此律是假设而非导出, 见第 45 节的撤回。若假定质量即逆标度且缺陷的荷每增加一就跨一个周期, 则

$$m_k = m_0 e^{|k|\Delta}, \quad \frac{m_{k+1}}{m_k} = e^\Delta \text{ 在每一层都相同.}$$

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.mass_ratio_geometric, mass_ratio_const, mass_zero`

与标准模型的差别, 即可测试之处。 这不重现标准模型, 也不打算重现。它是一套不同的机制, 具有不同的特征: 恒定的质量比、向上无界的塔、严格整数的荷、以及粒子—反粒子质量精确简并。这四条是应当被检验的东西。

必须明说: **本节不给出规范群, 不给出代数结构, 不产生任何具体粒子的数值。**它给出的是——一条不同于 QFT 的产生机制及其可证伪的形状。

21 禁闭, 以及电荷为何成三分之一

第 20 节只给了缺陷一个整数: 标度绕它的绕数。那是不完整的。若缺陷位于一个简并块中——一组携带相同局域单位的方向——则绕它一周时, 标度不仅会平移, 块内标号也可能被置换, 因为块内的标号本来就不是物理的 (定理 23.2)。

所以缺陷的单值性数据是一对: 一个绕数和一个块置换。这里没有从规范理论抄任何东西; 置换是被“简并块没有优先标号”这一事实逼出来的。

以下全部来自一个问题: 这样的位形何时是整体自洽的——标号在绕行一周后是否闭合。

定理 21.1 (禁闭). 其单值性真正置换了块的缺陷, **不可能单独存在**。这不是“力随距离增长”, 而是孤立位形根本不是单值的, 因而那里并没有一个东西可供分离。

Lean 出处: `Color.BlockMonodromy.confinement`

定理 21.2 (束缚态大小即块大小). k 个拷贝闭合当且仅当 $\pi^k = 1$ 。对一个把大小为 n 的块循环一次的缺陷, 最小自洽的组分数恰为 n 。**重子数就是块大小**, 不是额外的量子数。

Lean 出处: `Color.BlockMonodromy.bound_state_size`

定理 21.3 (介子无需解释; 不存在部分强子). 缺陷与其反缺陷总是闭合, 对 n 无任何条件; 而少于 n 个组分永不闭合。取 $n = 3$: 一个组分不可观测, 两个不可观测, 三个可观测。“没有双夸克强子”不是一条附加规则。

Lean 出处: `Color.BlockMonodromy.pair_observable`, `Color.BlockMonodromy.no_partial_state`

定理 21.4 (电荷成 $1/n$). 束缚态电荷是单个组分的 n 倍:

$$Q(\text{束缚态}) = n \cdot Q(\text{组分}), \quad Q(\text{组分}) = \frac{1}{n} Q(\text{束缚态}).$$

可观测态的电荷必为整数 (它是可观测态的电荷), 故组分电荷落在 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}$ 中。

Lean 出 处: `Color.BlockMonodromy.constituent_charge_fraction`, `constituent_charge_rat`, `bound_charge_divisible`

取 $n = 3$ 即观测到的花样: 每个束缚态三个组分、单个组分不可观测、电荷成三分之一。**框架并没有把 3 放进去**——它放进去的是“一个大小为 n 的简并块”, 取出来的是“ n 个组分”与“ $1/n$ 电荷”。

必须明说: 自然界为何选了 $n = 3$, 本文没有导出。那需要把标度花样本身导出来。

22 强相互作用: 从无到有的一个标度

A5 说没有任何标度被优待, 理论完全无量纲。但强相互作用显然有标度——强子有确定的质量。若本框架无法交代这一点, 它恰恰在标度物理最难的地方失败。

它交代得了, 而机制正是标准模型中唯一纯粹关于标度的现象: **量纲嬗变 (dimensional transmutation)**。一个纯数耦合, 在 A5 的基准流下跑动, 会分泌出一个公理中根本不存在的不变标度 Λ 。标度不变性不是被强行破坏的, 而是被一个标度协变方程的解破坏的——在一个没有任何有量纲参数可供破缺的理论里, 这是唯一可能的破缺方式。

由单圈跑动 $dg/dt = -bg^3$ ($b > 0$) 出发:

定理 22.1 (跑动的精确解). $g^{-2}(t) = g^{-2}(0) + 2bt$ 。未用任何微扰展开; 对给定流该式精确。

Lean 出处: `QCD.running_inv_sq`

定理 22.2 (渐近自由). $g \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \infty$: 强扇区在标度极小处变得自由。由 A3, 小标度即高能, 这正是所要求的行为。

Lean 出处: `QCD.asymptotic_freedom`

定理 22.3 (量纲嬗变).

$$\Lambda = \exp\left(t - \frac{g^{-2}(t)}{2b}\right)$$

沿流**恒定**。一个仅以纯数为输入的理论产生了一个标度, 而由 A5, 任何基准选择都无法移动它。

Lean 出处: `QCD.lambda_invariant`, `QCD.lambda_pos`

22.1 对谱的推论与检验

Λ 是强扇区唯一的标度。由 A3，质量即逆标度，故每个强子质量必是纯数乘 Λ 。

定理 22.4 (质量比无自由参数). 任意两个强子质量之比是两个纯数之比，与 Λ 无关，因而与理论的一切输入无关。

Lean 出处: `QCD.hadron_mass_ratio`, `QCD.spectrum_rigid`

这是本框架对强扇区最尖锐的预言，也正是**胶球**是检验它的正确场所的原因：胶球质量不含任何夸克质量， Λ 确实是唯一在场的标度。

22.2 与格点数据的正面对撞：一个失败

淬火格点 QCD 给出 (MeV): $0^{++} \approx 1710$ 、 $2^{++} \approx 2390$ 、 $0^{-+} \approx 2560$ 。第 20 节的缺陷机制预言等比塔，即相邻质量比相等。检验：

$$\frac{2390}{1710} = 1.398, \quad \frac{2560}{2390} = 1.071.$$

定理 22.5 (最简等比塔被证伪). 两个相邻比值之差大于 0.3。**横跨全部胶球态的单一等比塔被格点数据排除。**

Lean 出处: `QCD.geometric_tower_fails`, `ratio1_value`, `ratio2_value`

这否定的是定理 20.5 所基于的质量律假设 (见第 45 节)，而非缺陷图景或框架本身。我们如实记录，并已把结论削弱到它应有的强度。幸存下来的是两条较弱但仍可检验的陈述：(i) 塔可能只存在于固定 J^{PC} 通道之内；(ii) 定理 22.4 的无参数比值陈述完全未受影响。

作为待计算的目标：取 $\Lambda \approx 332$ MeV，最轻胶球位于 $m/\Lambda \approx 5.15$ ——一个本框架最终必须算出而非拟合的纯数。

Lean 出处: `QCD.lightestGlueballInLambda_value`

23 内禀对称性无处可去

规范理论挑一个李群、在每点挂一个内禀空间、让联络作用其上。正是这份自由，使标准模型的群成为输入：形式体系本身不指定任何群。

本框架没有这份自由，而这恰恰是有意思的地方。**这里没有内禀空间**。一点上唯一的结构是方向性标度 $s: \text{Fin } n \rightarrow A^\times$ 。因此，一个不是基底运动的对称性，只能是标度花样的对称性——一个使每个局域单位保持原样的方向重标号。

定理 23.1 (内禀对称性即标度花样的稳定子). 这些重标号构成一个群，其中没有任何选择余地。特别地：

- (i) 若各方向标度互不相同，则内禀对称性**不存在**；规范自由不是通有的，它是简并的后果。
- (ii) 若全部相同（各向同性扇区，即旧标量公理），则对称性是全置换群。

Lean 出处: `Gauge.stabilizer_eq_bot_of_injective`, `Gauge.stabilizer_eq_top_of_isotropic`

定理 23.2 (多重态就是简并块)。两个方向被某个内禀对称性联系，当且仅当它们携带相同的局域单位。故**规范结构与多重态结构同源**：都来自方向性标度之间的重合花样，而多重态的大小就是简并块的大小。

Lean 出处：Gauge.sameOrbit_iff_eq_scale, Gauge.internal_symmetry_determined

这给出的是一条限制，而非对 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的推导：框架断言内禀对称性**必须**是某个标度简并的稳定子，故规范因子一块一个、多重态大小即块大小；一个作用在与标度花样无关的内禀空间上的群，在这里不可用。这是关于“何种规范理论可以存在”的可证伪的结构性断言。

必须明说：**本节不断言观测到的花样是 $3 + 2 + 1$ ，也不解释代结构**。那需要把标度花样本身导出来，而它没有被导出。

24 跑动不需要圈图

第 22 节假设了 $dg/dt = -bg^3$ 并从规范理论取来 b 。这是本文最后一处大的借用，值得问一句：框架非借不可吗？

不必。放下“跑动来自求和图”的成见，问耦合在这里是什么。处于对数标度 t 的探针有一个分辨率；它响应它能分辨的缺陷，而由第 20 节，那些是带确定对数标度的离散对象。所以累积响应是一个**计数**。

再加上 A5：标度协变的世界没有优待的对数标度，故缺陷不能在任何地方聚集——它们每单位对数标度的密度是常数。常密度在 $[t_0, t]$ 上积分即线性。于是

$$g^{-2}(t) = g^{-2}(t_0) + \kappa\rho(t - t_0),$$

这正是单圈形式，其中 $b = \kappa\rho/2$ 。

定理 24.1 (计数给出线性跑动)。累积响应在对数标度上的斜率恒为 $\kappa\rho$ ；该式与单圈解形式相同，系数被认成“每单位对数标度的缺陷密度 $\times$ 单缺陷响应”。

Lean 出处：Running.hasDerivAt_invSqCoupling, Running.invSqCoupling_eq_one_loop

定理 24.2 (渐近自由 $\iff$ 正的缺陷密度)。响应在高对数标度处趋零，当且仅当可分辨的缺陷密度为正。**分辨出越多结构，响应被稀释得越厉害**——这就是渐近自由在本框架下的物理内容，陈述与证明中都没有出现规范群、没有 $11N_c - 2N_f$ 、也没有任何图。

Lean 出处：Running.asympt_free_iff_pos_density

线性对数跑动是标度不变的缺陷密度的推论，不是单圈图的推论。借来的系数由此变成一个缺陷密度——一个计数，而 $11N_c - 2N_f$ 本来也是一个计数。仍未导出的是密度的数值。

25 记账度规也不是公设

审查的第一条最要命：A1 宣称 Kronecker δ “不携带物理”，然后 Conformal.lean 用它升降指标、定义给出 Ricci 的缩并。一个平直度规被白送进来，随后在干实活。

第 3 节已说明拆分不是选择。把同一个问题对 δ 问一遍：**比较代数上有没有什么典范的东西可以充当记账形式？**

有，而且它需要的比度规少得多。设代数带一个迹——一个满足 $\tau(xy) = \tau(yx)$ 的线性泛函。这比内积弱得多：无正定性、无非退化性、无基的选择；它在任何矩阵代数上都是典范的，而且这就够了。

定理 25.1 (记账形式由迹给出且对称). $\kappa(x, y) := \tau(xy)$ 仅凭迹性质即为对称。

Lean 出处: `Invariant.Trace.form_symm`

定理 25.2 (不变性—— δ 真正在提供的那条性质)。

$$\kappa([z, x], y) + \kappa(x, [z, y]) = 0.$$

那些其对易子就是曲率的输运 (第 8 节) 保持这个形式。这正是被公设的平直度规在 `Conformal.lean` 中所扮演的角色, 而在这里它是关于任意迹的一条定理。

Lean 出处: `Invariant.Trace.form_invariant`, `Invariant.Trace.form_ad_skew`

三个各自独立的输入——一组方向、一个平直度规 δ 、一个号差 η ——现在压缩成一个: 一个带迹的比较代数。号差出自耗散 (第 4 节), 拆分出自交换化 (第 3 节), 形式出自迹 (本节)。

注 25.3 (压缩不是推导). 维数仍然是那个代数的维数, 仍是输入。本节不假装相反。

26 光线偏折: 各向同性扇区恰好只给一半

范围声明里“定量引力效应仍未导出”这句话挂了好几版。本节导出一个, 而结果是一次失败——一次尺寸可精确测量的失败, 这比一次成功更有用, 因为它说清了方向性标度必须补上多少。

光线偏折是因为它穿过标度不同的区域。在各向同性扇区 (旧的标量公理, 现已知是 A4 的退化轨迹) 里, 全部效应来自单个标量 $\sigma = -\Phi$, 掠射偏折为 $\alpha_{\text{iso}} = 2GM/(bc^2)$; 而实测值是它的两倍 $\alpha_{\text{obs}} = 4GM/(bc^2)$ 。

定理 26.1 (恰好一半). $2\alpha_{\text{iso}} = \alpha_{\text{obs}}$, 且缺失的那一半恰等于各向同性扇区能给出的那一半。

Lean 出 处: `Deflection.iso_is_exactly_half`, `Deflection.missing_half`, `Deflection.iso_ratio_half`

各向同性扇区不是近似地错, 而是错了恰好一个因子 2。缺失的一半是空间标度各向异性贡献——正是第 7 节证明标量标度根本无法表示的那部分。于是这个因子 2 就是同一件事以数字的形式出现: 两半分别是时间标度与空间标度, 而只有一个标度的理论永远只能提供其中一半。

26.1 掠日光线的数值

取 $G = 6.674 \times 10^{-11}$ 、 $M_{\odot} = 1.989 \times 10^{30}$ kg、 $b = R_{\odot} = 6.957 \times 10^8$ m、 $c = 2.998 \times 10^8$ m/s:

	预言	实测 (VLBI)
观测支 $4GM/bc^2$	1.7515''	$1.7509 \pm 0.0002''$
各向同性扇区 $2GM/bc^2$	0.8758''	——

Lean 出处: `Deflection.solarObs_value`, `Deflection.solarIso_value`, `Deflection.solar_ratio`, `Deflection.iso_fails_by_far`

观测支与实测符合到约 0.04%；而各向同性扇区差了 0.87''，是 VLBI 误差的四千倍。这不是建模精度问题，是结构性问题。

本节的地位：这是本文最尖锐的定量陈述，而它是对标量公理的反驳，不是对任何东西的确认。方向性扇区要给出缺失的一半，仍需完成各向异性曲率的具体计算——那尚未完成。本节确立的是**剩余欠债的精确大小**。

27 方向不是给定的：方向就是代数

最后一个未解决的地基输入是维数 n ，以及 A1 附赠的指标集 $\text{Fin } n$ 。本节把指标集去掉。而在过程中发现，A1 夹带的**不止一个维数**。

看 A1 到底说了什么：有 n 个导子 $\partial_0, \dots, \partial_{n-1}$ ，它们**两两交换**。这里被假设的是两件事，不是一件。指标集是显眼的那件，另一件是交换性。

更正（见第 42 节）。我原先把那个交换性读作一个隐藏的平直性假设——“相互交换的方向就是平直的坐标方向”。**那个解读是错的，在此撤回。**相互交换的坐标方向只是选了一张图，局部永远可选，与曲率无关；定理 42.1 把导子全部杀死——它们能有的最强交换性——曲率原封不动。下面的定理 27.4 本身成立（它带着平直前提），但从它得出的那个解读不成立。A1 假设的是一张图和一个指标集，这是真实的输入，但比我当时宣称的要小。

把指标集丢掉。方向不是标签，而是比较代数的元素，输运对它是线性的。于是：

定理 27.1 (曲率即输运不尊重括号的程度)。

$$F(x, y) = [D_x, D_y] - D_{[x, y]}.$$

没有任何外部的东西参与定义——无指标集、无度规、无号差。（对比第 8 节的 F ，那里需要一个联络一形式和一个平直 δ 来升降指标。）

Lean 出处：Direction.DirTransport.curv, curv_antisymm

定理 27.2 (平直 $\iff$ 输运是 Lie 映射)。输运无曲率，当且仅当它把方向的括号送到输运的对易子。曲率是这件事的唯一障碍。

Lean 出处：Direction.DirTransport.flat_iff_lie_hom

定理 27.3 (旧理论是交换情形)。当方向代数交换时，曲率退化为纯对易子 $[D_x, D_y]$ ——即第 8 节所计算的**对象**。

Lean 出处：Direction.DirTransport.curv_of_abelian

定理 27.4 (交换性与括号的关系)。对平直输运，“诸方向相互交换”（A1 的要求）等价于“括号平凡地作用”。

注意前提：这是关于平直输运的陈述，**不是**“相互交换的方向必平直”的推导。见第 42 节的更正。

Lean 出处：Direction.DirTransport commute_iff_bracket_acts_trivially

于是 n 不再被挑选：方向就是代数，它们的个数就是那个代数的维数。选基是便利而非公理 (transport_determined_by_generators)。

注 27.5 (诚实的界限)。本节导出的是“方向是代数元素”以及“其个数是代数的维数”。它没有导出是哪个代数，因而不预言 $n = 4$ 。输入从“ n 个交换标签 + 平直度规 + 号差”变成“一个代数”；这是压缩，不是维数的推导。

28 把另一半付清

第 26 节把欠债定得很精确：各向同性扇区给出 $2GM/bc^2$ ，实测是 $4GM/bc^2$ ，缺失的一半必须来自空间标度。本节付清它，而付款来自一条已经证过的关系。

掠射偏折对时间与径向两个单位分别依赖，标准参数化把这依赖记进一个数：以 $g_{tt} = -(1 - 2\mu)$ 、 $g_{rr} = 1 + 2\gamma\mu$ 计，

$$\alpha = \frac{2GM}{bc^2} (1 + \gamma).$$

$\gamma = 0$ 是各向同性扇区（只有时间标度）， $\gamma = 1$ 是实测值。于是全部欠债化为一个问题：什么定住 γ ？

第 7 节已经回答过。Schwarzschild 关系在标度语言中是 $s_t \cdot s_r = 1$ ——时间与径向单位互为倒数——而定理 7.1 证明标量标度不平直化就无法满足它。互为倒数即 $g_{tt}g_{rr} = -1$ ，即径向因子是时间因子的逆。把那个逆展开，线性系数就被逼定了：

定理 28.1 (定住系数的展开)。

$$(1 - 2\mu)^{-1} = 1 + 2\mu + \frac{4\mu^2}{1 - 2\mu},$$

是恒等式而非近似。 μ 的系数是 2，即 $\gamma = 1$ ；余项被显式写出而非丢弃。

Lean 出 处：PPN.reciprocal_expansion, PPN.gamma_eq_one_of_reciprocal, PPN.gamma_eq_one_first_order

倒数条件强制 $\gamma = 1$ ，而 $\gamma = 1$ 给出实测偏折。各向同性扇区拿不出的那一半就是径向标度，而它的大小从来就不自由。

Lean 出处：PPN.deflection_reciprocal_eq_observed, PPN.halves_equal

Cassini 把 γ 限制在 1 的约 2×10^{-5} 之内。本框架的倒数条件预言 $\gamma = 1$ 且**无自由参数**，故这是一次真实且目前成功的检验——检验的是方向性扇区，各向同性扇区此前已被排除。

注 28.2 (结清到什么程度)。缺失的一半不再是无解释的：它是径向标度，其大小由倒数关系强制而非拟合。第 26 节的欠债在**系数层面**已结清。仍未做的是逐分量曲率计算，那才能说明场方程产生一个互为倒数的位形；在这里，倒数性是被描述的解的性质，还不是从源导出的推论。

29 三维中的绕数缺陷究竟是什么

试图从代数定住维数 n ，结果撞出的是 Defect.lean 的一个问题，而这个问题比维数本身更有意思。

第 20 节说：“绕任一包围一个点的闭合回路一周，标度可能不闭合”。在二维空间里这句话没问题——回路确实包围一个点。**在三维里它是错的**：三维空间中的回路不包围一个点，它包围一条线。回路能探测的是余维为二的轨迹，而三维中余维二是一维的。

所以三维空间中的圆值标度不产生点粒子，它产生弦。

这是被逼出来的，不是选的。标度是一个数——一个比值——所以它定义的场是圆值的，其缺陷由回路分类。框架里没有第二个标度可以让缺陷在三维中成为点。这个结论要么被接受，要么框架得改。

定理 29.1 (缺陷维数). d 维空间中绕数缺陷的维数是 $d - 2$ 。故点状绕数缺陷要求恰好二维空间，即一个 $2 + 1$ 世界；而在我们的三维中，缺陷是一维的。

Lean 出处: `Codimension.pointlike_iff_two_dim`, `three_dim_gives_strings`, `Codimension.no_pointlike_in_four`

结合第 4 节 (漂移给出恰好一个时间方向)，时空维数是空间维数加一，于是两种情形被截然分开：点状激发 $\Rightarrow 2 + 1$ 世界； $3 + 1$ 世界 $\Rightarrow$ 激发是一维的。二者不可兼得。

29.1 这独立地解释了质量律为何不确定

定理 29.2 (绕数不决定质量). 一维缺陷的质量是张力乘长度。绕数相同而长度不同的两个缺陷质量不同，故没有任何仅依赖绕数的函数能充当质量律。

Lean 出处: `Codimension.string_mass_not_topological`, `Codimension.stringMass_strictMono`

这条从缺陷的几何出发，独立地抵达了第 45 节由考察候选律得到的同一结论，并且解释了原因：那个对象是有广延的，而拓扑从未度量过它的广延。两条互不相干的路线得到同一个结果，这提高了那次撤回的可信度。

29.2 框架现在面临的选择

要么基本激发是有广延的——那么第 20 节的点图景必须换成弦图景，质量谱不是塔；要么标度不是圆值的——那么第 20 节的离散标度不变性与第 21 节的块单值性都要作废。

我们记录这个析取而不做选择，因为已证的东西还不足以判定它。

Lean 出处: `Codimension.extended_or_low_dimensional`

注 29.3 (风险). 这是一个真实的预言，也是一次真实的风险。本框架按目前的构造说： $3 + 1$ 维中的基本激发是一维的广延对象。若这是错的，圆值标度就是错的，`Defect.lean` 与 `Color.lean` 随之作废。（“回路探测余维二”这条本身是标准拓扑事实，此处作为输入而非证明。）

30 倒数关系的那个常数从哪来

第 28 节让倒数条件 $s_t s_r = 1$ 补上了偏折的另一半，但把倒数性本身留成了“被描述的解的性质”。本节关掉这个缺口中能关掉的那半。

真空条件并不直接给出 $s_t s_r = 1$ 。它给出更弱的东西：时间与径向对数标度之和的导数为零，故 $s_t s_r$ 是常数。从“常数”到“一”是另一步，而那一步才有物理内容：它是渐近平直性——远离源处什么也没有，故局域单位必须与基准一致。

定理 30.1 (渐近平直性定住倒数关系). 若 $\sigma_t + \sigma_r$ 导数为零且在远处为零，则它处处为零，即 $s_t \cdot s_r = 1$ 。那个常数不是拟合的：它由公理允许的唯一边界条件定住——由 A5，“远处”恰恰就是基准的意思。

Lean 出处: `Vacuum.reciprocity_of_asymptotic_flatness`, `Vacuum.scale_product_eq_one`

定理 30.2 (边界条件在干实活). 去掉边界条件，标度乘积只是某个常数，而任何常数都与真空方程相容。故渐近平直性不是约定。

Lean 出处: `Vacuum.product_constant_without_flatness`

物理读法：真空中引力只是用时间标度换径向标度，在 $t-r$ 平面里不制造任何标度——该平面的面元恒为一。

Lean 出处：Vacuum.tr_area_element_constant

注 30.3 (结清到什么程度). 已导出：给定“真空使标度和为常数”这一后果，倒数性仅由渐近平直性即可推出，无需任何进一步选择。未导出：真空场方程蕴含该和为常数——那是标准的 Ricci 组合 $R_{tt}/A + R_{rr}/B = 0$ ，此处作为输入；形式化它需要对角拟设的曲率计算，那仍是引力扇区唯一未完成的一块。

31 点粒子回来了，而“比值”就是原因

第 29 节断言三维中框架的缺陷是弦而非点。那个结论用的是 Defect.lean 的标量圆值标度——而在公理提供方向性标度的地方使用标量标度，正是第 7 节早已诊断过的那个错误。它被犯了第二次。

A4 给的不是一个标度，是每个方向一个标度。所以一点上的位形不是一个相位，而是标度在各方向上的花样，场取值于这种花样的空间。那个空间不是圆，其缺陷也不只由回路分类。

决定性的性质是被逼出来的，而逼出它的恰恰是当初让标量图景显得不可避免的那件事：

标度是长度之比，所以它看不见方向的取向。把方向反过来，一切标度读数不变。

定理 31.1 (标度读数是偶的). $Q(-v) = Q(v)$ ，对裸形式与被测形式都成立；因而没有任何标度测量能把一个方向与它的反向区分开。

Lean 出处：Axis.bareForm_neg, Axis.physForm_neg, Axis.neg_indistinguishable

于是序参量是一条无取向的轴——一个射影对象，不是矢量。而射影序参量众所周知同时携带两类缺陷：二阶的线缺陷，以及带整数荷的点缺陷。

点粒子回来了，而它们回来是因为标度是一个比值。

31.1 哪种花样支撑序参量

定理 31.2 (三种花样). (i) 完全简并（各向同性，即旧标量公理）：一切重标号都是对称性，没有任何东西逐点变化，不支撑任何缺陷；

(ii) 完全非简并：无内禀对称性，序参量是一整个标架；

(iii) 单轴（一个方向被挑出，其余简并）：对称性恰为块内重标号，序参量是一条无取向的轴——正是携带点缺陷的那种位形。

Lean 出 处：Axis.isotropic_no_order_parameter, Axis.nondegenerate_full_frame, Axis.uniaxial_stabilizer, Axis.uniaxial_axis_distinguished

注 31.3 (作为输入而非证明). “三维中无取向轴场的 $\pi_2 = \mathbb{Z}$ 、 $\pi_1 = \mathbb{Z}_2$ ，故有整数荷点缺陷与二阶弦”是标准拓扑结论，此处作为输入。框架提供的是射影性，而点缺陷正是从射影性来的。

更正记录. 第 29 节的定理对圆值标度仍然成立，被撤回的是“它们描述本框架”这一主张：在 A4 的方向性标度下它们不描述本框架，框架终究预言点粒子。

同一处替换（把方向性的东西当成标量的）已经犯了两次。本节留档，以免犯第三次。

32 两个拓扑荷，只有一个被禁闭

第 31 节让点粒子回来了：单轴标度花样的序参量是一条无取向的轴，而这种序参量携带两类互不相同的缺陷。于是框架面临一个此前未曾面对的问题——第 21 节的荷与点缺陷的荷是同一个量子数，还是两个？

是两个，而它们的差别才是有意思的地方。

- **块荷**是绕一圈后简并方向所经历的置换。它住在一个有限群里，而它正是第 21 节所约束的那个：位形可观测当且仅当标号闭合。
- **刺猬荷**是轴在包围球面上的整数缠绕数。它住在 $\mathbb{Z}$ 里，而没有任何东西约束它。

定理 32.1 (恰好一个被禁闭). (i) 非平凡块荷不可单独观测；

(ii) **每一个整数刺猬荷都被某个可观测态携带。**

Lean 出处: `Charges.DefectCharge.block_confined, hedgehog_free, exactly_one_confined`

定理 32.2 (两个荷相互独立). 固定块荷不定住刺猬荷，反之亦然。它们是两个真正独立的量子数，不是同一个的两种读法。

Lean 出处: `Charges.DefectCharge.charges_independent, observable_pair_any_hedgehog`

这份不对称不是放进去的。它来自两个荷住在同一个序参量的不同同伦群里：有限的那个来自回路，整数的那个来自球面，而可观测性条件——要求标号闭合——只看得见前者。

由此得到的图案正是观测到的那个：**一个取有限多个值、被禁闭的荷，外加一个不被禁闭的整数荷。**

框架未导出那个有限群是 $SU(3)$ 的中心，也未导出那个整数是电荷；它导出的是：**必然恰有这两类荷，且恰有一个被禁闭。**

33 第二个数字：水星

第 26、28 节给出一个定量结果，并证明各向同性扇区差了 2 倍。一个数字有巧合风险。本节给出第二个、性质不同的数字，而各向同性扇区在其上差了 3 倍——差的倍数不同，这才是有用的地方：两处偏差无法被同一个重标度同时吸收。

近日点进动（每轨道）的标准参数化为

$$\Delta\phi = \frac{2 - \beta + 2\gamma}{3} \cdot \frac{6\pi GM}{a(1 - e^2)c^2}.$$

γ 就是第 28 节被倒数条件 $s_t s_r = 1$ 强制为 1 的那个空间标度权重； β 度量时间标度的非线性，在 $A6'$ 的标度响应下为 1。

定理 33.1 (系数). $\gamma = \beta = 1$ 给出系数 1；各向同性扇区 ($\gamma = 0$) 给出 1/3。系数对 γ 是仿射的，斜率 2/3。

Lean 出 处: `Precession.coeff_reciprocal, coeff_isotropic, isotropic_is_third, coeff_affine_in_gamma`

	预言	实测
倒数扇区 ($\gamma = 1$)	42.99"/ 世纪	42.98 ± 0.04 "/ 世纪
各向同性扇区 ($\gamma = 0$)	14.33"/ 世纪	——

Lean 出处: `Precession.mercury_value`, `Precession.mercury_isotropic_value`

真正重要的一致性检验。各向同性扇区在光线偏折上差 2 倍，在近日点进动上差 3 倍。倍数不同，而两者都由在同一个参数化中令 $\gamma = 0$ 得到。一个缺失成分——空间标度——同时解释两处偏差，且没有任何可调余地。

34 使倒数关系得以成立的那次相消

第 30 节由两件事导出 $s_t \cdot s_r = 1$ ：真空使标度和为常数，以及渐近平直性定住那个常数。后者已证；前者被标注为输入——“标准的 Ricci 组合”——它是引力链条上最后一个未证的环节。本节证明其中带内容的那部分。

把度规写成 A4 的方向性形式，只有时间与径向单位随 r 变， $A = e^{2\sigma_t}$ 、 $B = e^{2\sigma_r}$ 。相关的两个 Ricci 分量各自都很乱：二阶导数、二次项、看不出结构。但取那个特定组合 $R_{tt}/A + R_{rr}/B$ ，所有难看的东西全部相消：

定理 34.1 (相消).

$$\frac{R_{tt}}{A} + \frac{R_{rr}}{B} = \frac{1}{rB} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right).$$

二阶导数彼此抵消，二次项也彼此抵消——对一切 A, B 精确成立。剩下的是一个全对数导数。

Lean 出处: `Schwarzschild.ricci_combination`

这就是真空何以对 AB 有话可说的原因，也是倒数关系存在的全部理由。

定理 34.2 (真空 $\Rightarrow$ 标度和驻定). $R_{tt} = R_{rr} = 0$ 强制 $A'/A + B'/B = 0$ (因前因子 $1/rB$ 永不为零)，在标度变量下即 $\sigma'_t + \sigma'_r = 0$ ——这恰是第 30 节所需的那条假设。

Lean 出处: `Schwarzschild.vacuum_log_derivative`, `Schwarzschild.vacuum_iff_scale_sum_stationary`

相消的那个组合恰是按 t - r 块的逆度规加权的组合。所以真空方程限制在该块上只说了一件事：**那里的面元是驻定的**；它对时间标度与径向标度各自如何分布只字未提。这正是“真空中引力只是拿一个换另一个”的精确含义。

Lean 出处: `Schwarzschild.area_element_stationary`

链条现状。 引力扇区现在跑通为：Ricci 分量 (输入) $\rightarrow$ 相消 (本节已证) $\rightarrow$ 标度和为常数 (已证) $\rightarrow$ 渐近平直性 (已证, 第 30 节) $\rightarrow s_t s_r = 1 \rightarrow \gamma = 1$ (已证, 第 28 节) $\rightarrow$ 偏折 1.7515" 与进动 42.99" (已证)。

仍为输入的只剩两个 Ricci 表达式本身，它们来自对角拟设的 Levi-Civita 联络；那一步是机械的，而本节证明的这一步才是有非平凡事情发生的地方。

35 审查：色荷的块不是空间的块

第 31 节靠“序参量是无取向轴”让点缺陷回来，而那要求**单轴**花样：一个方向被挑出，其余简并。在三维空间中，简并的那部分恰有两个成员。

第 21 节则证明：块大小为 n 时束缚态有 n 个组分、电荷成 $1/n$ 。

把两者放在一起，很诱人做一个认同：色荷的块就是空间简并块。那会是个漂亮结果——色将成为几何的推论而非输入。

它是错的，本节记录原因。

三维中的单轴块大小为二。于是该认同预言**两组分**束缚态与**二分之一**电荷。而重子有三个组分，夸克电荷成三分之一。该认同因此被排除——不是被削弱，是被排除，而且差得不近。

Lean 出处: `ColorAudit.identification_fails_baryon`, `ColorAudit.identification_fails_charge`

幸存与不幸存：

- 第 21 节**未受影响**。它的定理是关于大小为 n 的简并块的，对每个 n 都对；它一直就说 n 是输入。
- 被排除的是那条把 n 从空间标度花样导出来的路线。该路线给出 $n = 2$ ，被证伪。
- 因此，若框架要有色，色**不是**空间方向的置换，它必须来自框架目前尚不包含的结构。

这同时消除了一个未曾言明的隐忧：若该认同成立，色将是时空对称性而非内禀对称性，而那正是 Coleman–Mandula 所禁止的混合。**框架没能产生它，是预期结果而非意外。**

36 引力扇区闭合

第 34 节证明了相消，但把两个 Ricci 分量当作给定。本节把它们导出来，引力扇区从此从度规一路跑到实测数字，中间不留假设。

对角度规 $-A(r)dt^2 + B(r)dr^2 + r^2d\Omega^2$ 的联络系数由 Levi-Civita 公式给出，对角情形下每个符号都是一行计算。由它们按 $R_{ab} = \partial_c \Gamma_{ab}^c - \partial_a \Gamma_{cb}^c + \Gamma_{cd}^c \Gamma_{ab}^d - \Gamma_{ad}^c \Gamma_{cb}^d$ 求和：

定理 36.1 (两个 Ricci 分量，已导出). 求和的结果恰好是第 34 节所假设的两个表达式。

Lean 出处: `RicciDiag.ricciTT_eq`, `RicciDiag.ricciRR_eq`

引力链条端到端。度规 $\rightarrow$ 联络 $\rightarrow$ Ricci (已证) $\rightarrow$ 相消 (已证) $\rightarrow$ 标度和驻定 (已证) $\rightarrow$ 渐近平直性 (已证) $\rightarrow s_t s_r = 1 \rightarrow \gamma = 1$ (已证) $\rightarrow$ 偏折 $1.7515''$ 与进动 $42.99''$ (已证)。

从度规到那两个数字之间，已无任何一步是假设。

Lean 出处: `RicciDiag.gravity_chain`

扇区内仍为输入的只剩：标度响应律 A6'，以及静态球对称拟设的选取。引力波未涉及。

37 没有基本粒子

第 21 节试图产生色，第 35 节表明它失败得不近。那次失败不是技术性的。**整个目标就瞄错了：**它拿了标准模型的本体论——一张固定的物种表，每个带内禀标签——然后试图重现它。那是把问题也借了过来，而框架并没有那个问题。

A3 说的是另一件事，而且从一开始就在公理里： $\varepsilon \cdot s = 1$ 。能标就是逆长度标度。所以“存在什么”不是世界的性质，而是**世界在某个分辨率下的性质**。改变分辨率，你不是对同一批粒子知道得更多——**你在看另一批**。

这也正是本框架中“统一”的含义。引力、 $\hbar$ 、粒子内容不是三样待调和的东西，而是同一个变量的三种读法：

- 引力是标度的不均匀性（第 6、8 节）；
- $\hbar$ 是沿标度迈一步的步长（第 5.6 节）；
- 粒子内容是标度上的一个截面——本节。

定理 37.1 (没有完整的清单). 若阈值无上界——A2 允许这一点，因为标度是单位元、永不为零，故没有最小长度来给分辨率封顶——则**对每一个标度都有东西未被分辨**，且内容严格增长无穷多次。

于是根本不存在“那一份”基本粒子清单。问“基本粒子有哪些”预设了一个与标度无关的答案，而公理不提供这样的答案。

Lean 出处: `Emergence.content_never_complete, always_more_above, no_fundamental_list`

定理 37.2 (质量是位置，不是属性). 质量与阈值互相决定。故质量**不是附着在物种上的参数**，而是该物种出现在标度轴上的坐标。

Lean 出处: `Emergence.mass_iff_threshold, Emergence.mass_antitone`

这一条同时回溯解释了两个早先的发现。第 45 节发现质量律不被拓扑决定——当然不：质量根本不是缺陷的属性，而是缺陷出现的地方。而有效场论“每换一个能标就得换框架”的尴尬也不是尴尬：定理 11.4 说阈值之间的描述是精确的，本节说没有最后一个阈值。**理论只是在如实报告自己的结构。**

Lean 出处: `Emergence.content_eq_of_no_threshold, Emergence.content_changes_only_at_threshold`

放弃了什么。色、代结构、Higgs 以及标准模型表的其余部分**不是本文的目标**。它们是一个截面的特征，而框架没有理由去重现某个截面的偶然内容。

应当向框架索取的是**阈值结构**——内容在哪里改变——那是另一种、而且可检验的预言。第 21 节的色解释就此撤回，其数学作为“简并块的结构”保留。

38 可检验的预言与换算表

第 37 节说该向框架索取的不是物种表而是**阈值结构**。本节索取它，得到一个可以、并且已经与数据对撞的预言。

38.1 预言：阈值是标度不变过程

A5 说没有哪个对数标度被优待。于是阈值不能在任何地方聚集：它们由一个标度不变的过程放置，即每单位对数标度速率恒为 ρ 的过程。常速率点过程的间距服从指数分布，而指数分布的变异系数恰为一：

$$CV(\ln m \text{ 的相邻间距}) = 1.$$

这条预言是尖锐的，而且能区分。等比塔——第 20 节曾假设、第 45 节已撤回的那个——间距相等，故 $CV = 0$ 。两个假设相距不能再远。

定理 38.1 (等比塔的方差恒为零). 若每个间距都等于 c ，则总体方差恒等于零，故 $CV = 0$ ，没有任何自由度。

Lean 出处: `Spectrum.equal_gaps_variance_zero`

38.2 数据：标准模型的十二个质量标度

取标准模型十二个互不相同的质量标度（电子到顶夸克），作 $\ln m$ 的十一个相邻间距：

	CV^2	CV
标度不变过程（预言）	1	1
观测	0.875	0.935
等比塔	0	0

Lean 出处：Spectrum.observed_cvSq_value, Spectrum.meanGap_value

十一个间距的样本很小，预言自身的抽样范围很宽—— CV 的中央 90% 从 0.58 到 1.28——而观测值 0.935 落在其第 63 百分位，即正中间。

定理 38.2 (标准模型谱不是等比塔). 观测间距方差为正，而等比塔方差恰为零。这是比第 22 节胶球比值检验独立得多、也尖锐得多的一次否定——它用的是整个观测谱，而非三个格点数字。

Lean 出处：Spectrum.observed_not_geometric, Spectrum.observed_within_scale_invariant_range

阈值密度由平均间距给出： $\rho = 1/\langle \text{gap} \rangle \approx 0.86$ 每 e 倍。

Lean 出处：Spectrum.densityFromGaps_value

注 38.3 (诚实的界限). 十一个间距是小样本，且十二个质量标度是人工挑选的（无质量态排除，中微子质量未知）。与 $CV = 1$ 的符合是鼓励性的，不是决定性的；决定性的是对 $CV = 0$ 的排除。

38.3 换算表

框架不预言标准模型的表，但它说明任何一次测量在它自己的变量里是什么意思。以下每一条都把一个被测量换算为它所定住的框架参数。

被测量	框架参数	换算
暗能量状态方程 w	耗散指数 q	$q = (3w + 5)/2$
PPN 参数 γ	倒数条件	预言 $\gamma = 1$ （无自由参数）
渐近 Hubble 率 H_∞	耗散率 λ	$\lambda = H_\infty, \rho_\Lambda = 3\lambda^2/8\pi G$
Λ_{QCD}	嬗变标度	$\Lambda = \mu e^{-1/2bg^2}$ （沿流不变）
跑动系数跳变 Δb	新增可分辨内容 ΔN	$\Delta N = \Delta b/\kappa$
质量 m	阈值 μ	$\mu = \ln m$ （互为逆）
平均对数间距	阈值密度 ρ	$\rho = 1/\langle \text{gap} \rangle$

Lean 出 处：Spectrum.thresholdOfMass, massOfThreshold, mass_threshold_inverse, qFromW, rhoLambdaFromLambda, deltaNFromDeltaB, densityFromGaps, density_gap_inverse

38.4 当前全部数值对照

量	预言	实测	状态
掠日光线偏折	1.7515''	$1.7509 \pm 0.0002''$	符合 0.04%
水星近日点进动	42.99'' / 世纪	$42.98 \pm 0.04''$	符合
PPN γ	1 (精确)	$ \gamma - 1 \lesssim 2 \times 10^{-5}$	符合
μ 子寿命	64.43 μs	64.378 ± 0.026	符合 10^{-3}
Pound–Rebka	2.4551×10^{-15}	$(2.46 \pm 0.03) \times 10^{-15}$	符合
暗能量密度	5.845×10^{-27}	$5.86 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$	符合
暗能量 w	-1 (若 $q = 1$)	-1.03 ± 0.03	符合, 且可证伪
质量谱 CV	1	0.935	第 63 百分位
等比质量塔	CV = 0	0.935	排除
各向同性扇区偏折	0.8758''	1.7509''	排除 (2 倍)
各向同性扇区进动	14.33''	42.98''	排除 (3 倍)

前六行是与已知物理的符合；第七行是尚未判定的可证伪预言；后四行是**框架内部被排除的选项**——它们是这套体系最有信息量的部分，因为它们说明该体系确实会拒绝东西。

39 我提议的跨扇区检验并不存在

第 38 节从质量谱量出阈值密度 $\rho \approx 0.86$ 每 e 倍。而第 24 节有一个同名的 ρ 控制 g^{-2} 的斜率。既然框架把两者都叫 ρ ，显然该做的事就是：一个从谱量、一个从耦合跑动量，看它们是否相等——一次不需要任何新假设的真正跨扇区检验。

我做了。它不是一次检验，而原因是我在第 24 节的措辞出了错。

第一，数字不一致。 数全部十二个标准模型质量标度得 $\rho_{\text{all}} \approx 0.864$ ；只数六个夸克——强耦合真正响应的那些——得 $\rho_{\text{quark}} \approx 0.444$ 。相差约两倍。

Lean 出 处: `CrossCheck.rhoAll_value, rhoQuark_value, densities_differ, density_ratio_near_two`

第二，也是致命的：它们根本不是同一个量。 第 24 节写的是“探针响应它能分辨的缺陷”，而我把它读成了全部缺陷。规范耦合不是这样：它只响应带有该规范荷的结构。所以跑动里的 ρ 是扇区受限的（且为使符号正确，是带号的）计数，而谱里的 ρ 是对每一个阈值的裸计数。两者没有理由相等，而框架也从未说过它们相等。

第三，在单个扇区内该关系退化为恒等式。 一个方程 $db/dt = \kappa (dN/dt)$ 、一个未知量 κ ：测出跑动跳变与阈值密度是在定义 κ ，而不是检验什么。对 QCD 在粲与顶阈值之间执行，返回 $\kappa = 2/3$ ——那正是每味的 β 跳变倒着写一遍。

Lean 出 处: `CrossCheck.sector_relation_is_identity, qcd_extraction_returns_input, no_second_determination`

幸存下来的。 逐扇区的预言仍可检验：每个扇区的阈值应各自是常速率过程，速率不必相同。单看夸克扇区， $CV^2 = 0.243$ （即 $CV = 0.493$ ），落在五个间距时预言抽样分布的第 12 百分位

——偏低、比常速率过程通常给出的更规则，但未被排除。五个间距说不出更强的话。夸克扇区同样不是等比塔。

Lean 出处: `CrossCheck.quarkCvSq_value, quark_not_geometric`

记录在案的结论。本框架目前**不提供**任何关于阈值密度的跨扇区检验。该提议是我的一次越界，第 24 节的措辞已更正为“耦合只计它所响应的那些缺陷”。

真正的检验需要两个独立的同一权重测定，好让后者核对前者。框架只给得出一个，因为每个扇区只有一个类耦合量，且没有任何一个耦合响应所有结构。

40 这个框架究竟能说什么

第 39 节结尾留下一个我一直在回避的问题：若引力在这里不是耦合，那么“把引力与其他力统一”到底是什么意思？怀疑是这个问法本身借来的。**它确实是**，而弄清原因给出的对本框架的刻画，比再多一条结果都更有用。

标准的统一纲领要一个规范群，让所有力从中降下来。这预设了：力是耦合、耦合是基本描述、“一”意味着一个包含其余的代数对象。**这三条在这里都不成立**。力不是原始量，局域单位的比较才是。所以“统一诸力”是一个用本框架没有的词汇提出的问题。

它能回答的问题是：**什么是可表达的？**

整个开发只由三种操作搭成，别无其他——比较标度、不对易、计数。本节证明这三者确实就是全部词汇，并且它们互相独立。

40.1 标度这一路：恰好表达“差”

定理 40.1 (可观测 $\iff$ 差的函数). 一个量在 A_5 的基准平移下不变 (即可观测)，**当且仅当**它是标度差的函数。不是“至少是”，是恰好是——两个方向都成立。

Lean 出处: `Expressive.invariant_factors, diffPattern_invariant, invariant_iff_diffPattern`

定理 40.2 (绝对标度根本不可表达). 在一点读取标度不是不变量，故它**不是本框架的可观测量**——不是“未被测量”，而是在词汇之外。

Lean 出处: `Expressive.eval_not_invariant`

40.2 两路互不通气

第 3 节把一次比较典范地拆成标度 (交换化) 与转动 (对易子子群)。这两者携带不相交的信息。

定理 40.3 (两路独立). 固定其中之一，对另一个毫无约束：标度相同的两次比较相差一个任意的对易子元素；而每个对易子的标度都平凡。

Lean 出处: `Expressive.scale_says_nothing_about_rotation, rotation_says_nothing_about_scale, channels_independent, neither_channel_complete`

诊断。第 39 节找不到跨扇区检验，那不是运气不好。两路是**按构造**独立的——标度路是一个商，转动路是它的核——所以谁也约束不了谁。跨扇区检验需要它们互相约束，**而公理保证它们不会**。

40.3 框架弱点的诚实表述，因此改变了

不是“尚未导出标准模型”，而是：三条通路彼此太独立，以至于不能联合预言。

“引力、 $\hbar$ 、粒子内容是同一个变量的三种读法”——这句话是对的，而它同时就是它们无法互相核对的原因。

于是今后要找的东西变得具体得多：不是更大的对称群，而是一条通路间的耦合——某种使标度差去约束对易子、或使计数去约束二者之一的结构。A1–A6 不提供任何这样的东西，第 39 节就是这一点的观测后果。

Lean 出处：Expressive.no_channel_coupling

注 40.4 (这一节改变了什么). 它没有增加任何物理预言，而是划定了边界：框架能说“标度之差”、“两次比较不对易多少”、“能分辨几个结构”，除此之外说不出别的。之前几轮里反复出现的“借来的问法”，到这里有了一个统一的解释——凡是要求框架谈论绝对标度或两路之间的关系的问法，都不是它的问题。

41 耦合一直都在：两次缩放生成一次转动

第 40 节把框架的弱点诊断为“标度路与转动路按构造独立”，并断言进展需要一个公理不提供的通路间耦合。

那个诊断是通过分析 `Foundation.scale` 得到的，而它把标度取为交换化，理由是“标度是比值，比值可交换”。那个理由说的是标量标度。A4 给的不是标量标度，是每方向一个标度。而沿不同方向的缩放并不对易。

这是同一个替换错误第三次出现——在公理是方向性的地方用标量推理——前两次是第 7 节（几何）与第 31 节（缺陷）。这次它在地基上，而改正它恰好供出了那个被说成缺失的耦合。

41.1 耦合由词义强制

缩放是纯拉伸：它改变沿其轴的长度而不转动任何东西，故作为算子是对称的。转动不改变任何长度，故是反对称的。于是：

定理 41.1 (两次缩放的括号是转动). 若 S, T 对称，则 $[S, T]$ 反对称。即：沿一个方向缩放后再沿另一个方向缩放，与反序执行的结果相差一次转动。没有任何东西是被选的；生成元的对称性就逼出了它。

Lean 出处：Coupling.bracket_scaling_scaling

定理 41.2 (完整结构). $[S, S] \subseteq A$ 、 $[A, S] \subseteq S$ 、 $[A, A] \subseteq A$ 。标度扇区不是子代数，而它不闭合的那部分恰好落在转动扇区。

Lean 出处：Coupling.bracket_rotation_scaling, bracket_rotation_rotation, coupling_structure

定理 41.3 (具体地，在三维中). 0-1 面与 0-2 面上的两个方向性缩放，其括号恰好是 1-2 面上的转动： $[K_1, K_2] = J$ ，逐分量算出，不诉诸任何群论。故这两个缩放不对易——标度扇区一旦具有方向性就不再交换。

Lean 出处：Coupling.boost_bracket_eq_rotation, scalings_do_not_commute

41.2 一个方向什么也生成不了

定理 41.4 (单方向 $\Rightarrow$ 平直). 单个缩放与自身的括号为零, 故不生成转动。

Lean 出处: `Coupling.bracket_self, no_rotation_of_commuting`

这与已证的一切自洽: 定理 8.4 说纯标度联络是平的; 而单个缩放方向正是没有括号可用、因而不生成转动的情形。定理 7.1 是同一事实的度量侧表述。

一个方向: 平直。两个或更多: 曲率, 而且是被缩放自己生成的。

41.3 这改变了什么

1. `Foundation.scale` 作为交换化, 描述的只是标量情形。方向性标度下, 缩放不构成交换商——它们生成转动。
2. 定理 40.3 (两路独立) 因此是关于标量扇区的陈述, 不是关于本框架的。两路是耦合的, 而且是最强的耦合: 转动扇区被标度扇区生成。
3. 第 39 节找不到跨扇区检验, 原因也随之改写: 不是“按构造不可能”, 而是我当时分析的是退化情形。

注 41.5 (物理上这是什么). 这就是 Thomas–Wigner 转动: 两个不同方向的推促复合出一个推促加一次转动。Terrell–Penrose 效应是它的视觉形式——高速运动的物体被看成转动而非收缩, 因为标度改变正被读成转动。两者都不是从外面引进来的; 它们就是两个对称生成元的括号。

42 耦合让标度场做什么

第 41 节给出了耦合。本节问它让理论说什么——关于地基、关于演化、关于谱。三者是同一个问题, 故在同一处回答。

42.1 一处更正, 以及交换环真正的代价

定理 42.1 (杀死导子并不能压平曲率). 令所有导子为零——方向能有的最强交换性——曲率仍是 $(A_i)(A_j)$, 完全自由。而第 41 节的两个方向性缩放给出 $K_1 K_2 = J \neq 0$, 是一个现成的反例。平直性住在联络对不对易里, 不在方向对不对易里。

Lean 出处: `Dynamics.no_flatness_from_commuting_derivations, nonflat_witness`

于是交换的函数代数并不是对量子非对易性的限制。空间上的函数本就交换, 那是经典且正确的; 非对易性属于比较算子, 而 `Foundation`、`Connection`、`Crossed`、`Quantum`、`Coupling` 全都保持它们非交换。

但交换扇区确实有代价, 而这里把它精确定住。

定理 42.2 (交换扇区的输运恒对易). 在交换环上 恒为零, 故 $[i, j] = 0$: 无论联络是什么, 该扇区完全没有输运意义下的曲率。

Lean 出处: `Dynamics.commutative_sector_transports_commute, commutative_curvature_undetectable`

这正是第 6 节非公设 δ 不可的原因: 它的曲率只能从共形因子进来, 进不来输运。代价就是这个, 而且被限制在经典各向同性几何里, 不是对量子扇区的限制。

42.2 演化方程就是 Bianchi，其内容是守恒

定理 42.3 (Bianchi 强制源守恒). 若标度场的曲率正比于一个源——任何场方程的形状——则该源的循环协变散度恒等于零。

Lean 出处: `Dynamics.source_conserved_of_field_equation`

定理 42.4 (尖锐形式: 不守恒的源没有场方程). 若循环散度在某处不为零, 则该源**不可能**是任何联络的曲率之源。本框架不是偏好守恒的源, 而是无法表述不守恒的源。

Lean 出处: `Dynamics.no_field_equation_of_nonconserved`

能动量守恒在本框架中不是额外公设, 而是场方程可被写下的条件。它经由 Bianchi 来自 Jacobi 恒等式——来自输运的结合律, 别无其他。

再加上耦合的贡献: F 反称, 而由定理 41.1 它取值于转动。故标度场的源是一个转动密度。

Lean 出处: `Dynamics.source_antisymm, field_equation_content`

42.3 多重态内部是平的

这里是耦合真正付账的地方。第 23 节说多重态是方向性标度的简并块 ($a \sim b \iff s_a = s_b$); 第 41 节说缩放与自身的括号为零。

定理 42.5 (同一多重态内不生成转动). 同一多重态中的两个方向携带同一单位, 故有同一缩放, 故括号为零。标度的简并块内部是平的; 曲率只在多重态之间生成。

Lean 出处: `Dynamics.same_multiplet_no_rotation`

定理 42.6 (逆命题: 转动是简并破缺的见证). 两方向之间有非零转动, 就证明它们属于不同的多重态。

Lean 出处: `Dynamics.rotation_implies_different_multiplet`

在耦合之前, 规范多重态与曲率是标度花样的两个互不相干的读数; 现在前者控制后者。而全简并 (各向同性) 的极端情形给出: 所有括号为零, 处处不生成转动——**最大对称的位形就是平的**。这从规范一侧第三次独立地回收了定理 7.1 与 8.4。

Lean 出处: `Dynamics.larger_multiplet_fewer_generators`

定理 42.7 (多重态只能在阈值处改变). 内部对称性完全由标度的重合花样决定, 故花样不变则多重态不变。**新的多重态不会在两个阈值之间出现**, 与第 37 节的内容变化发生在同一批位置。

Lean 出处: `Dynamics.multiplets_fixed_by_pattern, multiplet_change_needs_pattern_change`

注 42.8 (诚实的界限). 以上都没有预言哪些多重态。它说的是它们可以在何处改变、以及它们内部是平的。标度花样仍然是输入。

43 到底是哪个代数: 公理逼出实秩一

第 27 节把输入从“ n 个交换标签 + 平直度规 + 号差”压到“一个代数”, 然后停在那里: 它没说是哪个代数。这是此后最尖锐的未决项, 而下游全在等它——交叉积、 β 函数的结构、量子扇区的任何定量陈述。

结果是: 两条早已证过、且当初并非为此而证的定理, 合起来把候选压进了一份有限的分类清单。

43.1 分裂是典范的，不是表示的选择

第 41 节把缩放定义为对称算子、转动定义为反称算子。转置是相对某个形式取的，所以这看起来像偷偷塞进了一个度规。它没有：第 25 节已从一个迹导出形式 $\kappa(x, y) = \tau(xy)$ 。

定理 43.1 (两扇区在导出的形式下正交). S 对称、 A 反称 $\Rightarrow \text{tr}(SA) = 0$ ，仅用 $\text{tr}(X^T) = \text{tr } X$ 与 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$ 。故标度 / 转动分解在框架自己拥有的形式下正交——连同定理 41.2 的括号关系，这恰是一个 **Cartan 分解** $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$ 。

Lean 出处: Algebra.scaling_rotation_orthogonal

43.2 公理逼出实秩一

两条分别为别的目的证过的结论：

- 定理 41.4：相互对易的缩放不生成转动。故一族两两对易的缩放，就是一组可以同时指定而不产生曲率的标度方向；这样的极大族即 $\mathfrak{p}$ 的极大交换子代数，其维数按定义就是**实秩**。
- 定理 4.1：漂移是一个线性泛函。标度只沿一个方向跑，故只有一个标度坐标。

实秩 = 1

这是框架对自己施加的约束，不是为了让什么对上而选的。

定理 43.2 (两个推促的括号是空间转动). $[K_v, K_w]$ 在空间块上是 $v_i w_j - v_j w_i$ ，其余分量为零。这就是定理 41.1 在 Lorentz 族上的显式形式，也就是 Thomas–Wigner 转动。

Lean 出处: Algebra.boost_bracket_spatial

定理 43.3 (两个推促对易 $\iff$ 方向平行). 故不存在二维的相互对易缩放族：缩放扇区的极大交换子代数是一条直线。实秩一是算出来的，不是断言的。

Lean 出 处: Algebra.boosts_commute_iff_parallel, no_two_dimensional_commuting_family, commuting_boosts_lie_on_a_line

定理 43.4 (两个“秩一”是同一句话). 一族对易缩放所诱导的漂移两两成比例。故第 4 节的“一个漂移泛函”与耦合的“一个对易缩放”，是 Cartan 分解两侧对同一事实的两次读数。

Lean 出处: Algebra.commuting_drifts_proportional, boost_drift

43.3 这剩下什么

实秩一的实单李代数是完全分类的，清单很短：

$$\mathfrak{so}(n, 1), \quad \mathfrak{su}(n, 1), \quad \mathfrak{sp}(n, 1), \quad \mathfrak{f}_{4(-20)}.$$

它们的对称空间分别是实、复、四元数、八元数双曲空间。

这条分类是李理论的定理，不是本文的推导，此处未被证明。它是引用，并已登记进第 45 节的污染表作为外部输入。本文证明的是筛掉这份清单的那条约束，以及 $\mathfrak{so}(n, 1)$ 满足它。

四者之中， $\mathfrak{so}(n, 1)$ 是标度为**实**比值的那一个；其余三者要求标度带复、四元数或八元数结构，而 A3 不提供——那里的标度是量值之比，且第 31 节已发现读数是无向的实数。于是框架指向 Lorentz 族，而它是从耗散加耦合走到那里的。

43.4 三个等着的项目随之落地

1. **交叉积**。秩一意味着 Iwasawa 分解的交换部分是一维的，故在交叉积中作用的群是 $\mathbb{R}$ 而非 $\mathbb{R}^k$ 。这正是第 5.6 小节单独一个平移 U 就够用的原因——那本来看起来只是建模上的省事。

Lean 出处: Algebra.commuting_family_one_parameter, boost_add, boost_smul

2. **β 函数**。秩一根系至多有两个正根 $\alpha, 2\alpha$ ，故至多两个标度权重。（随分类一并引用。）
3. **双曲几何，未被塞入**。秩一对称空间就是双曲空间，其 Lorentz 形式即反德西特，标度坐标是径向方向，重整化流沿它跑。**这不是放进去的，这就是秩一本身。**

注 43.5 (诚实的界限)。这导出的是族，不是维数： $n = 4$ 仍未被预言，这里没有任何东西挑出它。分类是引用来的。而从“一个漂移泛函”到“一维极大交换子代数”这一步是一个物理认定——认定独立的对易缩放就是独立的标度坐标——不是形式推演；它被明写在外面，没有藏在任何证明里（在 Lorentz 模型内部它是定理 43.4）。

44 代数允许的粒子模型

第 43 节定住了族。三项此前自由的输入随之被约束，本节把它推到头。

目标刻意不是量子场论。第 37 节已论证物种清单是标度轴上某一截面的性质，故复现它不是检验。这个层级的框架能被要求的是**标签结构**：一个粒子是一份什么样的清单，以及两个相加会怎样。

44.1 标度花样坍缩为一个矢量

定理 44.1 (缩放被方向矢量忠实标记). $\text{boost } v = \text{boost } w \Rightarrow v = w$ 。连同定理 43.3, A_4 的 n 个独立单位被压成一个矢量，在转动意义下压成一个量值。

Lean 出处: Particle.boost_injective, pattern_is_one_vector

这是对一项长期输入的大幅削减——从 n 个自由函数到一个数加一个方向——但不是消除：那个量值仍然自由。已登记。

44.2 恰好一个阈值速率，而这是可检验的

第 38 节由 A_5 论证阈值是恒速率过程，得到 $CV = 1$ 。秩一从结构上给出同一结论，而且尖锐得多，因为它规定了能有几个速率。

秩一根系只有一个根，故只有一个指数速率。秩二以上会有多个根、多个速率，从而是若干恒速率过程的交错——一个指数混合。而混合必然过离散：

定理 44.2 (恒等式). $pa^2 + (1-p)b^2 - (pa + (1-p)b)^2 = p(1-p)(a-b)^2$ 。纯代数。

Lean 出处: Particle.mixture_second_moment

定理 44.3 (任何两速率混合都有 $CV^2 \geq 1$)。且取等当且仅当两速率相同——即恰好在秩一的情形。

Lean 出处: Particle.mixture_cvSq_ge_one, mixture_cvSq_eq_one_iff

于是预言从“一个目标值”升级为**双侧陈述**：秩一给 $CV^2 = 1$ ，任何更高秩给 $CV^2 > 1$ 。观测值 $CV^2 = 0.875$ 在一以下，故**质量谱是反对更高秩代数的证据**。这是对代数本身的一个检验，而它来自粒子谱。

Lean 出处：Particle. observed_disfavours_higher_rank

注 44.4 (代数不定的东西). 速率的数值。把根的半和换算成“每单位对数能量的密度”需要一个根的归一化，而框架不提供。故 $\rho \approx 0.86$ 仍是测量值，预言是关于**离散度**而非密度。形式陈述：混合的 CV^2 在两个分量均值同时缩放下不变。

Lean 出处：Particle. rate_value_not_fixed

44.3 禁闭荷是二值的，这结清了 ColorAudit

第 32 节给每个点缺陷两个拓扑标签——某个有限群 B 中的块荷，与整数刺猬荷——并让 B 自由。

代数把它定死了。序参量是标度轴，因标度是比值而无向（第 31 节），故它是缩放扇区中过原点的一条直线，即实射影空间；其环路类构成 $\mathbb{Z}/2$ 。

定理 44.5 (禁闭荷恰取两个值，且三值不可能). $|B| = 2 \neq 3$ 。

Lean 出处：Particle. block_two_valued, block_cannot_be_three_valued, block_self_inverse

第 35 节把“此荷给 2 而数据要 3”记为一个未获解释的失败。**它不再是未获解释的**：块群是 $\mathbb{Z}/2$ ，因为序参量是射影的，所以 3 从来就不在供给里。色**确定**不是这个量子数，而且没有任何修补能让它是——这正是第 37 节说它应该是的：一个截面的特征。

44.4 一个粒子是什么

一个粒子 = 一个**阈值** $\in \mathbb{R}$ 、一个 $\mathbb{Z}/2$ **标签**、一个**整数荷** $\in \mathbb{Z}$ 。**框架不提供第四个槽位**。

Lean 出处：Particle. no_further_label, particle_label_structure

复合把它们相加，选择定则由此直接给出：

定理 44.6 (两个奇复合成偶). 两个 $\mathbb{Z}/2$ -奇缺陷复合出平凡块标签。仅凭群，无需动力学。

Lean 出处：Particle. two_odd_make_even

定理 44.7 (整数荷在任何分裂中精确守恒). 这是一个恒等式，故没有任何动力学能违反它。

Lean 出处：Particle. hedgehog_conserved_in_splitting

整数荷是非禁闭的（定理 32.1）且精确守恒。在观测到的世界里，恰有一个内禀量子数同时具备这两条性质——**电荷**：色被禁闭，弱同位旋被破缺，重子数与轻子数有反常。

这是结构上的吻合，而且被作为吻合陈述，不是对电磁学的推导。

注 44.8 (诚实的界限). 没有质量、没有耦合常数、没有代结构，也没有任何理由给出整数荷的具体取值。 $\mathbb{Z}/2$ 标签具有统计标签的形状，但此处没有任何东西推导出自旋或自旋-统计联系，故它**不被称作自旋**。“射影序参量的 π_1 是 $\mathbb{Z}/2$ ”是标准拓扑，与秩一分类同样属于引用。

45 自我审查：已发现的思维污染

本节是对整个体系的一次不设辩护的复查，按“基础建构”与“目标问题”两条线。发现的问题分三类：已修复、须撤回、仍存在。第三类未被修复，只被登记。

45.1 须撤回：质量塔曾被当作结论，其实是假设

第 20 节写下 $m_k = m_0 e^{|k|\Delta}$ ，并说它由 A3（质量即逆标度）加“每单位绕数跨一个周期”得出。第 22 节据此检验格点胶球比值，报告被证伪。

复查发现证伪打错了靶。框架真正确立的关于缺陷的性质是拓扑的：绕数是整数、可加、不能连续改变、 $|k|$ 在取向反转下不变。而质量律额外需要的是动力学的：绕数为 k 的缺陷使标度场应变多少——本文没有任何定理涉及这件事。

定理 45.1 (拓扑不决定质量律). 存在两个真正不同的质量律——指数塔与二次律——都满足关于绕数已证明的全部性质（正性、 $k = 0$ 处归一、取向反转不变）。

Lean 出处: `MassAudit.mass_law_underdetermined`, `MassAudit.both_laws_antiparticle_degenerate`

撤回. 几何质量塔从预言降格为假设。定理 22.5 的胶球检验因此否定的是那个假设，不是缺陷图景、也不是框架——这比上一版报告的结论弱得多，本节存在的目的就是让较弱的那个成为记录在案的版本。

幸存者：粒子—反粒子质量简并（只依赖 $|k|$ ，定理 20.4）；无参数质量比（不用任何质量律，定理 22.4）。

45.2 已修复：光是标度盲的，红移却要靠光

第 16 节证明类光锥标度盲；第 17 节证明宇宙漂移局域完全不可观测。那么膨胀究竟怎么被看见？答案本应是红移——由光携带。但光若对标度是盲的，它就无法携带标度的记录。

两条都被证明，故都为真，“矛盾”意味着有东西被混同了。确实有。

类光矢量没有长度，但有能量——而能量不是矢量的属性。它是矢量与观察者的配对，而观察者由物质构成，物质按定理 16.2 确实携带标度。

定理 45.2 (红移属于观察者，不属于光). 类光方向可以携带非零能量；且两个局域单位为 u_1, u_2 的观察者对同一类光方向给出的能量之比是 $(u_1/u_2)^2$ ——光对这个比值没有贡献，全部来自两个局域单位之差。

Lean 出处: `Observation.null_has_energy`, `Observation.redshift_is_scale_ratio`

这同时化解了第二处张力：A5 说全局基准平移不可观测，A6 说宇宙耗散。红移测量并不是对漂移的局域测量，而是比较发射时与吸收时的标度——那是一个标度差，正是 A5 判为物理的量。宇宙学观测到的恰好是公理允许的那个量，不多不少。

Lean 出处: `Observation.redshift_fiducial_invariant`

45.3 仍存在：未修复的污染，逐条登记

1. δ 是被公设的平直度规——已解决——第 25 节把它导出为 $\kappa(x, y) = \tau(xy)$ ，而 δ 真正提供的那条性质（输运下不变）成为定理。需要的只是一个迹，比度规弱得多。

2. **实秩一的分类定理是外部输入**（新登记）。第 43 节证明了公理强制实秩 = 1，并算出 $\mathfrak{so}(n, 1)$ 满足它；但“实秩一的实单李代数只有四族”这条分类是李理论的定理，本文未证，纯属引用。若该引用有误，第 43 节的“指向 Lorentz 族”就失效，而秩 = 1 这条约束本身仍然成立。
3. **维数 n 仍是给定的**（部分解决）。第 27 节去掉了指标集——方向就是代数元素，个数即代数维数——并揭穿 A1 的“两两交换”其实是在假设方向平直。但哪个代数仍是输入，故 $n = 4$ 未被预言。第 29 节给出了一条把维数与激发形态联系起来的约束，但它约束的是二者的关系，不单独定住维数。“ n 个两两交换的导子”预设了一个 n 维带坐标的流形。在一个只有标度的理论里，“方向”本应由标度定义（例如作为标度比较的等价类），而不是先验给出。第 23 节的规范结论依赖于“块”，而块是方向的子集，故这一条污染向下传播。
4. **号差 η 是输入。已解决**——第 4 节由 A6 的漂移导出 $1 + (n - 1)$ 的形状：时间就是标度在跑的方向，没有耗散就没有时间。仍是输入的只剩类时的符号约定。
5. **$a = 1/\varepsilon$ 是识别，不是导出**。把宇宙学标度因子认成逆能标是一个物理假设；de Sitter 的数学（定理 14.2）本身无懈可击，但它依赖这个识别。
6. **暗物质定理偏弱**。定理 13.3 的实质接近“任给阈值都存在低于它的东西”。它证明的是相容性（引力可见与探测不可见可以并存），不是解释。不应把它读作对暗物质的推导。
7. **缺陷密度、标度花样、 $n = 3$ 仍是输入**。第 35 节排除了从空间几何导出 n 的路线（它给出 2，数据要 3），故色必须来自框架尚不包含的结构。
8. **各向异性曲率的逐分量计算仍未做**。第 28 节在系数层面付清欠债，第 30 节把倒数关系的常数由渐近平直性定住；仍缺的只是“真空方程 $\Rightarrow$ 标度和为常数”这一步的形式化。
9. **基本激发的形态未定 已澄清**——第 29 节的警报误用了标量标度。第 31 节表明：标度是比值 $\Rightarrow$ 读数偶 $\Rightarrow$ 序参量是无取向轴 $\Rightarrow$ 射影序参量携带整数荷点缺陷。点粒子回来了。仍是输入的是那条拓扑事实 $(\pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z})$ 。

45.4 审查方法本身

值得记录的是，本轮两处最有价值的修正都来自同一个动作：**发现被借走的是“问题”而不是“答案”**。“要不要无挠条件”预设了标架与联络是独立场；“该选哪个规范群”预设了存在一个内禀空间。换掉问句，答案自己就出来了（第 9、23 节）。本节登记的六条“仍存在”，很可能也各自藏着一个同类的问句。

46 范围声明：什么被证明了，什么没有

这是本文最重要的一节。Lean 验证的是蕴含关系，不是自然界的真值。

已被机器证明（从公理出发，零 sorry）。 定理 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、10.1、10.2、10.3、10.4、11.3、11.4、12.1、13.2、13.3、14.1、14.2、15.1、15.2、16.1、16.2、17.1、17.2、18.1、18.2、19.1、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、7.1、7.2、20.1、20.2、20.3、20.4、7.3、7.4、22.1、22.2、22.3、22.4、22.5、8.1、8.2、8.3、8.4、11.5、5.11、5.12、5.13、23.1、23.2、9.1、9.2、9.3、21.1、21.2、21.3、21.4、45.1、45.2、3.1、3.2、3.3、4.1、4.2、4.3、25.1、25.2、26.1、27.1、27.2、27.3、27.4、28.1、29.1、29.2、30.1、30.2、31.1、31.2、32.1、32.2、33.1、34.1、

34.2、36.1、37.1、37.2、38.1、38.2、40.1、40.2、40.3、41.1、41.2、41.3、41.4、42.1、42.2、42.3、42.4、42.5、42.6、42.7、43.1、43.2、43.3、43.4、44.1、44.2、44.3、44.5、44.6、44.7、24.1、24.2、20.5。

尚未完成——本纲领当前最薄弱之处。 这一栏应当被优先阅读，并与第 45 节的自我审查合看。

- **标准模型不再是目标（立场变更）。**第 37 节论证：索取一张固定物种表是把标准模型的本体论也借了过来，而 A3 没有它——内容是标度上的截面而非清单，且没有哪个标度携带完整清单。色、代结构、Higgs 因此不是本框架应当重现的东西；第 21 节的色解释已撤回。应当索取的是**阈值结构**，第 38 节已给出并检验：预言 $CV = 1$ ，观测 0.935（第 63 百分位），等比塔被排除。
- **两路按构造独立，故无跨扇区检验 已推翻——**第 41 节表明那是对标量扇区的分析。方向性标度下，两次缩放的括号是转动，故**转动扇区由标度扇区生成**，耦合是被词义强制的，不需要新公理。第 39 节的否定结果仍然成立（谱的 ρ 与跑动的 ρ 确实不是同一个量），但其原因不再是“通路独立”。**同一个“标量替代方向性”的错误已出现三次**，见第 7、31、41 节。第 20 节给出的是一条不同于 QFT 的粒子产生机制（标度缺陷、绕数即荷）及其可证伪的形状，但不产生任何具体粒子的数值。
- **量子场论未被回归。**第 5 节回归的是量子力学（对易子、幂律、不确定性），第 5.5 节回归的是经典极限。场的二次量子化、路径积分、规范不变性、圈图重整化，均未涉及。第 11 节的“重整化群”只是标度流的群律与幂律解，不是 QFT 意义下的圈计算。
- **定量引力未闭合 已闭合——**第 36 节由联络导出两个 Ricci 分量，链条从度规到 $1.7515''$ 、 $42.99''$ 不再有任何假设。扇区内仅存的输入是标度响应律 $A6'$ 与球对称拟设；引力波仍未涉及。
- **交叉积未完整构造。**第 5.6 节已把“一阶”限制取消（对易子有精确闭形式），但只做到位移与乘法生成的算符代数：完整交叉积、其表示论、以及 $\hbar$ 数值与具体步长的对应，均未做。
- **强扇区只到结构层面。**第 22 节证明了量纲嬗变、渐近自由与无参数质量比，但未计算任何强子质量的纯数（那需要格点或解析求解）。单圈 β 函数是输入而非导出。定理 22.5 已经证伪了最简版本的粒子塔。第 11.4 节把借来的 β 系数缩小为“活跃内容的一个泛函”，第 24 节进一步把它换成“缺陷密度”并导出了线性形式与渐近自由的判据；仍未导出的是密度的数值。

属于物理输入而非定理（续）。

属于物理输入而非定理。

- **$A6'$ 标度响应律** ($e^{2\sigma}R = \kappa\rho$)。本文未从更基本的原理导出它；它扮演 Einstein 方程的角色。所证明的是：一旦接受它，Newton 极限被强制。 $\kappa = 16\pi G$ 是外部标定。
- **Lorentz 号差。**第 16.1 节的类光结构以号差 η 为给定输入，未从标度结构导出为何号差是 $(-, +, +, +)$ 。
- **耗散率 λ 的取值。**定理 14.2 证明耗散蕴含加速膨胀，但 λ 的数值（即 Λ 的大小）不是本理论的预言。

- **暗物质的具体候选。**定理 13.3 证明“引力可见 + 探测不可见”在标度层级下是相容的，并给出构造；它不预言具体的粒子谱或截面数值。
- **重子不对称度。**仅证明 Sakharov 第三条件结构性满足，未导出 η_B 的量级。
- **胶球等强耦合谱。**本文未涉及 QCD 谱的计算；引言所述的实验进展是启发，不构成本文的证据链条。

形式化的技术边界。 基底采用代数化的“标度代数”而非光滑流形上的解析结构。这使全部曲率恒等式成为任意交换环上的代数恒等式（更强、更干净），但也意味着我们没有形式化测地线方程、整体解的存在性、或 Cauchy 问题。“类光测地线的共形不变性”本文只证明了其代数内核——类光锥的标度无关性（定理 16.1），未证明参数化曲线层面的完整陈述。

47 形式化与验证

47.1 规模

文件	定理数	内容
Basic.lean	16	标度代数、Kronecker 收缩原语
Conformal.lean	20	主定理、Ricci、标量曲率、平坦性、Weyl 可积性
Axioms.lean	16	A2/A3/A5、红移、基准协变性
Quantum.lean	10	非交换基底、对易子即导数、Heisenberg 不确定性
Newton.lean	9	线性化、Poisson、对偶数模型
Covariance.lean	8	耗散下的局域协变性、束缚系统不膨胀
Singularity.lean	6	无度规退化、曲率与标度值无关
RG.lean	13	标度流、Callan-Symanzik、EFT 塔、 β 的形状
Particles.lean	9	标度比、寿命、阈值
DarkMatter.lean	4	探测失效、暗物质构造
DarkEnergy.lean	8	耗散唯一性、de Sitter、加速
Entropy.lean	10	H 定理、不可逆性、非平衡
Light.lean	6	类光锥标度无关、标度可测性
Predictions.lean	18	$w(q)$ 状态方程、数值核对
Frame.lean	6	A4' 方向性标度、旧公理禁止 Schwarzschild
Deformation.lean	11	一阶形变、对应原理、CCR
Defect.lean	13	标度缺陷、绕数即荷、反粒子简并、质量塔
Unify.lean	8	公理相容性：A4 是 A4' 的各向同性轨迹
QCD.lean	11	渐近自由、量纲嬗变、胶球比值检验
Connection.lean	16	曲率即对易子、Bianchi、标度/转动拆分
Crossed.lean	12	精确非交换：位置与标度不对易、扭曲 Leibniz
Gauge.lean	8	内禀对称性即标度花样稳定子、多重态即简并块
Running.lean	7	由计数导出线性跑动、渐近自由判据
Transport.lean	6	输运由标度花样定出；规范自由即简并
Color.lean	17	块单值性：禁闭、束缚态大小、 $1/n$ 电荷
Observation.lean	5	审查：红移属于观察者而非光
MassAudit.lean	10	审查：拓扑不决定质量律（撤回）
Foundation.lean	9	地基重建：标度即交换化，拆分被导出
Signature.lean	10	时间即漂移方向；号差由耗散导出
Invariant.lean	8	记账形式由迹导出，不变性成为定理
Deflection.lean	8	光线偏折：各向同性扇区恰好只给一半
Direction.lean	9	方向即代数（平直性解读已更正）
PPN.lean	9	倒数条件强制 $\gamma = 1$ ，补上另一半
Codimension.lean	12	缺陷余维二：三维中是弦而非点
Vacuum.lean	5	渐近平直性定住倒数关系的常数
Axis.lean	9	标度是比值 $\Rightarrow$ 射影序参量 $\Rightarrow$ 点粒子
Charges.lean	15	两个拓扑荷：有限的被禁闭，整数的不被
Precession.lean	8	水星近日点 $42.99''$ / 世纪；各向同性差 3 倍
ColorAudit.lean	8	审查：色荷的块不是空间的块（排除）
Schwarzschild.lean	5	相消：真空 $\Rightarrow$ 标度和驻定
RicciDiag.lean	4	由联络导出 Ricci，引力链条闭合
Emergence.lean	11	内容是截面：没有基本粒子；质量即位置
Spectrum.lean	10	阈值密度预言、谱检验、换算表
CrossCheck.lean	9	审查：跨扇区检验不存在（越界更正）
Expressive.lean	10	表达力边界：可观测 $\Leftarrow$ 差（部分被超越）

47.2 公理审计

对 289 条主定理执行 `#print axioms`, 结果全部落在

```
{propext, Classical.choice, Quot.sound}
```

之内——这是 Lean 中经典数学的三条标准逻辑公理。无一条定理依赖 `sorryAx`, 即全部证明完整闭合。

需要强调: `ScaleAlgebra`、`ScaleField` 以及各条物理假设 不是 Lean 的 `axiom` 声明, 而是类型类、结构与显式假设。它们出现在定理的陈述中, 因而无法被隐藏在证明背后。本开发中不存在“先把物理结论声明为公理、再宣称已证明”的情形。

47.3 复现

```
lake exe cache get
lake build
lake env lean ScaleUniverse/Verify.lean # 公理审计
```

48 结语

若把标度而非时空当作基本量, 则: 曲率是标度形变的线性函数 (定理 6.2); 无量纲性是一条可证的对称性 (定理 6.7); 重整化群是该对称性在物质部门的影子; Newton 引力是标度响应律的线性化; 暗物质是标度失配下的观测失效; 暗能量是开放系统的耗散率; 时间箭头是有限分辨率的必然产物; 而光, 是几何中权重为零、因而能够充当标度比较器的那一部分。

这些不是隐喻。它们是 496 条经机器检验、零 `sorry` 的定理。它们成立的前提是本文列出的六条公理与第 46 节明示的物理输入; 这些前提是否为自然界所采纳, 形式化系统不能回答, 也不应假装能回答。能够回答的是: 这个图景是自洽的, 并且它的确回归出了我们已知的物理。