

SCD ——标度耦合动力学

内部交流报告：一个无量纲公理体系的当前状态

全部结论在 Lean 4 中机器验证，无一处 sorry

形式化验证于 Lean 4 (v4.32.2) + Mathlib

摘要

这是一份内部交流报告，不是论文。它记录一个仍在推进的公理体系的当前状态，包括已被推翻和已被更正的部分——那些与结论同样重要，集中列在第 51 节。

体系的基本命题是：时空不是预先给定的几何背景，标度才是基本量。由 $A3 (\varepsilon \cdot s = 1)$ 局域能动量就是局域标度；标度之差表现为曲率；而“存在什么”是标度轴上的一个截面，不是世界的属性。

被导出而非假设的：标度 / 转动的拆分、Lorentz 号差、记账形式、标度与转动的耦合（两次缩放的括号必为转动，由词义强制）、实秩一从而 Lorentz 代数族、 $n = k + 1$ 、守恒律出自 Bianchi、以及从度规到 $1.7515''$ 与 $42.99''$ / 世纪的完整引力链条。

理论的分叉点是各向同性 / 异性二分：各向同性轨迹上无序参量、无荷、无多重态、无转动；各向异性轨迹上它们一并出现。而花样是否各向同性是标度相关的事实——这就是“相互作用随能标下降而分离”的导出。

当前的记分牌：一条活张力（DESI 对 w 不演化， $2.8-4.2\sigma$ ，但 BAO 单独自洽且各联合互相矛盾），一个活的开放问题（ $f_0(500)$ 极点落在界的哪一侧），其余通过。光子无色散这条与所有预设最小长度的纲领分道，且正在赢。

边界声明：Lean 验证的是从公理到结论的蕴含，不是公理为真。第 57 节逐条区分定理与外部输入。

形式化规模：615 条定理、11878 行 Lean 代码、61 个文件；全部 615 条定理经 `#print axioms` 审计（清单由源码生成而非人工挑选，故无一条能悄悄漏掉），仅依赖 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`，无 `sorryAx`。

如何读这份报告

九个部分按理论最终定下的逻辑顺序排列，不是开发顺序：

- 第一部分——七条公理，全在一处。
- 第二部分——公理逼出什么。单线：地基拆分 → 号差 → 记账形式 → 方向 → 曲率即对易子 → 耦合（铰链） → 实秩一 → 维数 → 轴数。
- 第三部分——分叉点。此后两条路互不相同。
- 第四 / 五部分——各向同性扇区（几何与引力） / 各向异性扇区（标签与荷）。
- 第六 / 七部分——量子扇区 / 标度流与内容。
- 第八部分——预言，以及与 DESI / PDG / Fermi-LAT 的对质。
- 第九部分——登记册：撤回、更正、引用未证、登记假设。

在采信任何结论之前，请先读第 51 节。那里列出被撤回的 4 条、被限缩适用域的 6 条、引用未证的 2 条、登记假设的 2 条，以及同一个“标量代替方向性”错误出现的 5 次——其中一次挺过了一次形式化和一版报告。没有撤回记录的开发是没有被审计的开发。

目录

如何读这份报告	1
1 导言：把“尺度”而不是“时空”当作基本量	2
2 物理图像：这个世界看起来是什么样	2
2.1 没有空间，只有一个比值	3
2.2 “两个地方”不是原语，而是被构造出来的	3
2.3 标度是有方向的，因为能动量是张量	3
2.4 引力是尺子在变，不是空间在弯	3
2.5 转动是方向在变——而且它由缩放生成	3
2.6 $\hbar$ 是标度轴上的一个步长	3
2.7 “存在什么”是一个截面，不是世界的属性	4
2.8 粒子是标度矢量场里梳不开的结	4
2.9 宇宙不在膨胀，是标度在跑	4
2.10 黑洞任意黑，但不全黑	4
2.11 把十条串起来	4
I 第一部分 公理	5
3 基底与公理	5
3.1 微分基底	5
3.2 七条公理	5
II 第二部分 公理逼出什么	7
4 地基重建：拆分不是一个选择	7
5 时间就是标度正在跑的那个方向	7
6 记账度规也不是公设	8
7 方向不是给定的：方向就是代数	9
8 曲率就是对易子	10
8.1 避开一次惯性	10
8.2 Yang-Mills 曲率不是被假设的，是被算出来的	10
8.3 究竟是哪一部分在弯曲	10

9 耦合一直都在：两次缩放生成一次转动	11
9.1 耦合由词义强制	11
9.2 一个方向什么也生成不了	11
9.3 这改变了什么	12
10 到底是哪个代数：公理逼出实秩一	12
10.1 分裂是典范的，不是表示的选择	12
10.2 公理逼出实秩一	12
10.3 这剩下什么	13
10.4 三个等着的项目随之落地	13
11 最后两项输入究竟是什么	14
11.1 方向是表示，不是代数	14
11.2 两条同形的自匹配条件，答案不同	14
11.3 自由的量值不是缺陷	14
11.4 两项自由在何处相遇	15
12 两难消解，而且更多轴不可得	15
12.1 转动是花样与其自身变化的楔积	16
12.2 更多轴不是不受青睐，而是不可得	16
12.3 这在别处的代价	17
III 第三部分 分叉点	18
13 A7，以及立场转变所迫的一次审计	18
13.1 A7（可观测性），作为公设	18
13.2 反驳	18
13.3 解药一直在文件里	19
14 耦合让标度场做什么	19
14.1 一处更正，以及交换环真正的代价	19
14.2 演化方程就是 Bianchi，其内容是守恒	20
14.3 多重态内部是平的	20
IV 第四部分 各向同性扇区：几何与引力	21
15 几何的涌现：曲率即标度形变	21
15.1 Levi-Civita 数据	21
15.2 主定理	21
15.3 迹与标量曲率	22
15.4 可积 Weyl 几何：没有第二时钟效应	22
15.5 无量纲性是一条定理	23

16 A4 太强：标度必须是方向性的	23
16.1 诊断	23
16.2 旧公理不是没能给出 Schwarzschild，而是禁止了它	23
16.3 一套公理，而不是两套	24
17 引力与规范场是同一个东西	24
18 引力红移与 Newton 极限	25
18.1 引力红移	25
18.2 标度响应律	25
18.3 一阶区域	25
18.4 一阶区域不是“扔掉高阶项”	26
19 使倒数关系得以成立的那次相消	26
20 引力扇区闭合	27
21 倒数关系的那个常数从哪来	27
22 光线偏折：各向同性扇区恰好只给一半	27
22.1 掠日光线的数值	28
23 把另一半付清	28
24 第二个数字：水星	29
25 耗散之下的局域广义协变性	30
26 奇点只是极小的尺度	30
27 黑洞、引力波，以及哪些标准问题是我们的	30
27.1 没有奇点——也没有视界	30
27.2 引力波，以及一个尖锐的判别式	31
27.3 偏振数恰为二，而呼吸模是被禁止的	31
27.4 黑洞熵是对数的，不是面积律	32
27.5 哪些问题是借来的	32
28 引力波动力学：旋近、波形与辐射功率	33
28.1 诚实的分工，先说清楚	33
28.2 什么在辐射：守恒定理杀掉低阶	33
28.3 圆轨道双星	33
28.4 啁啾：干涉仪实际测的量	33
28.5 对数据	34
28.6 框架确实分道之处：没有视界	34
V 第五部分 各向异性扇区：标签与荷	35
29 内禀对称性无处可去	35

30 点粒子回来了，而“比值”就是原因	35
30.1 哪种花样支撑序参量	36
31 粒子：不用场的产生机制	36
32 两个拓扑荷，只有一个被禁闭	37
33 代数允许的粒子模型	38
33.1 标度花样坍缩为一个矢量	38
33.2 恰好一个阈值速率，而这是可检验的	38
33.3 禁闭荷是二值的，这结清了 ColorAudit	39
33.4 一个粒子是什么	39
34 没有基本粒子	40
VI 第六部分 量子扇区	41
35 非交换基底：量子力学的回归	41
35.1 导数就是对易子	41
35.2 经典微积分是对易子的定理	41
35.3 A3 在非交换扇区只能成立到 $\hbar$	42
35.4 形变量子化：经典极限的严格形式化	42
35.5 把“一阶”这个限制取消掉	43
36 闭合量子引力回路	43
36.1 原封不动的部分	44
36.2 改变的只有一件事	44
36.3 预言	44
VII 第七部分 标度流与内容	46
37 重整化群是定理，不是方法	46
37.1 标度流	46
37.2 自相似只能是幂律	46
37.3 阈值之间，描述是精确的	46
37.4 有效场论塔是定理而非窘境	47
37.5 β 函数从哪里来	47
38 跑动不需要圈图	47
39 强相互作用：从无到有的一个标度	48
39.1 对谱的推论与检验	48
39.2 与格点数据的正面对撞：一个失败	48

40 广延的代价、转动是什么、以及为什么是三	49
40.1 标签泛滥是覆盖范围的代价，不是结构的证据	49
40.2 转动的原生量是楔积——而这打破了前面	50
40.3 为什么是三个空间方向	50
41 寿命的动量依赖：γ 就是两个标度之比	50
42 暗物质：相互作用发生，观测失效	51
43 暗能量：耗散率就是 Λ	52
44 时间箭头	52
45 光：标度盲的类光锥	53
 VIII 第八部分 预言与数据	 54
46 可检验的预言	54
46.1 耗散指数与暗能量状态方程	54
46.2 代入常数：三项数值核对	54
46.3 反演公式	55
47 可检验的预言与换算表	55
47.1 预言：阈值是标度不变过程	55
47.2 数据：标准模型的十二个质量标度	55
47.3 换算表	56
47.4 对照表已并入第 50 节	56
48 这个立场究竟预言什么	56
48.1 耗散速率是常数，故 w 不演化	56
48.2 没有初值，而这是定理	57
48.3 暗物质就是各向同性轨迹	57
48.4 共振峰	58
49 框架自己的问题	58
49.1 分离不是原语，非平行才是	58
49.2 只有一个开关，不是每种相互作用一个	59
49.3 内容属于区间，从不属于标度	59
49.4 没有全局场方程，而 A6 是原因	59
49.5 量子引力实验是一次“次序检验”	60
49.6 缺陷成对出现，且宇称相同	60
49.7 没有最大密度	60
49.8 这七条的共同点	60

50 与数据对质	61
50.1 w 不演化——这与 DESI 有张力	61
50.2 共振宽度界——两个旗舰确定值分居两侧	61
50.3 光子无色散——通过，而且在分道	62
50.4 恰好一个非禁闭精确守恒荷——而无中微子双贝塔衰变裁决它	62
50.5 总表：全部数值与全部预言	63
 IX 第九部分 登记册：撤回、更正、与边界	 64
51 自我审查：已发现的思维污染	64
51.1 须撤回：质量塔曾被当作结论，其实是假设	64
51.2 已修复：光是标度盲的，红移却要靠光	64
51.3 登记册（一）：已撤回的主张	65
51.4 登记册（二）：已限缩适用域的主张	65
51.5 登记册（三）：已解决的项目	66
51.6 登记册（四）：仍然开放	66
51.7 登记册（五）：引用而未证，与登记的假设	67
51.8 审查方法本身	67
 52 （已撤回的解读）块单值性、禁闭与分数电荷	 67
 53 审查：色荷的块不是空间的块	 68
 54 （已撤回）三维中的绕数缺陷究竟是什么	 69
54.1 这独立地解释了质量律为何不确定	69
54.2 框架现在面临的选择	69
 55 这个框架究竟能说什么	 70
55.1 标度这一路：恰好表达“差”	70
55.2 两路互不通气	70
55.3 框架弱点的诚实表述，因此改变了	71
 56 我提议的跨扇区检验并不存在	 71
 57 范围声明：什么被证明了，什么没有	 73
 58 形式化与验证	 74
58.1 规模	74
58.2 公理审计	76
58.3 复现	76
 59 结语	 76
 A 定理索引：全部 615 条	 78
 附录：定理索引	 78

1 导言：把“尺度”而不是“时空”当作基本量

标准图景中，时空流形与度量先验存在，物质在其上运动，Einstein 方程把二者耦合起来。这一图景在量子场论面前是尴尬的：QFT 的核心操作——重整化——是关于能标的，而广义相对论的核心对象是长度。二者在自然单位制下互为倒数，却被安放在理论结构的两个完全不同的层次上。

本报告采取相反的次序。设定如下：

- 基底只有一套平直的欧氏记账结构（一张坐标纸），它不携带任何物理；
- 真正的物理量是每一点上的局域度量单位，记其对数为 σ （稍后将看到它是矢量而非标量）；
- 长度不是原始概念，而是“沿路径累加局域单位”的结果，于是在各向同性情形下 $g = e^{2\sigma} \delta$ （第 16 节证明这个特例太强）；
- 能量标度是长度标度的倒数： $\varepsilon \cdot s = 1$ ， $s = e^\sigma$ 。

在这个设定下，“不同点的能动量不同”直接表现为“不同点的标度不同”，而标度的空间不均匀性就是曲率。第 15 节把这句话变成一条精确的恒等式。

但那条恒等式不是本理论的核心，它是各向同性扇区的结果。开发过程中最重要的一步发生在别处：标度必须是方向性的（标量版本被证明太强，它禁止 Schwarzschild），而一旦标度有方向，标度与转动的耦合就被词义强制了——缩放是对称算子、转动是反称算子，而两个对称算子的括号必然反称。沿两个方向各缩放一次，两种次序必然相差一次转动。这一步（第 9 节）是全部下游结果的铰链：它给出实秩一、从而 Lorentz 代数族、从而 $n = k + 1$ ，也给出量子引力修正的全部内容。

理论的分叉点在第 13 节：标度花样各向同性时，序参量、荷、多重态、转动一个都没有；各向异性时它们一并出现。而花样是否各向同性是标度相关的事实。

全部论证在 Lean 4 中完成。之所以坚持零 sorry，是因为一个公理体系一旦在地基处留下未证之处，其上层的一切“回归”都失去意义。而之所以坚持记录撤回（第 51 节），是因为一个没有撤回记录的开发，是一个没有被审计的开发。

2 物理图像：这个世界看起来是什么样

在写下任何代数之前，先把图像说清楚。代数本身不是理论——一个只有交换子和 Cartan 分解的陈述，抽象程度并不低于它试图取代的东西。以下十条是这套公理所描述的世界，用可以想象的语言。

2.1 没有空间，只有一个比值

每一“处”有一个数，而这个数是比值：局域度量单位对某个基准的比。基准的选择不可观测 (A5)，所以只有差有意义。

把宇宙想成一张处处标着“这里的一米有多长”的图，而图上没有画格子。格子是从那些数字之间的不一致里长出来的，不是先有格子再往里填数。

2.2 “两个地方”不是原语，而是被构造出来的

如果两处的标度花样平行，就没有任何观测量能把它们分开——不是“看起来一样的两个地方”，而是根本没有第二个地方。

完全均匀的区域没有内部结构，连广延都没有。距离是“非平行度”累积出来的量。而楔积是反称的，所以这个理论里的分离是一个有向面积，不是一个长度（第 49 节）。

2.3 标度是有方向的，因为能动量是张量

每一处的标度不是一个数，是一个矢量。理由很物理：流动的流体沿流向与横向携带的能量密度不同，张量源不可能只设定一个标量标度。第 16 节证明标量版本禁止 Schwarzschild——它太强，不是太弱。

2.4 引力是尺子在变，不是空间在弯

矢量的量值随位置变化，就是引力。曲率恰是标度的二阶非均匀性。

没有任何东西被掰弯。光走“直线”，但你用来判断“直”的尺子在沿途改变，于是轨迹看起来是弯的。潮汐力是尺子的二阶变化——一阶（整体变大变小）不可观测，因为那正是 A5 说的基准平移。

2.5 转动是方向在变——而且它由缩放生成

矢量的方向随位置变化，就是转动。而这里有本理论最硬的一步：

沿两个不同方向各做一次缩放，两种次序的结果必然相差一次转动。

这不是选来的耦合，是词义强制的：缩放是纯拉伸故对称，转动不改变长度故反称，而两个对称算子的括号必然反称。物理上这就是 Thomas–Wigner 转动，而 Terrell–Penrose 效应是它的视觉形式——高速物体被看成转动而非收缩，因为标度改变正在被读作转动。

一个方向：平直。两个或更多：曲率，而且是被缩放自己生成的。

2.6 $\hbar$ 是标度轴上的一个步长

不是一个神秘常数。沿标度轴平移一步，与“在哪里”这件事不对易，而失配的大小就是 $\hbar$ （第 35 节，精确非交换，非一阶近似）。

不确定性不是“测量扰动”，是“标度锐利”与“内容丰富”互相排斥：完全锐利的标度是一个点，而标度轴上的一个点不携带任何内容。要分辨 N 个结构，至少得花 N/ρ 宽的窗口。

2.7 “存在什么”是一个截面，不是世界的属性

换一个分辨率，你不是对同一批粒子知道得更多，而是在看另外一批。所以“基本粒子清单”这个问题是不良定的——第 34 节证明任何标度之上都还有未分辨的内容，没有最后一层。

而标准模型标签之多，度量的是它覆盖的对数范围，不是物理的深度：用一套形式覆盖三十个 e-fold，就必须为其中任何地方出现过的东西备好标签，而绝大多数在任一给定标度上并未实现——这正是壳外内容与规范冗余的形状。

2.8 粒子是标度矢量场里梳不开的结

不是场的激发，是**位形**：矢量绕着某处转而无法被梳平。

- 它的**整数荷**是矢量绕球面的圈数；
- 它的**质量**不是它“带着”的属性，而是它在**标度轴上出现的位置**；
- 它的**转动标签**是 $v \wedge \nabla v$ ——所以**带荷必然带转动**，框架禁止“带电而无自旋的基本粒子”（观测上从未见过；带电 π 是复合的）。

共振峰就是阈值：标度轴上内容改变的那个位置，而峰宽是那个位置有多模糊。

2.9 宇宙不在膨胀，是标度在跑

星系并没有在往外飞。是**尺子在缩**，而由 A3 能量标度是长度标度的倒数，所以能量标度在耗散——这就是 A6。

没有**第一时刻**，因为没有**零标度**。标度是一个单位，永不为零。所以“宇宙年龄”这个量不存在，存在的是**流逝的比值**——有限、可测，但没有起点。问“大爆炸初值是多少”，等于问一个绝对标度，而 A5 说那不可表达。

2.10 黑洞任意黑，但不全黑

视界是 $g_{tt} = 0$ 之处，而 $g_{tt} = -s_t^2$ ， s_t 是单位——**永不为零**。

没有奇点、没有视界、没有无穷红移，三者出自同一个事实：**比值可逆**。黑洞是标度比值极端但有限的区域。外部几何原封未动，所以阴影、ISCO、铃宕全部与广义相对论一致；差别在于**没有任何东西被因果隔断，也没有信息被销毁**。

2.11 把十条串起来

一个数（比值）→ 一个矢量（因为源是张量）→ 量值变化给出引力、方向变化给出转动 → 两者的耦合被词义强制 → 耦合的对易子给出 $\hbar$ 与量子修正 → 矢量梳不开的地方是粒子 → 矢量整体在跑就是宇宙学。

全部物理是同一个矢量场的不同读数。“统一”在这里不是把几种力塞进一个群，而是它们本来就是一件事的不同侧面。

注 2.1 (这张图像的代价)。它买不到的东西必须同样明说：没有耦合常数、没有质量数值、没有代结构、没有散射振幅。**这张图像说的是“是什么”，不是“多少”**——定量的部分只在引力扇区闭合（第四部分），而粒子扇区给出的是标签结构与界，不是数值。

Part I

第一部分 公理

3 基底与公理

3.1 微分基底

为使一切陈述有限、可机器检验，我们不使用解析意义上的光滑函数空间，而使用它的代数影子。

定义 3.1 (标度代数). 一个 n 维标度代数是一个交换环 A ，配备 n 个两两交换的导子 $\partial_0, \dots, \partial_{n-1} : A \rightarrow A$ ，满足

$$\partial_i(a + b) = \partial_i a + \partial_i b, \quad \partial_i(ab) = (\partial_i a)b + a(\partial_i b), \quad \partial_i \partial_j a = \partial_j \partial_i a.$$

Lean 出处: `SCD.ScaleAlgebra`

由 Leibniz 律立刻得到 $\partial_i 1 = 0$ 、 $\partial_i 0 = 0$ ，因而所有整数常量被导子零化 (`d_one`、`d_zero`、`d_natCast`)。Kronecker 记号 δ_{ij} 取值于 A ，是纯记账量，满足 $\partial_k \delta_{ij} = 0$ 。

注 3.2. 选择代数化而非解析化，使得后文所有曲率恒等式成为纯代数恒等式，对任意交换环成立。这既消除了对分析条件的依赖，也使机器验证不留缝隙。

3.2 七条公理

公理 A1 (基底). 世界的基底是一个环 A ，配备 n 个满足 Leibniz 律且两两交换的导子 ∂_i ，连同平直的 Kronecker 记账 δ 。基底本身不携带物理。

A **不要求交换**。交换性是经典扇区的性质，不是基底的公理；第 35 节证明上述微分结构在任意（含非交换）环中由对易子自动实现，而量子力学正是非交换扇区。第 15 节起的几何推导在交换扇区中进行，这是一个物理限制（引力是经典的），而非数学便利。

公理 A2 (标度场). 存在一个无量纲标量 $\sigma \in A$ （对数标度），及其乘法代表元 $s \in A^\times$ ($s = e^\sigma$)，满足指数场的定义性微分方程

$$\partial_i s = s \partial_i \sigma.$$

s 取值于单位群，故处处非零。

Lean 出处: `SCD.ScaleField`

公理 A3 (标度—能动量对偶). 局域能量标度是局域长度标度的倒数：

$$\varepsilon \cdot s = 1, \quad \varepsilon := s^{-1}.$$

在自然单位 $\hbar = c = 1$ 下这不是建模选择，而是能量的定义本身。

Lean 出处: `ScaleField.en`, `ScaleField.en_mul_scale`

公理 A4 (测量, 方向性) . 局域度量单位是每个方向一个标度 $s_a \in A^\times$. 被测线元为

$$g_{ab} = \eta_a s_a^2 \delta_{ab}.$$

标度必须有方向, 因为能动量是张量: 流动的流体沿流向与横向携带的能量密度不同, 张量源不可能设定一个标量标度。

各向同性特例 (所有 s_a 相等) 给出 $g = e^{2\sigma} \delta$, 这是本报告早期版本所用的公理; 第 16 节证明它太强 (它禁止 Schwarzschild), 并证明它恰是本公理的一个子轨迹, 故一切在其上证明的结果不失。

Lean 出处: `Frame.DirScale, Unify.toMetric_of_isotropic`

公理 A5 (基准协变性) . σ 只在相差一个全局常数的意义下有定义: 基准单位的选择不可观测。形式上, 对任意满足 $\partial_i c = 0$ 的 c , 替换 $\sigma \mapsto \sigma + c$ 是理论的对称性。

Lean 出处: `geometry.fiducial_invariant`

公理 A6 (开放性) . 宇宙不是封闭系统: 其总能量标度单调耗散。

Lean 出处: `Cosmology.dissipation_solution`

公理 A7 (可观测性) . 耦合生成的每一个结构, 都携带公理所提供的标签: $\Lambda^2 \mathfrak{p}$ 与 A4 所标记的 $\mathfrak{p}$ 同维。

Lean 出处: `Postulates.Observability, Locus.Observability`

A7 是晚期扶正的, 而这是降级不是升级。它曾以“判断”之名被携带数版; 第 11 节证明这种形状的条件不止一条且答案不同, 故它是一个关于什么算可观测的选择, 不是算术。给定 A7, $k = 3$ 是定理, $n = 4$ 随之。任何人可以拒绝 A7 并得到别的 k 。

A5 正是“完全无量纲化”的精确含义, 我们将在定理 15.7 中证明它对全部几何量严格成立。而 A5 的承重远超其外观: 它同时强制耗散速率恒定 (第 48 节), 故 DESI 的张力是与 A5 的张力, 不是与某个拟合参数的张力。

Part II

第二部分 公理逼出什么

4 地基重建：拆分不是一个选择

自我审查（第 51 节）指出 A1 白送了太多东西：一组方向、一个维数 n 、以及一个随后在干实活的平直度规 δ 。更糟的是有两处本该被导出的结论被假设了：输运可拆为“标度部分”与“转动部分”；且标度部分是可交换、可积的，而转动部分承载全部曲率。

本节把这两处假设去掉。方法是问：在没有坐标纸垫底的情况下，一次标度比较究竟是什么？

把一切剥掉，剩下的是：局域单位的比较可以复合、复合有结合律、每次比较都可撤销。那就是一个群 Γ ——再多的东西没有，再少又不够。

于是整个拆分由一个观察落地。**标度是一种相乘的量**。先按 a 比再按 b 比，必须与先 b 后 a 给出相同的标度，因为标度是比值而比值可交换。所以一次比较所携带的标度，恰是它在 Γ 的最大交换商——即交换化——中的像。

定理 4.1 (对易子的标度恒为平凡). $\text{scale}(aba^{-1}b^{-1}) = 1$ ，且反之标度为 1 者恰是对易子子群的元素。故“标度部分”与“转动部分”的拆分不是一个选择：转动恰是标度看不见的那部分，而这是被定义逼出来的，不是被假设的。

Lean 出处: `Foundation.scale_commutator`, `Foundation.scale_eq_one_of_mem_commutator`, `Foundation.mem_commutator_of_scale_eq_one`, `Foundation.scale_comm`

这里没有选择：交换化是唯一的泛性交换商。

定理 4.2 (对易子不携带标度). $\text{scale}(ghg^{-1}h^{-1}) = 1$ ，无条件成立。**不可交换性对标度是隐形的**。

Lean 出处: `Foundation.scale_commutator`

定理 4.3 (曲率必然对标度隐形). 由第 8 节，曲率就是两次输运的对易子；与定理 4.2 合起来，曲率的标度必然平凡。

第 8 节的定理 8.4 只在假设了拆分之后才证明这一点。这里拆分不是假设——它是交换化——结论被逼出来。

Lean 出处: `Foundation.curvature_is_scale_invisible`

定理 4.4 (拆分是一个划分，不是一种分解方式). 两次比较携带相同标度，当且仅当它们相差一个纯转动（对易子子群中的元素）。故“标度部分”与“转动部分”不是按某种约定挑出的两个分量，而是一个典范商的两侧。

Lean 出处: `Foundation.scale_eq_iff_differ_by_rotation`

物理读法正是本纲领一直想要、此前却无法辩护的那一句：引力恰好住在标度看不见的地方。

5 时间就是标度正在跑的那个方向

审查把 Lorentz 号差列为无解释的输入。把它当作输入本身就是惯性——在度规为原始量的理论里它才是输入，而这里度规不是原始量。

换个问法：在一个内容只有标度的世界里，什么可能挑出一个方向？候选只有一个。A6 说宇宙耗散：标度在漂移。而漂移有方向。

时间是标度确实在变的那个方向；空间是标度不变的那些方向。

定理 5.1 (号差形状 $1 + (n - 1)$)。非零漂移的值域是一维的，故由秩一零化度定理其核的余维恰为一。恰好一个方向被挑出，其余全部不被挑出——这正是 Lorentz 形状，由耗散得到而非公设。

Lean 出处: `Signature.codim_ker_eq_one`

定理 5.2 (没有耗散就没有时间)。若标度不漂移，则每个方向都是空间的：没有任何方向被挑出，也就根本没有时间方向。时间不是理论被赠予的一个维度——它就是宇宙开放这件事。

Lean 出 处: `Signature.no_time_of_no_drift`, `Signature.spatial_eq_top_of_no_drift`, `Signature.spatial_ne_top_of_drift`

定理 5.3 (时空拆分与基准无关)。把漂移整体重标（这是基准的改变，由 A5 不可观测）不改变空间子空间。故时空的划分是基准无关的，正如任何物理陈述都必须如此。

Lean 出处: `Signature.spatial_smul`, `Signature.drift_direction_unique`

号差因此不是钦定的 $(-, +, +, +)$ 。它是 $1 + (n - 1)$ ，因为漂移是一个线性泛函；而它之所以存在，只是因为宇宙是开放的。A5 与 A6 联手做了原先由公设 η 做的事。

注 5.4 (仍未导出)。维数 n 本身，以及使那个被挑出的方向为类时（而非仅仅“被挑出”）的符号约定，仍是输入。

6 记账度规也不是公设

审查的第一条最要命：A1 宣称 Kronecker δ “不携带物理”，然后 `Conformal.lean` 用它升降指标、定义给出 Ricci 的缩并。一个平直度规被白送进来，随后在干实活。

第 4 节已说明拆分不是选择。把同一个问题对 δ 问一遍：比较代数上有没有什么典范的东西可以充当记账形式？

有，而且它需要的比度规少得多。设代数带一个迹——一个满足 $\tau(xy) = \tau(yx)$ 的线性泛函。这比内积弱得多：无正定性、无非退化性、无基的选择；它在任何矩阵代数上都是典范的，而且这就够了。

定理 6.1 (记账形式由迹给出且对称)。 $\kappa(x, y) := \tau(xy)$ 仅凭迹性质即为对称。

Lean 出处: `Invariant.Trace.form_symm`

定理 6.2 (不变性—— δ 真正在提供的那条性质)。

$$\kappa([z, x], y) + \kappa(x, [z, y]) = 0.$$

那些其对易子就是曲率的输运（第 8 节）保持这个形式。这正是被公设的平直度规在 `Conformal.lean` 中所扮演的角色，而在这里它是关于任意迹的一条定理。

Lean 出处: `Invariant.Trace.form_invariant`, `Invariant.Trace.form_ad_skew`

三个各自独立的输入——一组方向、一个平直度规 δ 、一个号差 η ——现在压缩成一个：一个带迹的比较代数。号差出自耗散（第 5 节），拆分出自交换化（第 4 节），形式出自迹（本节）。

注 6.3 (压缩不是推导). 维数仍然是那个代数的维数，仍是输入。本节不假装相反。

7 方向不是给定的：方向就是代数

最后一个未解决的地基输入是维数 n ，以及 A1 附赠的指标集 $\text{Fin } n$ 。本节把指标集去掉。而在过程中发现，A1 夹带的还不止一个维数。

看 A1 到底说了什么：有 n 个导子 $\partial_0, \dots, \partial_{n-1}$ ，它们两两交换。这里被假设的是两件事，不是一件。指标集是显眼的那件，另一件是交换性。

更正（见第 14 节）。我原先把那个交换性读作一个隐藏的平直性假设——“相互交换的方向就是平直的坐标方向”。那个解读是错的，在此撤回。相互交换的坐标方向只是选了一张图，局部永远可选，与曲率无关；定理 14.1 把导子全部杀死——它们能有的最强交换性——曲率原封不动。下面的定理 7.4 本身成立（它带着平直前提），但从它得出的那个解读不成立。A1 假设的是一张图和一个指标集，这是真实的输入，但比我当时宣称的要小。

把指标集丢掉。方向不是标签，而是比较代数的元素，输运对它是线性的。于是：

定理 7.1 (曲率即输运不尊重括号的程度)。

$$F(x, y) = [D_x, D_y] - D_{[x, y]}.$$

没有任何外部的东西参与定义——无指标集、无度规、无号差。（对比第 8 节的 F ，那里需要一个联络——形式和一个平直 δ 来升降指标。）

Lean 出处：Direction.DirTransport.curv, curv_antisymm

定理 7.2 (平直 $\iff$ 输运是 Lie 映射). 输运无曲率，当且仅当它把方向的括号送到输运的对易子。曲率是这件事的唯一障碍。

Lean 出处：Direction.DirTransport.flat_iff_lie_hom

定理 7.3 (旧理论是交换情形). 当方向代数交换时，曲率退化为纯对易子 $[D_x, D_y]$ ——即第 8 节所计算的对象。

Lean 出处：Direction.DirTransport.curv_of_abelian

定理 7.4 (交换性与括号的关系). 对平直输运，“诸方向相互交换”（A1 的要求）等价于“括号平凡地作用”。

注意前提：这是关于平直输运的陈述，不是“相互交换的方向必平直”的推导。见第 14 节的更正。

Lean 出处：Direction.DirTransport commute_iff_bracket_acts_trivially

于是 n 不再被手工挑选。选基是便利而非公理 (transport_determined_by_generators)。

更正（见第 11 节）。我曾写“方向就是代数，其个数就是代数的维数”。代数被定名之后这句话可以核验，而它是假的： $\dim \mathfrak{so}(3, 1) = 6$ ，而时空有 4 个方向。方向是代数所作用的空间——它的定义表示——不是代数本身。但什么也没丢： $\mathfrak{so}(k, 1)$ 带有一个典范的 $k + 1$

维表示，故定名代数仍然定住了 n ，即 $k + 1$ 。

注 7.5 (诚实的界限). 本节导出的是“方向是代数元素”以及“其个数是代数的维数”。它没有导出是哪个代数，因而不预言 $n = 4$ 。输入从“ n 个交换标签 + 平直度规 + 号差”变成“一个代数”；这是压缩，不是维数的推导。

8 曲率就是对易子

8.1 避开一次惯性

补各向异性曲率的“显然”办法，是写下 Cartan 结构方程然后硬算。那等于把广义相对论的整套机器原样搬过来——正是最该避开的路径依赖。有一条更本原的路，而且它把引力认成了本报告早已造好的东西。

问：输运局域单位究竟是什么？沿方向 i 移动，就是把一切改用邻近的单位表述，那是一个算子 D_i 。先 i 后 j 未必等于先 j 后 i 。这个差额就是曲率的全部：

$$F_{ij} = [D_i, D_j].$$

这与 Quantum.ad 是同一个构造。那里的输运是相空间平移，它们的不对易就是 $\hbar$ ；这里的输运是标架输运，它们的不对易就是引力。

曲率与 $\hbar$ 是同一个构造在两族输运上的取值。这比“两个理论之间存在类比”强得多——它们是一件事。

8.2 Yang–Mills 曲率不是被假设的，是被算出来的

定理 8.1 (曲率即输运的对易子). 以 $D_i m = \partial_i m + [A_i, m]$ 为协变输运，则

$$[D_i, D_j] m = [F_{ij}, m], \quad F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j].$$

两件事同时发生：其一，Yang–Mills 曲率不是被写下的，而是左边算出来的结果；其二，结果对 m 是代数作用—— m 的导数全部消失——这正是“曲率是张量”的精确含义。

Lean 出处：Connection.comm_covD

定理 8.2 (Bianchi 恒等式). $\sum_{\text{cyc}} D_i F_{jk} = 0$ 。它由 ad 的 Jacobi 恒等式（定理 35.3）与混合偏导可交换直接给出。引力场的守恒律就是输运的结合律，别无其他内容。

Lean 出处：Connection.bianchi

8.3 究竟是哪一部分在弯曲

定理 8.3 (梯度联络是平的). 若联络是标量的梯度且自对易，其曲率恒为零。这是定理 15.6 在非交换情形下的重述：输运的标度部分是可积的，故无论几何多弯，第二时钟效应都不存在。

Lean 出处：Connection.curv_gradient_eq_zero

定理 8.4 (全部曲率都住在不对易的部分). 把输运拆为标度部分（由 A5 是梯度，故对易、可积）加标架转动部分：

$$F(\partial\sigma + \omega)_{ij} = F(\omega)_{ij}.$$

标度部分对曲率的贡献恰好为零。

Lean 出处：Connection.curv_eq_rotation_part, curv_split, curv_pure_scale_eq_zero

于是引力不是“标度场把空间掰弯了”。引力是**标架转动的不对易**，而标度本身可积地输运。这既解释了可积 Weyl 几何为何能承载引力却不产生第二时钟效应，也正是标量公理 A4 表达不了的那个各向异性曲率——而且全程没有出现一个 Christoffel 记号。

推论：纯标量输运的曲率恒为零，这就是旧公理禁止 Schwarzschild 的结构原因，与定理 16.1 从度量一侧给出的结论一致。

注 8.5 (仍未闭合的一环). 本节给出的是给定联络的曲率。由标架定出联络 (Cartan 第一结构方程，即无挠条件 $de^a + \omega^a_b \wedge e^b = 0$) 尚未形式化。因此各向异性扇区现在有了曲率机器与拆分定理，但还没有“从 s_a 算到 F ”的完整链条，光线偏折与近日点进动仍未导出。缺口比上一版窄，但没有消失。

9 耦合一直都在：两次缩放生成一次转动

第 55 节把框架的弱点诊断为“标度路与转动路按构造独立”，并断言进展需要一个公理不提供的通路间耦合。

那个诊断是通过分析 `Foundation.scale` 得到的，而它把标度取为交换化，理由是“标度是比值，比值可交换”。那个理由说的是**标量标度**。A4 给的不是标量标度，是每方向一个标度。而沿不同方向的缩放并不对易。

这是同一个替换错误第三次出现——在公理是方向性的地方用标量推理——前两次是第 16 节 (几何) 与第 30 节 (缺陷)。这次它在地基上，而改正它恰好供出了那个被说成缺失的耦合。

9.1 耦合由词义强制

缩放是纯拉伸：它改变沿其轴的长度而不转动任何东西，故作为算子是对称的。转动不改变任何长度，故是反对称的。于是：

定理 9.1 (两次缩放的括号是转动). 若 S, T 对称，则 $[S, T]$ 反对称。即：沿一个方向缩放后再沿另一个方向缩放，与反序执行的结果相差一次转动。没有任何东西是被选的；生成元的对称性就逼出了它。

Lean 出处: `Coupling.bracket_scaling_scaling`

定理 9.2 (完整结构). $[S, S] \subseteq A$ 、 $[A, S] \subseteq S$ 、 $[A, A] \subseteq A$ 。标度扇区不是子代数，而它不闭合的那部分恰好落在转动扇区。

Lean 出 处: `Coupling.bracket_rotation_scaling`, `bracket_rotation_rotation`, `coupling_structure`

定理 9.3 (具体地，在三维中). 0-1 面与 0-2 面上的两个方向性缩放，其括号恰好是 1-2 面上的转动: $[K_1, K_2] = J$ ，逐分量算出，不诉诸任何群论。故这两个缩放**不对易**——标度扇区一旦具有方向性就不再交换。

Lean 出处: `Coupling.boost_bracket_eq_rotation`, `scalings_do_not_commute`

9.2 一个方向什么也生成不了

定理 9.4 (单方向 $\Rightarrow$ 平直). 单个缩放与自身的括号为零，故不生成转动。

Lean 出处: `Coupling.bracket_self`, `no_rotation_of_commuting`

这与已证的一切自洽：定理 8.4 说纯标度联络是平的；而单个缩放方向正是没有括号可用、因而不生成转动的情形。定理 16.1 是同一事实的度量侧表述。

一个方向：平直。两个或更多：曲率，而且是被缩放自己生成的。

9.3 这改变了什么

1. `Foundation.scale` 作为交换化，描述的只是标量情形。方向性标度下，缩放不构成交换商——它们生成转动。
2. 定理 55.3（两路独立）因此是关于标量扇区的陈述，不是关于本框架的。两路是耦合的，而且是最强的耦合：转动扇区被标度扇区生成。
3. 第 56 节找不到跨扇区检验，原因也随之改写：不是“按构造不可能”，而是我当时分析的是退化情形。

注 9.5 (物理上这是什么). 这就是 Thomas–Wigner 转动：两个不同方向的推促复合出一个推促加一次转动。Terrell–Penrose 效应是它的视觉形式——高速运动的物体被看成转动而非收缩，因为标度改变正被读成转动。两者都不是从外面引进来的；它们就是两个对称生成元的括号。

10 到底是哪个代数：公理逼出实秩一

第 7 节把输入从“ n 个交换标签 + 平直度规 + 号差”压到“一个代数”，然后停在那里：它没说哪个代数。这是此后最尖锐的未决项，而下游全在等它——交叉积、 β 函数的结构、量子扇区的任何定量陈述。

结果是：两条早已证过、且当初并非为此而证的定理，合起来把候选压进了一份有限的分类清单。

10.1 分裂是典范的，不是表示的选择

第 9 节把缩放定义为对称算子、转动定义为反称算子。转置是相对某个形式取的，所以这看起来像偷偷塞进了一个度规。它没有：第 6 节已从一个迹导出形式 $\kappa(x, y) = \tau(xy)$ 。

定理 10.1 (两扇区在导出的形式下正交). S 对称、 A 反称 $\Rightarrow \text{tr}(SA) = 0$ ，仅用 $\text{tr}(X^T) = \text{tr } X$ 与 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$ 。故标度 / 转动分解在框架自己拥有的形式下正交——连同定理 9.2 的括号关系，这恰是一个 **Cartan 分解** $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$ 。

Lean 出处：Algebra.scaling_rotation_orthogonal

10.2 公理逼出实秩一

两条分别为别的目的证过的结论：

- 定理 9.4：相互对易的缩放不生成转动。故一族两两对易的缩放，就是一组可以同时指定而不产生曲率的标度方向；这样的极大族即 $\mathfrak{p}$ 的极大交换子代数，其维数按定义就是实秩。
- 定理 5.1：漂移是一个线性泛函。标度只沿一个方向跑，故只有一个标度坐标。

实秩 = 1

这是框架对自己施加的约束，不是为了让什么对上而选的。

定理 10.2 (两个推促的括号是空间转动). $[K_v, K_w]$ 在空间块上是 $v_i w_j - v_j w_i$, 其余分量为零。这就是定理 9.1 在 Lorentz 族上的显式形式, 也就是 Thomas–Wigner 转动。

Lean 出处: Algebra.boost_bracket_spatial

定理 10.3 (两个推促对易 $\iff$ 方向平行). 故不存在二维的相互对易缩放族: 缩放扇区的极大交换子代数是一条直线。实秩一是算出来的, 不是断言的。

Lean 出处: Algebra.boosts_commute_iff_parallel, no_two_dimensional_commuting_family, commuting_boosts_lie_on_a_line

定理 10.4 (两个“秩一”是同一句话). 一族对易缩放所诱导的漂移两两成比例。故第 5 节的“一个漂移泛函”与耦合的“一个对易缩放”, 是 Cartan 分解两侧对同一事实的两次读数。

Lean 出处: Algebra.commuting_drifts_proportional, boost_drift

10.3 这剩下什么

实秩一的实单李代数是完全分类的, 清单很短:

$$\mathfrak{so}(n, 1), \quad \mathfrak{su}(n, 1), \quad \mathfrak{sp}(n, 1), \quad \mathfrak{f}_{4(-20)}.$$

它们的对称空间分别是实、复、四元数、八元数双曲空间。

这条分类是李理论的定理, 不是本报告的推导, 此处未被证明。它是引用, 并已登记进第 51 节的污染表作为外部输入。本报告证明的是筛掉这份清单的那条约束, 以及 $\mathfrak{so}(n, 1)$ 满足它。

四者之中, $\mathfrak{so}(n, 1)$ 是标度为实比值的那一个; 其余三者要求标度带复、四元数或八元数结构, 而 A3 不提供——那里的标度是量值之比, 且第 30 节已发现读数是无向的实数。于是框架指向 Lorentz 族, 而它是从耗散加耦合走到那里的。

10.4 三个等着的项目随之落地

1. **交叉积**。秩一意味着 Iwasawa 分解的交换部分是一维的, 故在交叉积中作用的群是 $\mathbb{R}$ 而非 $\mathbb{R}^k$ 。这正是第 35.5 小节单独一个平移 U 就够用的原因——那本来看起来只是建模上的省事。

Lean 出处: Algebra.commuting_family_one_parameter, boost_add, boost_smul

2. **β 函数**。秩一根系至多有两个正根 $\alpha, 2\alpha$, 故至多两个标度权重。(随分类一并引用。)
3. **双曲几何, 未被塞入**。秩一对称空间就是双曲空间, 其 Lorentz 形式即反德西特, 标度坐标是径向方向, 重整化流沿它跑。这不是放进去的, 这就是秩一本身。

注 10.5 (诚实的界限). 这导出的是族, 不是维数: $n = 4$ 仍未被预言, 这里没有任何东西挑出它。分类是引用来的。而从“一个漂移泛函”到“一维极大交换子代数”这一步是一个物理认定——认定独立的对易缩放就是独立的标度坐标——不是形式推演; 它被明写在外面, 没有藏进任何证明里 (在 Lorentz 模型内部它是定理 10.4)。

11 最后两项输入究竟是什么

剩下两项： $n = 4$ 靠一个判断，标度量值自由。去追它们之间的关系时，翻出了夹在中间、且一直被我混淆的第三件事，故先说它。

11.1 方向是表示，不是代数

第 7 节去掉指标集时宣称：方向就是代数，其个数就是代数的维数。代数定名之后这句话可核实验，而它失败了。

定理 11.1 (代数严格大于方向集). $\dim \mathfrak{so}(3, 1) = 6 > 4 = n$ 。故方向**不是**代数，而是代数所作用的空间——定义表示。

Lean 出处: `Dimension.algebra_bigger_than_directions`

更正不损失什么，反而有所得。 $\mathfrak{so}(k, 1)$ 带一个典范的 $k + 1$ 维定义表示。

故代数一旦定名， n 就不再是一项额外输入——它是 $k + 1$ ，剩下要定的只有 k 。两项输入合并为一项，这是“两个未决项是否相关”这个问题的前半答案。

Lean 出处: `Dimension.rep_dim_determined`

11.2 两条同形的自匹配条件，答案不同

第 40 节用的条件是：耦合生成的转动与 A4 所标记的方向同样多，

$$\dim \Lambda^2 \mathfrak{p} = \dim \mathfrak{p} \iff \frac{k(k-1)}{2} = k \iff k = 3.$$

把方向与代数区分开之后，第二条同形条件浮现出来——要求代数与它作用的对象一样大：

$$\dim \mathfrak{so}(k, 1) = k + 1 \iff \frac{k(k+1)}{2} = k + 1 \iff k = 2.$$

定理 11.2 (两条条件给出不同答案). $k = 3$ 满足前者而不满足后者； $k = 2$ 满足后者而不满足前者。

Lean 出处: `Dimension.rot_matches_scale_iff`, `alg_matches_rep_iff`, `two_matching_conditions_differ`

所以“要求结构与自身匹配”在说清哪个指标集须匹配哪个之前是不良定的。把这一点明说出来是本小节的要点：数值巧合恰恰藏在这种缝隙里。

框架确实能在两者间决断：A4 按方向指派标度，而那些方向是缩放扇区 $\mathfrak{p}$ ；第 29 节使一切可观测标签都是它们之间的花样。故可用的标签是 $\mathfrak{p}$ 的，而需要标签的是耦合生成的 $\Lambda^2 \mathfrak{p}$ 。第二条比较的是代数与其表示，而框架并不要求这两者相等——Lorentz 代数是六维而时空是四维，这不构成任何缺陷。

于是 $k = 3$ 成立， $n = 4$ 随之，而它所依赖的判断现在被尖锐地陈述为：A4 提供的标签必须足以标记耦合生成的转动。这是一条关于可观测性的假设，不是数值偏好。

11.3 自由的量值不是缺陷

标度花样是一个矢量；方向是转动规范，量值未定。这看起来像第二项松动的输入。它不是同一类东西。

定理 11.3 (一切都对花样齐次, 故比值不变). $\text{wedge}(cv, cw) = c^2 \text{wedge}(v, w)$, 故一切转动标签的比值在重标度下不变。

Lean 出处: `Dimension.wedge_smul_both, wedge_ratio_invariant, only_ratios_are_fixed`

而比值正是框架所预言的东西——第 47 节的换算表、第 33 节的离散度、引力那些数——没有一个会动。

量值不是一项缺失的预言：它是预言被表达于其中的单位。一个无量纲理论必须恰好携带一个这样的数，而本框架恰好携带一个——**这是可能的最少**。理论把一切定到一个总体因子，而定不了那个因子，是因为它不可能定——再没有别的东西可以用来表达它。

11.4 两项自由在何处相遇

k 离散、量值连续，故它们不是同一项自由。但它们由一条换算相连，而这正是“ n 应当与标度有关”这个直觉成立的意义。

秩一对称空间在径向坐标下体积按 $e^{(k-1)r}$ 增长，而径向坐标就是标度坐标（第 10 节）。故在该体积中均匀分布的群体，其阈值密度是每单位径向 $k-1$ ，而实测密度是每单位对数能量；两者差一个根的归一化 α ，而那正是自由的量值：

$$\rho \cdot \alpha = k - 1.$$

定理 11.4 (密度-归一化换算). $k=3$ 时 $\rho\alpha=2$ ；代回即返回输入。

Lean 出处: `Dimension.density_normalization_relation, normalization_returns_input`

这是换算，不是预言——一个方程一个未知数，正是第 56 节记录过的陷阱。它确实确立的是：**两项剩余自由并不独立**——定住 k 就把 ρ 的测量变成对归一化的确定，反之亦然。

它还额外依赖“缺陷在对称空间体积中均匀分布”这一条，而本报告没有任何定理提供它。**已登记为假设，未被夹带。**

注 11.5 (输入清单现状). 代数族——已导出（实秩一，加一条引用的分类）； n ——不再独立，代数定名后即 $k+1$ ； $k=3$ ——一条判断，已在上文尖锐陈述；量值——不是同种意义的输入，它是单位，而无量纲理论恰需一个。

12 两难消解，而且更多轴不可得

第 40 节把一个两难称作框架最尖锐的未决问题。那个两难建立在一处误读上，而误读是我的。

定理 40.4 证的是 $\text{wedge } vv = 0$ ——一个矢量与自身的楔积。我把它读成“单轴花样不携带转动”。但单轴指标度只取一个不同的值，不是只有一个方向；而定理讲的是一个矢量，不是一根轴。 $\text{wedge } vv = 0$ 实际说的是：**均匀花样不生成转动**。那是关于恒定性的陈述，不是关于轴数的。

这是“标量代替方向性”的第五次——继第 16、30、9 节与第 14 节撤回的那处解读之后。值得记下的是：这次它挺过了一次形式化和一版论文——定理本身是真的，错的只是它的名字和我的注解。

12.1 转动是花样与其自身变化的楔积

定理 33.1 说标度花样是单个矢量 v 。故在任一处 $v \wedge v = 0$ ，转动标签只能来自花样在不同位置取不同值。

定理 12.1 (转动需要变化，且只需要变化)。非零转动标签强制花样的两个值不平行；反之，值处处平行的花样处处不生成转动。

Lean 出处: `Axes.rotation_needs_variation`, `combable_no_rotation`, `rotation_iff_variation`

角动量在这里是 $v \wedge \nabla v$ ：标度矢量与其自身变化的楔积。它不是一个位形在某点所具有的属性。

而这恰好有利于框架地消解了两难，因为缺陷正是花样并非处处平行的位形——这就是绕数的含义：

定理 12.2 (绕数缺陷必然携带转动)。取两个不平行值的花样有非零转动标签；反之，无转动的位形可梳，故拓扑平凡。

Lean 出处: `Axes.wound_carries_rotation`, `rotationless_is_trivial`

框架禁止带拓扑荷而转动标签为零的缺陷。观测上，从未见过基本的带电自旋零粒子——带电 π 介子是复合的。作为吻合陈述，并附带保留：此处“基本”本身就是标度相关的（第 34 节）。

12.2 更多轴不是不受青睐，而是不可得

要求是：没有充分论证不得排除双轴乃至更多轴。论证如下，而且很短。

“单轴 / 双轴”是张量序参量的词汇——向列相有一个对称张量，其不同本征值的个数就是轴数。本框架的序参量不是张量。实秩一强制标度花样是单个矢量（定理 10.3、33.1），而矢量只有一个量值和一个方向，别无其他。没有第二个本征值可以与第一个不同。

定理 12.3 (任何第二个缩放要么是同一根轴，要么是一次变化)。给定花样 v ，任何另一个缩放 w 要么是 v 的倍数（同一根轴），要么与之有非零楔积——那它就不是第二根轴，而是一次变化，表现为转动。没有第三种可能。故“有几根轴”的答案是一根，且非选择所致。

Lean 出处: `Axes.no_second_axis`, `axis_or_variation`

定理 12.4 (花样的稳定化子是正维数的)。一个非平凡转动生成元湮灭该花样。这正是单轴序参量的标志。

Lean 出处: `Axes.axis_stabilizer_nontrivial`

而这一点让整件事扣上了。连续稳定化子正是使序参量空间有非平凡 π_2 、从而有点缺陷的东西；双轴或完全各向异性的花样有离散稳定化子，而李群模离散子群的 $\pi_2 = 0$ ，故根本没有缺陷，也没有整数荷。

单轴 $\rightarrow$ 连续稳定化子 $\rightarrow$ 点缺陷、整数荷

双轴及以上 $\rightarrow$ 离散稳定化子 $\rightarrow$ 无点缺陷、无 $\mathbb{Z}$

第 33 节的整数荷只在单轴情形存在，而实秩一使单轴成为唯一情形。两件事互相印证，这正是那组标签成立的原因。

($\pi_2(S^n)$ 与“李群模离散子群的 π_2 为零”是标准拓扑，与秩一分类同等地属于引用。此处证明的是代数那一半：花样是单个矢量，且其稳定化子正维数。)

12.3 这在别处的代价

第 14 节把定理注解为“多重态内部平直”。它的 **Realizes** 前提按方向指派缩放算子，而实秩一不提供这个——它提供一个矢量、一个缩放。定理对满足其前提者仍成立，但那条物理解读撤回。取代它的是本节：转动由单一花样的变化携带。

Lean 出处: `Axes.multiplet_flatness_needs_per_direction_scalings`

Part III

第三部分 分叉点

13 A7，以及立场转变所迫的一次审计

两件事在此了结。第一件是一条一直以“判断”之名在干活的公设，此处把它扶正并命名。第二件是一次审计——若不做，一个反驳我便无法回答。

13.1 A7（可观测性），作为公设

第 11 节把最后一项数值输入压到一步：A4 提供的标签必须足以标记耦合生成的转动。它同时表明这种形状的条件不止一条且彼此不合，所以这一步是关于什么算可观测的选择，不是算术。

这是一项哲学承诺，而且没有从其余七条公理推导出它的前景——它就是每个物理理论都必须在某处对“什么算一次观测”所做的那种承诺。故予以扶正：

A7（可观测性）。耦合生成的每一个结构，都携带公理所提供的标签。

定理 13.1 (给定 A7, $k = 3$ 是定理). 且 $n = 4$ 随之，因为定理 11.1 已经使 n 不再是独立输入。而 A7 是一条真实的限制：它在其他任何维数上都不成立，故非平凡。

Lean 出处: `Locus.three_from_observability, observability_fails_elsewhere, observability_iff_three`

这是对一项主张的降级，不是对一项结果的升级：原先被呈现为“几乎已导出”的东西，现在公开地是第七条公理。框架的输入是 A1–A7 加一个单位，这是诚实的记账。

13.2 反驳

本纲领的立场发生过转变：它从试图复现每一个粒子开始，终于第 34 节“物种清单是某一截面的性质”。反驳是：先前那些面向相互作用的结果是在旧立场下写的，可能已与新立场不一致

假如有任何基本相互作用是标度不变的，那就等于承认存在标度不变的粒子及其性质；而且这与“相互作用只在能标下降后才分离”的图像矛盾。

这个反驳在形式上是对的，而审计有一个伤亡和一项实质收获。

存活的部分。开发中每一项面向相互作用的结果，都是关于某个量如何随标度变化的陈述，而非关于某个标度不变的相互作用：第 38 节的跑动、第 39 节的渐近自由与量纲嬗变、第 41 节的动量依赖寿命、暗物质的探测失效。没有一条断言相互作用在标度上是任何固定的东西。

定理 13.2 (没有标度不变的相互作用可供承认). 耦合在标度上恒定，当且仅当其缺陷密度为零——即无物可分辨的退化情形，而不是一种基本力。

Lean 出处: `Locus.no_scale_invariant_interaction, constant_coupling_iff_no_content`

伤亡。第 32、33 节给缺陷指派拓扑标签，而同伦类就是标度不变的。这与第 34 节存在真实张力，也正是该反驳的真正靶心。

13.3 解药一直在文件里

第 30 节：完全简并的标度花样什么也不区分，**完全不支持任何缺陷**。第 29 节：其稳定化子是全部，故无任何多重态可分辨。而下面这条：两个各向同性花样恒平行，故也不生成任何转动。

定理 13.3 (各向同性轨迹上没有任何标签). 各向同性 $\Rightarrow$ 无转动标签、无区分方向；连同上述两条，**各向同性轨迹不携带任何种类的标签**。而非零转动标签**强制**花样各向异性。

Lean 出处: `Locus.isotropic_no_rotation, labels_require_anisotropy, everything_switches_on_together, particle_locus_is_anisotropic`

各向同性花样 $\rightarrow$ 无序参量、无荷、无多重态、无转动：什么也不被区分
各向异性花样 $\rightarrow$ 序参量出现，荷、多重态与曲率随之一并出现
而花样是否各向同性，是一个标度相关的事实。

于是那些拓扑标签**不是**世界的标度不变性质。它们是各向异性轨迹的性质，在各向同性破缺的那个标度上诞生——而且是一并诞生的，因为它们同源。

这就是“相互作用随能标下降而分离”，是导出的而非假设的；而第 34 节没有被违反：某标度上存在什么，仍然取决于该标度。

适用域更正备案。第 32、33 节应被读作描述 各向异性轨迹。定理不变，其定义域现在被写明。第 16 节早已把各向同性情形降格为度规扇区的一个轨迹——同一降格现在也适用于荷，这是我此前没注意到的一处自洽。

14 耦合让标度场做什么

第 9 节给出了耦合。本节问它让理论说什么——关于地基、关于演化、关于谱。三者是同一个问题，故在同一处回答。

14.1 一处更正，以及交换环真正的代价

定理 14.1 (杀死导子并不能压平曲率). 令所有导子为零——方向能有的最强交换性——曲率仍是 $\text{ad}(A_i)(A_j)$ ，完全自由。而第 9 节的两个方向性缩放给出 $\text{ad } K_1 K_2 = J \neq 0$ ，是一个现成的反例。**平直性住在联络对不对易里，不在方向对不对易里。**

Lean 出处: `Dynamics.no_flatness_from_commuting_derivations, nonflat_witness`

于是交换的函数代数并不是对量子非对易性的限制。空间上的函数本就交换，那是经典且正确的；非对易性属于比较算子，而 `Foundation`、`Connection`、`Crossed`、`Quantum`、`Coupling` 全都保持它们非交换。

但交换扇区确实有代价，而这里把它精确定住。

定理 14.2 (交换扇区的输运恒对易). 在交换环上 ad 恒为零，故 $[\nabla_i, \nabla_j] = 0$ ：无论联络是什么，该扇区**完全没有输运意义下的曲率**。

Lean 出处: `Dynamics.commutative_sector_transports_commute, commutative_curvature_undetectable`

这正是第 15 节非公设 δ 不可的原因：它的曲率只能从共形因子进来，进不来输运。**代价就是这个，而且被限制在经典各向同性几何里，不是对量子扇区的限制。**

14.2 演化方程就是 Bianchi，其内容是守恒

定理 14.3 (Bianchi 强制源守恒). 若标度场的曲率正比于一个源——任何场方程的形状——则该源的循环协变散度恒等于零。

Lean 出处: `Dynamics.source_conserved_of_field_equation`

定理 14.4 (尖锐形式: 不守恒的源没有场方程). 若循环散度在某处不为零, 则该源**不可能**是任何联络的曲率之源。本框架不是偏好守恒的源, 而是无法表述不守恒的源。

Lean 出处: `Dynamics.no_field_equation_of_nonconserved`

能动量守恒在本框架中不是额外公设, 而是场方程可被写下的条件。它经由 Bianchi 来自 Jacobi 恒等式——来自输运的结合律, 别无其他。

再加上耦合的贡献: F 反称, 而由定理 9.1 它取值于转动。故标度场的源是一个转动密度。

Lean 出处: `Dynamics.source_antisymm, field_equation_content`

14.3 多重态内部是平的

这里是耦合真正付账的地方。第 29 节说多重态是方向性标度的简并块 ($a \sim b \iff s_a = s_b$); 第 9 节说缩放与自身的括号为零。

定理 14.5 (同一多重态内不生成转动). 同一多重态中的两个方向携带同一单位, 故有同一缩放, 故括号为零。标度的简并块内部是平的; 曲率只在多重态之间生成。

Lean 出处: `Dynamics.same_multiplet_no_rotation`

定理 14.6 (逆命题: 转动是简并破缺的见证). 两方向之间有非零转动, 就证明它们属于**不同**的多重态。

Lean 出处: `Dynamics.rotation_implies_different_multiplet`

在耦合之前, 规范多重态与曲率是标度花样的两个互不相干的读数; 现在前者控制后者。而全简并 (各向同性) 的极端情形给出: 所有括号为零, 处处不生成转动——**最大对称的位形就是平的**。这从规范一侧第三次独立地回收了定理 16.1 与 8.4。

Lean 出处: `Dynamics.larger_multiplet_fewer_generators`

定理 14.7 (多重态只能在阈值处改变). 内部对称性完全由标度的重合花样决定, 故花样不变则多重态不变。**新的多重态不会在两个阈值之间出现**, 与第 34 节的内容变化发生在同一批位置。

Lean 出处: `Dynamics.multiplets_fixed_by_pattern, multiplet_change_needs_pattern_change`

注 14.8 (诚实的界限). 以上都没有预言哪些多重态。它说的是它们可以在何处改变、以及它们内部是平的。标度花样仍然是输入。

Part IV

第四部分 各向同性扇区：几何与引力

先解一个表面矛盾。第三部分说各向同性轨迹上无转动、无荷、无多重态，而本部分整部在各向同性扇区计算曲率。这不矛盾，但必须说清：

“各向同性”指标度矢量的方向处处一致，不是它的量值不变。

方向一致 $\Rightarrow$ 楔积恒为零 $\Rightarrow$ 无转动标签、无荷、无多重态。但量值仍可随位置变化 $\Rightarrow$ 共形因子非常数 $\Rightarrow$ 几何仍然弯曲。这正是第 48 节据以导出暗物质的那一条：只引力，无其他。

所以本部分的定量结果—— $1.7515''$ 、 $42.99''/\text{世纪}$ 、 $\gamma = 1$ ——是纯引力扇区的结果：那里没有标签可算，也不需要。而第 16 节证明把各向同性当公理太强（它禁止 Schwarzschild），故它是一个轨迹，不是世界。

15 几何的涌现：曲率即标度形变

本节全部结果属于各向同性扇区。A4 给的是每方向一个标度；本节所用的 $g = e^{2\sigma}\delta$ 是它的各向同性特例（所有 s_a 相等），第 16 节证明把这个特例当作公理太强——它禁止 Schwarzschild。特例被降格为一个轨迹，故本节的定理不失，但它们的适用域是那个轨迹。

15.1 Levi-Civita 数据

在各向同性轨迹上，度量 $g = e^{2\sigma}\delta$ 的 Christoffel 记号为

$$\Gamma_{bc}^a = \delta_{ab} \sigma_c + \delta_{ac} \sigma_b - \delta_{bc} \sigma_a, \quad \sigma_i := \partial_i \sigma. \quad (1)$$

Lean 出处：SCD.Chr

值得注意：共形因子 $e^{2\sigma}$ 完全消失。联络只看得见标度的变化，看不见标度本身——这已经预示了 A5。

定义 15.1 (标度形变张量)。

$$D_{ij} := 2\sigma_{ij} - 2\sigma_i \sigma_j + \delta_{ij} |\nabla \sigma|^2, \quad (2)$$

其中 $\sigma_{ij} = \partial_i \partial_j \sigma$ ， $|\nabla \sigma|^2 = \sum_k \sigma_k \sigma_k$ 。它度量局域单位偏离仿射变化的程度。（因子 2 是为避免除法，使一切陈述在任意交换环上成立。）

Lean 出处：SCD.Defm

15.2 主定理

定理 15.2 (曲率即标度形变)。在任意标度代数中，对任意 $\sigma \in A$ 与任意指标 a, b, c, e ,

$$2R_{bce}^a = \delta_{ae} D_{bc} - \delta_{ac} D_{be} + \delta_{bc} D_{ae} - \delta_{be} D_{ac} \quad (3)$$

即 $g = e^{2\sigma}\delta$ 的完整 Riemann 张量恰是欧氏记账 δ 与标度形变 D 的 Kulkarni–Nomizu 乘积。

Lean 出处：SCD.two_Rm_eq

这是各向同性扇区的核心恒等式（不是全部纲领的核心；那是第 9 节的耦合）。它把“欧氏空间在不同点按不同比例缩放，等价于黎曼几何”从一句口号变成一条恒等式：**几何 = 记账 × 标度形变，没有别的成分**。曲率没有任何独立于标度场的自由度。

证明要点. Riemann 张量的导数部分给出

$$\partial_c \Gamma^a_{be} - \partial_e \Gamma^a_{bc} = \delta_{ae} \sigma_{bc} - \delta_{be} \sigma_{ac} - \delta_{ac} \sigma_{be} + \delta_{bc} \sigma_{ae},$$

其中 δ_{ab} 项因混合偏导可交换而相消 (d_Chrr_diff)。二次部分由一条主收缩恒等式给出：

$$\sum_m \Gamma^a_{cm} \Gamma^m_{be} = 2\delta_{ac} \sigma_b \sigma_e - \delta_{ac} \delta_{be} |\nabla \sigma|^2 + \delta_{ab} \sigma_c \sigma_e + \delta_{ae} \sigma_b \sigma_c - \delta_{bc} \sigma_a \sigma_e - \delta_{ce} \sigma_a \sigma_b$$

(sum_Chrr_Chrr_full; Lean 中通过把九个乘积项整理成可收缩形式，再用 $\sum_a \delta_{ab} f(a) = f(b)$ 逐项化简)。两部分相加， $|\nabla \sigma|^2$ 项恰好成对相消，余下即所断言的形式。全部步骤为环上恒等式，由 ring 封闭。□

15.3 迹与标量曲率

定理 15.3 (Ricci 曲率).

$$R_{be} = -(n-2)(\sigma_{be} - \sigma_b \sigma_e) - \delta_{be}(\Delta \sigma + (n-2)|\nabla \sigma|^2). \quad (4)$$

Lean 出处: SCD.Ric_eq

定理 15.4 (标量曲率).

$$e^{2\sigma} R = -2(n-1) \Delta \sigma - (n-1)(n-2) |\nabla \sigma|^2. \quad (5)$$

Lean 出处: SCD.RscBare_eq

(我们把共形因子显式保留在左侧，从而无需任何可逆性假设。)

推论 15.5 (真空即标度的仿射变化). 若 2 在 A 中可逆 (对任何 $\mathbb{R}$ -代数模型自动成立)，则

$$D_{ij} \equiv 0 \implies R^a_{bce} \equiv 0.$$

即：形变自由的标度场给出完全平直的几何，而非仅仅 Ricci 平坦。

Lean 出处: Rm_eq_zero_of_Defm_eq_zero

真空因此不是“没有标度”，而是“标度均匀地变化”。这与本纲领的直觉一致：标度处处存在，引力只是它的不均匀性。

15.4 可积 Weyl 几何：没有第二时钟效应

Weyl 于 1918 年提出：单位长度可以逐点变化，由一个独立的一形式 A_i 描述。Einstein 的反驳是致命的：若 A 不可积，原子谱线将依赖于世界线历史（“第二时钟效应”），与观测矛盾。

本理论中 A_i 不是独立场，而是全局标量的梯度 $A_i = \partial_i \sigma$ 。

定理 15.6 (标度联络平坦).

$$F_{ij} := \partial_i A_j - \partial_j A_i = 0 \quad \text{恒成立.}$$

Lean 出处: SCD.scaleCurv_eq_zero

证明只用到混合偏导可交换。因此沿任意闭合回路输运单位后单位不变，第二时钟效应按构造不存在。这正是可积 Weyl 几何成功、而 Weyl 原版失败的原因——本纲领所需的恰是前者。

15.5 无量纲性是一条定理

定理 15.7 (基准协变性). 设 $\partial_i c = 0$ 。则对 $\sigma \mapsto \sigma + c$ ，下列量逐一不变：

$$\sigma_i, \quad \sigma_{ij}, \quad \Delta\sigma, \quad |\nabla\sigma|^2, \quad \Gamma^a_{bc}, \quad R^a_{bce}, \quad R_{be}, \quad D_{ij}, \quad e^{2\sigma} R.$$

Lean 出处: `SCD.geometry_fiducial_invariant`

这就是 A5 的精确内容，也是“全部物理量无量纲化”的严格实现：没有任何可观测量依赖于 σ 的零点位置，只有标度差是物理的。

注 15.8 (重整化群的起源). 定理 15.7 说的是几何对基准平移不变。但物质的描述未必不变：为在基准移动时保持预言不变，耦合常数必须相应流动。这一补偿运动就是重整化群（第 37 节）。换言之，RG 不是 QFT 的技术手续，而是 A5 在物质部门的影子。

16 A4 太强：标度必须是方向性的

16.1 诊断

第 15 节的一切都建立在 $g = e^{2\sigma}\delta$ ——一个标量标度，各方向相同。本报告早期版本把这当作 A4 本身。它无法承载 Schwarzschild，而原因是物理的，不是技术的。

本纲领说局域能动量决定局域标度。但**能动量是张量**：流动的流体沿流向与横向携带的能量密度不同。张量源不可能设定一个标量标度。**标度必须有方向**。

这就是第 3 节把 A4 直接写成方向性的理由：局域度量单位是每个方向一个标度 $s_a \in A^\times$ ，被测线元为 $g_{ab} = \eta_a s_a^2 \delta_{ab}$ 。各向同性（所有 s_a 相同）是它的特例。

16.2 旧公理不是没能给出 Schwarzschild，而是禁止了它

Schwarzschild（及 Reissner–Nordström）族的定义性关系是 $g_{tt}g_{rr} = -1$ 。在标度语言中它读作

$$s_t \cdot s_r = 1.$$

时间标度与径向标度互为倒数：钟被压缩的因子，恰好等于径向尺子被拉长的因子。这是一句关于标度的陈述，标量理论连表述它的能力都没有。

定理 16.1 (各向同性 + 倒数关系 $\Rightarrow$ 平直). 若所有方向共用一个标度，且 $s_t s_r = 1$ ，则 $s_t^2 = 1$ ，于是每个度量分量都等于裸记账值：几何是平直的。

Lean 出处: `Frame.DirScale.isotropic_reciprocal_forces_flat, isotropic_reciprocal_metric_bare`

这就是诊断的精确形式： $g = e^{2\sigma}\delta$ **并非未能产生 Schwarzschild，而是排除了它**。公理确实太强。

定理 16.2 (方向性 A4 下该关系有非平凡解). 对任意满足 $u^2 \neq 1$ 的单位 u , 存在方向性标度场使 $s_t = u$ 、 $s_r = u^{-1}$, 倒数关系成立且非各向同性。

Lean 出处: `Frame.exists_reciprocal_nonisotropic`

16.3 一套公理，而不是两套

若把方向性 A4 与旧的标量 A4 并列，体系就同时挂着两条互斥的公理——`Conformal.lean` 等文件用标量 σ ，而 `Frame.lean` 说标度有方向。这必须消除，消除的办法是**降格旧公理**：方向性 A4 是公理，标量形式是关于其各向同性轨迹的定理。

定理 16.3 (旧公理是新公理的各向同性轨迹). 若所有方向共用一个标度 s ，则方向性 A4 的度量恰好等于共形度量 $\eta_a s^2 \delta_{ab}$ ——无近似、无附加假设。

Lean 出处: `Unify.toMetric_of_isotropic`

定理 16.4 (各向同性轨迹恰是标量理论的像). 一个方向性标度场是各向同性的，当且仅当它形如 `ofScalar(u)`。故旧公理不只是被新公理蕴含，而是新公理限制在一个子轨迹上的全部内容，没有剩余。

Lean 出处: `Unify.isotropic_iff_ofScalar`, `Unify.sector_coherence`

于是此前一切关于 σ 的定理原封不动保留，只是获得了明确的适用域：它们是关于各向同性扇区的陈述。公理表由两条变回一条。

注 16.5 (相容但尚不完备). 本报告未完成各向异性扇区的曲率计算（Cartan 结构方程、Schwarzschild 曲率张量的逐分量验证、光线偏折与近日点进动）。公理体系现在是**相容**的；它还不**完备**——方向性 A4 的几何推论目前只在标度恰为各向同性处被算出。这是当前最优先的下一步。

17 引力与规范场是同一个东西

从标架定出联络，是否需要无挠条件？**这样问本身就是惯性**。“挠率”来自一个把标架与联络当作独立场的理论，所以才需要一个条件把二者拴住。在这里它们并不独立，也就没有什么可强加的。

从 x 到 y 的输运只有一件事要做：把 x 处每个局域单位送到 y 处对应的单位。两端的标度花样就是全部，于是输运就是“使单位对上”的那个重标号。**没有做出任何选择，因而不需要任何条件来消除选择。**

定理 17.1 (非简并 $\Rightarrow$ 输运唯一). 若目标处各局域单位互不相同，则输运**唯一**。没有无挠条件、没有度规相容性公设、没有变分原理：联络是标度场的一个函数，它从来就不是一个待约束的独立场。

Lean 出处: `Transport.transport_unique_of_nondegenerate`

定理 17.2 (简并 $\Rightarrow$ 自由度恰是内禀对称性). 两个输运同一花样的重标号相差一个 `stabilizer` 元素，且仅此而已；反之乘上任一稳定子元素仍是输运。故输运集合恰是稳定子的一个陪集。

Lean 出处: `Transport.transport_coset`, `Transport.transports_of_stabilizer`

定理 17.3 (唯一性 $\iff$ 无规范自由). 输运唯一，当且仅当稳定子平凡。

Lean 出处: `Transport.transport_unique_iff_stabilizer_trivial`, `Transport.nondegenerate_no_gauge_freedom`

输运是一个对象；标度花样的简并把它劈成“被定死的部分”与“自由的部分”。被定死的部分逐点变化并弯曲——那是引力；自由的部分是块内转动——那是规范场。它们不是两个有待统一的场，而是一个场，被“局域单位是否恰好重合”这一件事分开。

18 引力红移与 Newton 极限

18.1 引力红移

定理 18.1 (红移). 对 A_2 、 A_3 的标度场,

$$\partial_i \varepsilon = -\varepsilon \partial_i \sigma.$$

Lean 出处: `SCD.ScaleField.d_en`

证明只是对 $\varepsilon s = 1$ 求导。物理读法：标度升高处能量标度降低。一个固定激发从标度大的区域向外传播时能量下降——引力红移是定理，不是附加假设。

18.2 标度响应律

要得到引力，还需要一句话说明什么在源生标度：

A6' (标度响应) 不是本体系的公理。公理只有 A_1 – A_7 (第 3 节)。下式是一条外部物理输入，本报告未从更基本的东西导出它，已登记在第 57 节：

$$e^{2\sigma} R = \kappa \rho,$$

其中 ρ 是局域无量纲能量密度； $n = 3$ 时这正是共形平直切片上的 Hamilton 约束。凡依赖它的结论（本节的 Newton 极限）都继承这一输入。

18.3 一阶区域

定理 18.2 (线性化是精确的). 若 $|\nabla \sigma|^2 = 0$, 则

$$e^{2\sigma} R = -2(n-1)\Delta\sigma.$$

Lean 出处: `SCD.RscBare_linear`

定理 18.3 (Poisson 方程). 在一阶区域，令 $\Phi := -\sigma$ (Newton 势就是负的对数标度)，则

$$2(n-1)\Delta\Phi = \kappa\rho.$$

$n = 3$ 时为 $4\Delta\Phi = \kappa\rho$ ；取 $\kappa = 16\pi G$ 即得

$$\Delta\Phi = 4\pi G\rho.$$

Lean 出处: `SCD.poisson`, `SCD.poisson_three`

符号自洽性值得强调： $\sigma = -\Phi$ 意味着引力势阱深处 $\sigma > 0$ ，即标度被拉大、尺子被拉长——这与 Schwarzschild 各向同性坐标下径向固有距离大于坐标距离一致；同时由定理 18.1， $\varepsilon = e^{-\sigma} = e^{\Phi}$ ，正是引力红移因子。两个符号都不是调出来的。

18.4 一阶区域不是“扔掉高阶项”

条件 $|\nabla\sigma|^2 = 0$ 看似是把困难项抹去。我们证明它是精确可实现的：把基底扩张为对偶数环 $A[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ ，并取无穷小标度场 $\sigma = \varepsilon\varphi$ 。

定理 18.4 (一阶区域的实现). 对偶数环上的导子逐分量延拓后仍是标度代数；且对任意 $\varphi \in A$,

$$|\nabla(\varepsilon\varphi)|^2 = 0 \quad \text{恒等成立.}$$

因而定理 18.2、18.3 在其上精确成立，没有任何被丢弃的项。

Lean 出处: `SCD.Dual.ScaleAlgebra, Dual.gradsq_inr, Dual.poisson_exact`

一阶微扰论由此被安置在公理体系内部，而不是从外部强加。

19 使倒数关系得以成立的那次相消

第 21 节由两件事导出 $s_t \cdot s_r = 1$ ：真空使标度和为常数，以及渐近平直性定住那个常数。后者已证；前者被标注为输入——“标准的 Ricci 组合”——它是引力链条上最后一个未证的环节。本节证明其中带内容的那部分。

把度规写成 A4 的方向性形式，只有时间与径向单位随 r 变， $A = e^{2\sigma_t}$ 、 $B = e^{2\sigma_r}$ 。相关的两个 Ricci 分量各自都很乱：二阶导数、二次项、看不出结构。但取那个特定组合 $R_{tt}/A + R_{rr}/B$ ，所有难看的东西全部相消：

定理 19.1 (相消).

$$\frac{R_{tt}}{A} + \frac{R_{rr}}{B} = \frac{1}{rB} \left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B} \right).$$

二阶导数彼此抵消，二次项也彼此抵消——对一切 A, B 精确成立。剩下的是一个全对数导数。

Lean 出处: `Schwarzschild.ricci_combination`

这就是真空何以对 AB 有话可说的原因，也是倒数关系存在的全部理由。

定理 19.2 (真空 $\Rightarrow$ 标度和驻定). $R_{tt} = R_{rr} = 0$ 强制 $A'/A + B'/B = 0$ (因前因子 $1/rB$ 永不为零)，在标度变量下即 $\sigma'_t + \sigma'_r = 0$ ——这恰是第 21 节所需的那条假设。

Lean 出处: `Schwarzschild.vacuum_log_derivative, Schwarzschild.vacuum_iff_scale_sum_stationary`

相消的那个组合恰是按 t - r 块的逆度规加权的组合。所以真空方程限制在该块上只说了一件事：**那里的面元是驻定的**；它对时间标度与径向标度各自如何分布只字未提。这正是“真空中引力只是拿一个换另一个”的精确含义。

Lean 出处: `Schwarzschild.area_element_stationary`

链条现状。 引力扇区现在跑通为：Ricci 分量 (输入) $\rightarrow$ 相消 (本节已证) $\rightarrow$ 标度和为常数 (已证) $\rightarrow$ 渐近平直性 (已证, 第 21 节) $\rightarrow s_t s_r = 1 \rightarrow \gamma = 1$ (已证, 第 23 节) $\rightarrow$ 偏折 $1.7515''$ 与进动 $42.99''$ (已证)。

仍为输入的只剩两个 Ricci 表达式本身，它们来自对角拟设的 Levi-Civita 联络；那一步是机械的，而本节证明的这一步才是有非平平凡事情发生的地方。

20 引力扇区闭合

第 19 节证明了相消，但把两个 Ricci 分量当作给定。本节把它们导出来，引力扇区从此从度规一路跑到实测数字，中间不留假设。

对角度规 $-A(r)dt^2 + B(r)dr^2 + r^2d\Omega^2$ 的联络系数由 Levi-Civita 公式给出，对角情形下每个符号都是一行计算。由它们按 $R_{ab} = \partial_c \Gamma_{ab}^c - \partial_a \Gamma_{cb}^c + \Gamma_{cd}^c \Gamma_{ab}^d - \Gamma_{ad}^c \Gamma_{cb}^d$ 求和：

定理 20.1 (两个 Ricci 分量，已导出). 求和的结果恰好是第 19 节所假设的两个表达式。

Lean 出处: RicciDiag.ricciTT_eq, RicciDiag.ricciRR_eq

引力链条端到端。度规 $\rightarrow$ 联络 $\rightarrow$ Ricci (已证) $\rightarrow$ 相消 (已证) $\rightarrow$ 标度和驻定 (已证) $\rightarrow$ 渐近平直性 (已证) $\rightarrow s_t s_r = 1 \rightarrow \gamma = 1$ (已证) $\rightarrow$ 偏折 $1.7515''$ 与进动 $42.99''$ (已证)。
从度规到那两个数字之间，已无任何一步是假设。

Lean 出处: RicciDiag.gravity_chain

扇区内仍为输入的只剩：标度响应律 $A6'$ ，以及静态球对称拟设的选取。引力波未涉及。

21 倒数关系的那个常数从哪来

第 23 节让倒数条件 $s_t s_r = 1$ 补上了偏折的另一半，但把倒数性本身留成了“被描述的解的性质”。本节关掉这个缺口中能关掉的那半。

真空条件并不直接给出 $s_t s_r = 1$ 。它给出更弱的东西：时间与径向对数标度之和的导数为零，故 $s_t s_r$ 是常数。从“常数”到“一”是另一步，而那一步才有物理内容：它是渐近平直性——远离源处什么也没有，故局域单位必须与基准一致。

定理 21.1 (渐近平直性定住倒数关系). 若 $\sigma_t + \sigma_r$ 导数为零且在远处为零，则它处处为零，即 $s_t \cdot s_r = 1$ 。那个常数不是拟合的：它由公理允许的唯一边界条件定住——由 A5，“远处”恰恰就是基准的意思。

Lean 出处: Vacuum.reciprocity_of_asymptotic_flatness, Vacuum.scale_product_eq_one

定理 21.2 (边界条件在干实活). 去掉边界条件，标度乘积只是某个常数，而任何常数都与真空方程相容。故渐近平直性不是约定。

Lean 出处: Vacuum.product_constant_without_flatness

物理读法：真空中引力只是用时间标度换径向标度，在 t - r 平面里不制造任何标度——该平面的面元恒为一。

Lean 出处: Vacuum.tr_area_element_constant

注 21.3 (结清到什么程度). 已导出：给定“真空使标度和为常数”这一后果，倒数性仅由渐近平直性即可推出，无需任何进一步选择。未导出：真空场方程蕴含该和为常数——那是标准的 Ricci 组合 $R_{tt}/A + R_{rr}/B = 0$ ，此处作为输入；形式化它需要对角拟设的曲率计算，那仍是引力扇区唯一未完成的一块。

22 光线偏折：各向同性扇区恰好只给一半

范围声明里“定量引力效应仍未导出”这句话挂了好几版。本节导出一个，而结果是一次失败——一次尺寸可精确测量的失败，这比一次成功更有用，因为它说清了方向性标度必须补上多

少。

光线偏折是因为它穿过标度不同的区域。在**各向同性扇区**（旧的标量公理，现已知是 A4 的退化轨迹）里，全部效应来自单个标量 $\sigma = -\Phi$ ，掠射偏折为 $\alpha_{\text{iso}} = 2GM/(bc^2)$ ；而实测值是它的两倍 $\alpha_{\text{obs}} = 4GM/(bc^2)$ 。

定理 22.1 (恰好一半). $2\alpha_{\text{iso}} = \alpha_{\text{obs}}$ ，且缺失的那一半恰等于各向同性扇区能给出的那一半。

Lean 出处: Deflection.iso_is_exactly_half, Deflection.missing_half, Deflection.iso_ratio_half

各向同性扇区不是近似地错，而是错了恰好一个因子 2。 缺失的一半是空间标度各向异性的贡献——正是第 16 节证明标量标度根本无法表示的那部分。于是这个因子 2 就是同一件事以数字的形式出现：两半分别是时间标度与空间标度，而只有一个标度的理论永远只能提供其中一半。

22.1 掠日光线的数值

取 $G = 6.674 \times 10^{-11}$ 、 $M_{\odot} = 1.989 \times 10^{30}$ kg、 $b = R_{\odot} = 6.957 \times 10^8$ m、 $c = 2.998 \times 10^8$ m/s:

	预言	实测 (VLBI)
观测支 $4GM/bc^2$	1.7515''	$1.7509 \pm 0.0002''$
各向同性扇区 $2GM/bc^2$	0.8758''	——

Lean 出处: Deflection.solarObs_value, Deflection.solarIso_value, Deflection.solar_ratio, Deflection.iso_fails_by_far

观测支与实测符合到约 0.04%；而各向同性扇区差了 0.87''，是 VLBI 误差的四千倍。这不是建模精度问题，是结构性问题。

本节的地位：这是本报告最尖锐的定量陈述，而它是对标量公理的反驳，不是对任何东西的确认。方向性扇区要给出缺失的一半，仍需完成各向异性曲率的具体计算——那尚未完成。本节确立的是**剩余欠债的精确大小**。

23 把另一半付清

第 22 节把欠债定得很精确：各向同性扇区给出 $2GM/bc^2$ ，实测是 $4GM/bc^2$ ，缺失的一半必须来自空间标度。本节付清它，而付款来自一条已经证过的关系。

掠射偏折对时间与径向两个单位分别依赖，标准参数化把这依赖记进一个数：以 $g_{tt} = -(1 - 2\mu)$ 、 $g_{rr} = 1 + 2\gamma\mu$ 计，

$$\alpha = \frac{2GM}{bc^2} (1 + \gamma).$$

$\gamma = 0$ 是各向同性扇区（只有时间标度）， $\gamma = 1$ 是实测值。于是全部欠债化为一个问题：**什么定住 γ ？**

第 16 节已经回答过。Schwarzschild 关系在标度语言中是 $s_t \cdot s_r = 1$ ——时间与径向单位互为倒数——而定理 16.1 证明标量标度不平直化就无法满足它。互为倒数即 $g_{tt}g_{rr} = -1$ ，即径向因子是时间因子的逆。把那个逆展开，线性系数就被逼定了：

定理 23.1 (定住系数的展开).

$$(1 - 2\mu)^{-1} = 1 + 2\mu + \frac{4\mu^2}{1 - 2\mu},$$

是恒等式而非近似。 μ 的系数是 2，即 $\gamma = 1$ ；余项被显式写出而非丢弃。

Lean 出 处: PPN.reciprocal_expansion, PPN.gamma_eq_one_of_reciprocal, PPN.gamma_eq_one_first_order

倒数条件强制 $\gamma = 1$ ，而 $\gamma = 1$ 给出实测偏折。各向同性扇区拿不出的那一半就是径向标度，而它的大小从来就不自由。
Lean 出处: PPN.deflection_reciprocal_eq_observed, PPN.halves_equal

Cassini 把 γ 限制在 1 的约 2×10^{-5} 之内。本框架的倒数条件预言 $\gamma = 1$ 且**无自由参数**，故这是一次真实且目前成功的检验——检验的是方向性扇区，各向同性扇区此前已被排除。

注 23.2 (结清到什么程度). 缺失的一半不再是无解释的：它是径向标度，其大小由倒数关系强制而非拟合。第 22 节的欠债在**系数层面**已结清。仍未做的是逐分量曲率计算，那才能说明场方程产生一个互为倒数的位形；在这里，倒数性是被描述的解的性质，还不是从源导出的推论。

24 第二个数字：水星

第 22、23 节给出一个定量结果，并证明各向同性扇区差了 2 倍。一个数字有巧合风险。本节给出第二个、性质不同的数字，而各向同性扇区在其上差了 3 倍——差的倍数不同，这才是有用的地方：两处偏差无法被同一个重标度同时吸收。

近日点进动（每轨道）的标准参数化为

$$\Delta\phi = \frac{2 - \beta + 2\gamma}{3} \cdot \frac{6\pi GM}{a(1 - e^2)c^2}.$$

γ 就是第 23 节被倒数条件 $s_t s_r = 1$ 强制为 1 的那个空间标度权重； β 度量时间标度的非线性，在 $A6'$ 的标度响应下为 1。

定理 24.1 (系数). $\gamma = \beta = 1$ 给出系数 1；各向同性扇区 ($\gamma = 0$) 给出 1/3。系数对 γ 是仿射的，斜率 2/3。

Lean 出 处: Precession.coeff_reciprocal, coeff_isotropic, isotropic_is_third, coeff_affine_in_gamma

	预言	实测
倒数扇区 ($\gamma = 1$)	42.99"/ 世纪	$42.98 \pm 0.04"/$ 世纪
各向同性扇区 ($\gamma = 0$)	14.33"/ 世纪	——

Lean 出处: Precession.mercury_value, Precession.mercury_isotropic_value

真正重要的一致性检验。各向同性扇区在光线偏折上差 2 倍，在近日点进动上差 3 倍。倍数不同，而两者都由在同一个参数化中令 $\gamma = 0$ 得到。一个缺失成分——空间标度——同时解释两处偏差，且没有任何可调余地。

25 耗散之下的局域广义协变性

对 A6 最直接的反驳是：若基准标度永不停止漂移，局域物理岂不被摧毁？氢原子为什么昨天和今天一样大？太阳系为什么不膨胀？

答案由 A5 强制。宇宙耗散是基准的空间常数漂移 $\sigma_t = \sigma + c(t)$, $\partial_i c(t) = 0$ ；而一切几何量都由 σ 的导数构成，漂移逐项相消。

定理 25.1 (局域几何与宇宙时无关). 对任意两个宇宙时刻 t, t' :

$$\sigma_i, \quad \Gamma^a_{bc}, \quad R^a_{bce}, \quad R_{be}, \quad D_{ij}, \quad e^{2\sigma} R$$

逐一相等。

Lean 出处: `Covariance.CosmicHistory.no_local_expansion`

推论 25.2 (场方程形式不变). 若 $e^{2\sigma} R = \kappa \rho$ 在某一时刻成立，则它在每一时刻以相同的 κ 与相同的局域 ρ 成立。全局耗散不重整化局域引力，局域广义协变性严格保持。

Lean 出处: `Covariance.CosmicHistory.field_equation_form_invariant`

物理结论：**束缚系统不膨胀，这是定理而非假设**。膨胀不是空间对物质施加的局域力；它只在比较两个不同基准时才可见——而这恰恰就是一次宇宙学红移测量所做的事。

26 奇点只是极小的尺度

A2 把标度写成 $s \in A^\times$ ，即单位群的元素。这不是技术选择：一个度量单位必须是可以拿来做法除的东西。后果是结构性的。

定理 26.1 (无度规退化). $s \neq 0$ 处处成立； $\varepsilon = 1/s \neq 0$ 处处成立；共形因子 s^2 处处可逆。

Lean 出处: `Singularity.ScaleField.scale_ne_zero, energy_ne_zero, conformal_factor_isUnit`

定理 26.2 (曲率只看标度的变化，不看标度的值). 若两个标度场的一阶、二阶导数相同，则其 Riemann 张量相同，无论二者的标度相差多少。

Lean 出处: `Singularity.curvature_indep_of_scale_value`

由主定理 15.2，Riemann 张量是 σ 导数的多项式， s 根本不出现。因此**标度变小本身不产生任何曲率发散**。广义相对论所报告的奇点，在此框架下是 $\sigma \rightarrow$ 极负的区域：尺度极小、能标极高，但二者都有限且都可逆。理论在那里并不失语。

这与“奇点是数学奇点”的图景相反，而与本纲领的物理直觉一致：奇点是一个尺寸极小的点，不是一个洞。

27 黑洞、引力波，以及哪些标准问题是我们的

非交换曲率闭合之后，引力扇区可以往前推。标准问题中有些在这里问得出来，有些问不出来，把它们分开是一半的工作。

27.1 没有奇点——也没有视界

第 26 节证明标度作为单位不可消失，故无度规退化。同一事实还说了一句此前没被引出的更强的话。

视界是度规时间分量为零之处。对角方向性标度下该分量是 $-s_t^2$ ，而 s_t 是单位：

定理 27.1 (无视界、无无穷红移). $g_{tt} = -s_t^2$ 永不为零，故**没有视界**；其倒数伙伴 $s_r = s_t^{-1}$ 也永不发散（第 21 节把二者绑定）；而红移是两个单位之比，故是单位，故**既不为零也不为无穷**。

Lean 出处: `Horizon.gtt_ne_zero, reciprocal_never_degenerate, redshift_never_infinite, no_degeneracy_anywhere`

无奇点、无视界、无无穷红移——三者出自同一个事实：标度是比值，而比值可逆。

那么观测现象如何解释？一切经典检验都由外部算出，而外部原封未动：从对角拟设经第 20 节到第 21 节的链条不变，故黑洞阴影、最内稳定轨道、铃宕频率、光线偏折全部与广义相对论一致。黑洞在这里是标度比值极端但有限的区域：任意黑，但不全黑。

三条与标准图景不同的推论，同源於上述定理：没有任何东西被因果隔断、没有信息被销毁、红移有界而非发散。这三条目前都不可测，我不作相反声称。

27.2 引力波，以及一个尖锐的判别式

第 45 节证明“是否类光”不依赖于标度。由此分出两件事。

定理 27.2 (引力波恰好走在光锥上). 引力波是标度的传播扰动——因为几何就是标度花样。而标度扰动移动不了光锥。故**引力波与光共用光锥：同速、无色散、无质量**。

Lean 出处: `Horizon.null_cone_scale_independent, waves_travel_on_the_light_cone`

定理 27.3 (禁止能量依赖的光速). 由 A3，能量就是标度之倒数，故标度无关的光锥就是能量无关的光锥。本框架禁止能量依赖的光子到达时延，任何阶。

Lean 出处: `Horizon.no_energy_dependent_speed`

这是一个真判别式：带最小长度的方案普遍预言一个小的能量依赖延迟，而本框架预言恰好为零。伽马暴计时已在约束领头效应，每一次改进都在直接检验它。

27.3 偏振数恰为二，而呼吸模是被禁止的

波是标度花样的扰动。数它的独立模式是算术，前提是先把扇区分开。

定理 27.4 (两个偏振，来自两个不同扇区). 三个空间方向中，一个是传播方向，横向维数为 2。于是

- 标度扇区贡献 $2 - 1 = 1$ 个模（即 + 模， $\delta s_x = -\delta s_y$ ）；
- 转动扇区贡献 $\dim \Lambda^2 \mathbb{R}^2 = 1$ 个模（即 × 模）。

合计 2。两者来源不同——一个是标度之差，一个是转动——这是广义相对论不作的区分，而在此由第 9 节的 Cartan 拆分逼出。

Lean 出处: `Horizon.two_polarizations, polarization_count`

那个被减掉的 1 不是约定，是 A5。标量（呼吸）偏振就是横向的均匀重标度——而那恰是一次基准平移，A5 宣布它不可观测。故呼吸模不是“在解中恰好为零”，而是不可表达。

这是对标量-张量理论的判别式：那类理论一般预言呼吸模，而本框架预言其振幅恒等

于零，不是小。足够大的探测器网络的偏振检验直接测这一条。

Lean 出处: `Horizon.no_breathing_mode`

27.4 黑洞熵是对数的，不是面积律

熵在这里是可分辨结构的计数（第 44 节），而第 47 节测出其密度 ρ 。故跨越标度比值 R 的区域，熵为

$$S = \rho \ln R.$$

定理 27.5 (比值加倍只增加一个常数). 面积律会使熵翻四倍；此处增量只依赖于比值增长的因子，与已达到的比值无关。

Lean 出处: `Horizon.entropy_of_scale_ratio`, `entropy_doubling_is_additive`, `entropy_increment_independent_of_size`

这与 Bekenstein–Hawking 面积律矛盾。我把它作为分歧而非任何东西的推导来陈述：面积律被广泛相信但从未被测量，而本框架无法复现它，因为面积律的推导需要视界，而上一小节说视界不存在。**要么框架在此处错，要么面积律错，而现有的一切都判不了。**

27.5 哪些问题是借来的

引力子。引力子是一个具有粒子激发的场的量子。第 34 节说不存在标度无关的物种清单，而此处引力不是几何上的场，**它就是标度本身的不均匀。**故“引力子是什么”同时引进了框架所拒绝的场本体论与物种本体论。**取代它的是定理 36.1：**引力的量子内容是标度梯度的对易子，而那不是一个粒子。

散射振幅。振幅需要内容固定的渐近入态与出态。第 34 节说没有标度携带完整清单，故“那些”渐近态并不存在。存活下来的是**两个被指名标度之间的映射**——而这正是重整化振幅实际所是；它的标度依赖不再是麻烦，而成为内容。

短距完备化。完备化预设一个最后的标度。

定理 27.6 (没有最小长度). 对任何被提议的最短标度都存在更细者：阈值无界，且标度是单位故分辨率无上限。**本框架预言没有最小长度**，这与一切预设基本长度的纲领矛盾——而这个预言正是定理 27.3 使之可检验的那一个。

Lean 出处: `Horizon.no_minimum_length`, `no_final_description`

注 27.7 (四项的结局). 两项被回答 (引力波、熵)，一项被否定地回答且带可检验推论 (短距完备化)，一项作为借来的问题被**谢绝** (引力子)，并指明取代它的是什么。

28 引力波动力学：旋近、波形与辐射功率

第 27 节做的是运动学——波恰在光锥上、无色散、偏振恰为二、呼吸模被禁止。本节做动力学，以便与脉冲双星计时和干涉仪数据对照。

28.1 诚实的分工，先说清楚

框架自己导出的：多极结构。定理 14.3 证明场方程只有在其源守恒时才写得下来——守恒在这里不是额外公设，是方程存在的条件。那条定理干的正是通常靠假设 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 才能干的活。

一个输入：系数 κ (A6')。但它只出现一次——静态 Poisson 方程与四极系数共用同一个 κ ，故由 Newton 极限定住它之后，辐射率没有任何剩余自由度。这就是为什么 Hulse–Taylor 是一次检验而不是一次拟合。

属于标准数学、不是物理引进的：给定 $\square$ 与守恒源，把推迟 Green 函数按多极展开是微积分。32/5 与间距的五次方是那次展开的后果。

28.2 什么在辐射：守恒定理杀掉低阶

定理 28.1 (单极与偶极都不辐射)。守恒矩的时间导数为零，故它恒定；而恒定的矩在任何阶都不贡献辐射场。单极是总源，偶极的一阶导是总动量——同一条守恒律把两者都冻住。

Lean 出 处: Waves.monopole_does_not_radiate, Waves.dipole_does_not_radiate, Waves.quadrupole_is_leading

“无偶极辐射”在这里是预言，不是约定。标量-张量理论一般会在偶极阶辐射，因为它们带一个不守恒的标量荷。本框架没有这样的荷：定理 27.4 去掉了标量偏振，而定理 14.3 去掉了偶极。脉冲双星计时测的正是这一条。

28.3 圆轨道双星

定理 28.2 (辐射功率与旋近)。 $P = \frac{32}{5} G^4 (m_1 m_2)^2 (m_1 + m_2) / (c^5 r^5) > 0$ ；间距减半，功率乘以 32——这就是旋近失控的原因。而 $E = -G m_1 m_2 / 2r$ 使能量损失强制 $\dot{r} < 0$ ，闭形式为

$$\dot{r} = -\frac{64}{5} \frac{G^3 m_1 m_2 (m_1 + m_2)}{c^5 r^3}.$$

Lean 出 处: Waves.power_pos, Waves.power_ratio_halving, Waves.inspiral_shrinks_orbit, Waves.separation_rate

28.4 啁啾：干涉仪实际测的量

定理 28.3 (啁啾质量)。频率演化只通过一个质量组合进入： $\mathcal{M} = (m_1 m_2)^{3/5} / (m_1 + m_2)^{1/5}$ ，且 $df/dt \propto \mathcal{M}^{5/3} f^{11/3}$ 。 $\mathcal{M}$ 对两质量对称——领头阶波形分不出哪个是哪个；等质量时 $\mathcal{M} \cdot 2^{1/5} = m$ 。

Lean 出 处: Waves.chirpMass_symm, Waves.chirpMass_equal, Waves.chirp_exponent, Waves.chirp_mass_exponent

28.5 对数据

观测	本框架	结果
PSR B1913+16 衰减 / 四极预言	1 (无偶极项)	0.9983 ± 0.0016
PSR J0737-3039 (双脉冲星)	1 (无偶极项)	符合到 0.013%
偶极辐射分数	恒等于 0	$< 1.3 \times 10^{-4}$
GW150914 啁啾质量	——	$30.7 M_{\odot}$, 等质量读作 $\approx 35 M_{\odot}$

双脉冲星十六年计时把四极公式检验到 0.013%，比 Hulse-Taylor 紧一个量级 ($\dot{P}_b$ 的相对精度 6×10^{-5})。

Lean 出处: `Waves.doublePulsarPrecision`, `Waves.dipole_bounded_by_double_pulsar`, `Waves.double_pulsar_tighter`, `Waves.hulse_taylor_agreement`

必须说清这些符合检验了什么。

它们不区分本框架与广义相对论。各向同性扇区里 SCD 给出 $\gamma = 1$ 、波在光锥上、四极领头、静态与辐射扇区共用同一个 κ ——领头阶波动预言与广义相对论逐项相同。故双脉冲星同时确认两者，对二者之间毫无分辨力。

它确实做到的是把 {SCD, GR} 与带标量通道的理论分开。而在这一侧分得更利落：标量-张量理论有一个可以调小的耦合，而这里偶极被一条定理禁止、呼吸模不可表达。一旦测到偶极项，这里没有东西可调——框架直接失败。

Lean 出处: `Waves.gw_sector_matches_gr`

28.6 框架确实分道之处：没有视界

定理 27.1 证明度规永不退化，故没有视界——只有标度比值极端但有限的区域。而广义相对论算铃宕时用的边界条件是在视界上纯内向。没有视界就没有那个面，边界条件必须不同，而部分反射的边界一般会在铃宕后产生晚期回波。

这是波动扇区里两套理论唯一可能分开的地方，而数据目前在往反方向推。对 GW150914、GW231226、GW250114 的模型无关搜索未发现显著回波信号并给出上限；GW250114 的铃宕与 Kerr 黑洞一致。

框架能说与不能说的：它说反射率不恰好为零，因为标度是单位。它不预言振幅或延迟——那取决于标度逼近零的程度，而那由具体解、最终由那一个自由单位决定。所以零结果尚未证伪任何东西，而框架在此也还没给出可证伪的东西。登记为开放项，不是预言。

Lean 出处: `Waves.reflectivity_nonzero_but_unbounded`

注 28.4 (仍然没有的). 数值相对论、并合与铃宕、领头阶之外的后 Newton 修正、自旋。那些需要含时各向异性解，而本开发只有静态球对称的那一个。本节处理的是领头阶、圆轨道、无自旋的旋近。

Part V

第五部分 各向异性扇区：标签与荷

本部分的一切只存在于各向异性轨迹上。标度花样的方向一旦处处一致，以下全部对象——序参量、绕数、块荷、多重态、内禀对称性——一个都不存在，不是取平凡值，是不存在（第 13 节）。

而花样是否各向异性是**标度相关**的事实。所以本部分的标签不是世界的性质，是某个标度轨迹的性质——它们在各向同性破缺处一并诞生，因为它们同源。这就是“相互作用随能标下降而分离”，是导出的，不是假设的。

29 内禀对称性无处可去

规范理论挑一个李群、在每点挂一个内禀空间、让联络作用其上。正是这份自由，使标准模型的群成为输入：形式体系本身不指定任何群。

本框架没有这份自由，而这恰恰是有趣的地方。**这里没有内禀空间**。一点上唯一的结构是方向性标度 $s: \text{Fin } n \rightarrow A^\times$ 。因此，一个不是基底运动的对称性，只能是标度花样的对称性——一个使每个局域单位保持原样的方向重标号。

定理 29.1 (内禀对称性即标度花样的稳定子). 这些重标号构成一个群，其中没有任何选择余地。特别地：

- (i) 若各方向标度互不相同，则内禀对称性**不存在**；规范自由不是通有的，它是简并的后果。
- (ii) 若全部相同（各向同性扇区，即旧标量公理），则对称性是全置换群。

Lean 出处: `Gauge.stabilizer_eq_bot_of_injective`, `Gauge.stabilizer_eq_top_of_isotropic`

定理 29.2 (多重态就是简并块). 两个方向被某个内禀对称性联系，当且仅当它们携带相同的局域单位。故**规范结构与多重态结构同源**：都来自方向性标度之间的重合花样，而多重态的大小就是简并块的大小。

Lean 出处: `Gauge.sameOrbit_iff_eq_scale`, `Gauge.internal_symmetry_determined`

这给出的是一条限制，而非对 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的推导：框架断言内禀对称性**必须是**某个标度简并的稳定子，故规范因子一块一个、多重态大小即块大小；一个作用在与标度花样无关的内禀空间上的群，在这里不可用。这是关于“何种规范理论可以存在”的可证伪的结构性断言。

必须明说：本节不断言观测到的花样是 $3 + 2 + 1$ ，也不解释代结构。那需要把标度花样本身导出来，而它没有被导出。

30 点粒子回来了，而“比值”就是原因

第 54 节断言三维中框架的缺陷是弦而非点。那个结论用的是 `Defect.lean` 的标量圆值标度——而在公理提供方向性标度的地方使用标量标度，正是第 16 节早已诊断过的那个错误。它被犯了第二次。

A4 给的不是一个标度，是每个方向一个标度。所以一点上的位形不是一个相位，而是标度在各方向上的花样，场取值于这种花样的空间。那个空间不是圆，其缺陷也不只由回路分类。

决定性的性质是被逼出来的，而逼出它的恰恰是当初让标量图景显得不可避免的那件事：

标度是长度之比，所以它看不见方向的取向。把方向反过来，一切标度读数不变。

定理 30.1 (标度读数是偶的). $Q(-v) = Q(v)$, 对裸形式与被测形式都成立；因而没有任何标度测量能把一个方向与它的反向区分开。

Lean 出处: `Axis.bareForm_neg`, `Axis.physForm_neg`, `Axis.neg_indistinguishable`

于是序参量是一条无取向的轴——一个射影对象，不是矢量。而射影序参量众所周知同时携带两类缺陷：二阶的线缺陷，以及带整数荷的点缺陷。

点粒子回来了，而它们回来是因为标度是一个比值。

30.1 哪种花样支撑序参量

定理 30.2 (三种花样). (i) 完全简并 (各向同性, 即旧标量公理): 一切重标号都是对称性, 没有任何东西逐点变化, 不支撑任何缺陷;

(ii) 完全非简并: 无内禀对称性, 序参量是一整个标架;

(iii) 单轴 (一个方向被挑出, 其余简并): 对称性恰为块内重标号, 序参量是一条无取向的轴——正是携带点缺陷的那种位形。

Lean 出处: `Axis.isotropic_no_order_parameter`, `Axis.nondegenerate_full_frame`, `Axis.uniaxial_stabilizer`, `Axis.uniaxial_axis_distinguished`

注 30.3 (作为输入而非证明). “三维中无取向轴场的 $\pi_2 = \mathbb{Z}$ 、 $\pi_1 = \mathbb{Z}_2$, 故有整数荷点缺陷与二阶弦”是标准拓扑结论, 此处作为输入。框架提供的是射影性, 而点缺陷正是从射影性来的。

更正记录。第 54 节的定理对圆值标度仍然成立, 被撤回的是“它们描述本框架”这一主张: 在 A4 的方向性标度下它们不描述本框架, 框架终究预言点粒子。

同一处替换 (把方向性的东西当成标量的) 已经犯了两次。本节留档, 以免犯第三次。

31 粒子: 不用场的产生机制

量子场论用背景上的场的量子化产生粒子: 粒子是激发, 荷是表示标签, 质量是拉氏量的参数。这些在本框架中一样都没有。与其模仿, 不如照标度图景直说。

本节用的是圆值标度图景, 它已被取代。第 30 节表明: 标度是一个比值, 故读数无向, 序参量是一根无向轴而非一个圆——这是方向性 A4 的后果。本节关于绕数为整数、荷唯一、反粒子简并的定理仍然成立 (它们只用到“回路要么闭合要么差整数个周期”), 但由圆值图景推出的余维数结论已被撤回 (第 54 节), 而缺陷的完整标签由第 32、33 节给出: (阈值, $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}$)。

若 A5 的连续标度对称性破缺到离散子群——标度只在模 Δ 的意义下有物理——则对数标度可被当作圆值场处理。绕任一点的闭合回路一周, 标度必须回到模 Δ 的自身, 因而未必精确回到自身; 其偏差是 Δ 的整数倍。

那个整数就是粒子。粒子是度量单位中的缺陷：一处局域标度无法被梳理平整的地方。

定理 31.1 (荷是整数, 且唯一确定). 配置唯一决定其绕数; 没有重新指派自由。荷之为整数, 不是因为选定了某个表示, 而是因为回路要么闭合、要么差整数个周期。孤立的分数荷因此不可能出现。

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.winding_unique`

定理 31.2 (粒子稳定). 绕数非零的缺陷不是平凡配置: 标度绕它确实不闭合。稳定性是拓扑的, 证明中未使用任何关于力或势的假设。

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.stable_of_winding_ne_zero, winding_eq_zero_of_trivial`

定理 31.3 (荷守恒; 不能单独产生). 绕数可加; 粒子与其反粒子的总绕数为零, 故可以从真空成对产生, 而单个缺陷不能。

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.pair_winding_zero`

定理 31.4 (反粒子质量严格相等). 电荷共轭即取向反转, $|k|$ 不变, 故 $m_{-k} = m_k$ 。这一简并不是作为对称性原理被强加的, 而是荷为绕数的推论。

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.antiparticle_same_mass`

定理 31.5 (几何质量塔——基于一条被假设的质量律). **注意:** 此律是假设而非导出, 见第 51 节的撤回。若假定质量即逆标度且缺陷的荷每增加一就跨一个周期, 则

$$m_k = m_0 e^{|k|\Delta}, \quad \frac{m_{k+1}}{m_k} = e^\Delta \text{ 在每一层都相同.}$$

Lean 出处: `Defect.ScaleDefect.mass_ratio_geometric, mass_ratio_const, mass_zero`

与标准模型的差别, 即可测试之处。 这不重现标准模型, 也不打算重现。它是一套不同的机制, 具有不同的特征: 恒定的质量比、向上无界的塔、严格整数的荷、以及粒子—反粒子质量精确简并。这四条是应当被检验的东西。

必须明说: 本节不给出规范群, 不给出代数结构, 不产生任何具体粒子的数值。它给出的是——一条不同于 QFT 的产生机制及其可证伪的形状。

32 两个拓扑荷, 只有一个被禁闭

第 30 节让点粒子回来了: 单轴标度花样的序参量是一条无取向的轴, 而这种序参量携带两类互不相同的缺陷。于是框架面临一个此前未曾面对的问题——第 52 节的荷与点缺陷的荷是同一个量子数, 还是两个?

是两个, 而它们的差别才是有意思的地方。

注意: 第 52 节的色解释已被撤回 (见第 51 节)。本节引用的只是它的块单值性结构, 那部分成立; 而块群的取值由第 33 节定死为 $\mathbb{Z}/2$ 。

- **块荷**是绕一圈后简并方向所经历的置换。它住在一个有限群里, 而它正是第 52 节所约束的那个: 位形可观测当且仅当标号闭合。
- **刺猬荷**是轴在包围球面上的整数缠绕数。它住在 $\mathbb{Z}$ 里, 而没有任何东西约束它。

定理 32.1 (恰好一个被禁闭). (i) 非平凡块荷不可单独观测;

(ii) **每一个**整数刺猬荷都被某个可观测态携带。

Lean 出处: `Charges.DefectCharge.block_confined, hedgehog_free, exactly_one_confined`

定理 32.2 (两个荷相互独立). 固定块荷不定住刺猬荷, 反之亦然。它们是两个真正独立的量子数, 不是同一个的两种读法。

Lean 出处: `Charges.DefectCharge.charges_independent, observable_pair_any_hedgehog`

这份不对称不是放进去的。它来自两个荷住在同一个序参量的不同同伦群里: 有限的那个来自回路, 整数的来自球面, 而可观测性条件——要求标号闭合——只看得见前者。

由此得到的图案正是观测到的那个: **一个取有限多个值、被禁闭的荷, 外加一个不被禁闭的整数荷。**

框架未导出那个有限群是 $SU(3)$ 的中心, 也未导出那个整数是电荷; 它导出的是: **必然恰有这两类荷, 且恰有一个被禁闭。**

33 代数允许的粒子模型

第 10 节定住了族。三项此前自由的输入随之被约束, 本节把它推到头。

目标刻意不是量子场论。第 34 节已论证物种清单是标度轴上某一截面的性质, 故复现它不是检验。这个层级的框架能被要求的是**标签结构**: 一个粒子是一份什么样的清单, 以及两个相加会怎样。

33.1 标度花样坍缩为一个矢量

定理 33.1 (缩放被方向矢量忠实标记). $\text{boost } v = \text{boost } w \Rightarrow v = w$ 。连同定理 10.3, A4 的 n 个独立单位被压成一个**矢量**, 在转动意义下压成一个**量值**。

Lean 出处: `Particle.boost_injective, pattern_is_one_vector`

这是对一项长期输入的大幅削减——从 n 个自由函数到一个数加一个方向——但**不是消除**: 那个量值仍然自由。已登记。

33.2 恰好一个阈值速率, 而这是可检验的

第 47 节由 A5 论证阈值是恒速率过程, 得到 $CV = 1$ 。秩一从结构上给出同一结论, 而且尖锐得多, 因为它规定了能有几个速率。

秩一根系只有一个根, 故只有**一个**指数速率。秩二以上会有多个根、多个速率, 从而是若干恒速率过程的交错——一个指数混合。而混合必然过离散:

定理 33.2 (恒等式). $pa^2 + (1-p)b^2 - (pa + (1-p)b)^2 = p(1-p)(a-b)^2$ 。纯代数。

Lean 出处: `Particle.mixture_second_moment`

定理 33.3 (任何两速率混合都有 $CV^2 \geq 1$). 且**取等当且仅当两速率相同**——即恰好在秩一的情形。

Lean 出处: `Particle.mixture_cvSq_ge_one, mixture_cvSq_eq_one_iff`

于是预言从“一个目标值”升级为**双侧陈述**：秩一给 $CV^2 = 1$ ，任何更高秩给 $CV^2 > 1$ 。观测值 $CV^2 = 0.875$ 在一以下，故**质量谱是反对更高秩代数的证据**。这是对代数本身的一个检验，而它来自粒子谱。

Lean 出处：Particle.observed_disfavours_higher_rank

注 33.4 (代数不定的东西). 速率的数值。把根的半和换算成“每单位对数能量的密度”需要一个根的归一化，而框架不提供。故 $\rho \approx 0.86$ 仍是测量值，预言是关于**离散度**而非密度。形式陈述：混合的 CV^2 在两个分量均值同时缩放下不变。

Lean 出处：Particle.rate_value_not_fixed

33.3 禁闭荷是二值的，这结清了 ColorAudit

第 32 节给每个点缺陷两个拓扑标签——某个有限群 B 中的块荷，与整数刺猬荷——并让 B 自由。

代数把它定死了。序参量是标度轴，因标度是比值而无向（第 30 节），故它是缩放扇区中过原点的一条直线，即实射影空间；其环路类构成 $\mathbb{Z}/2$ 。

定理 33.5 (禁闭荷恰取两个值，且三值不可能). $|B| = 2 \neq 3$ 。

Lean 出处：Particle.block_two_valued, block_cannot_be_three_valued, block_self_inverse

第 53 节把“此荷给 2 而数据要 3”记为一个未获解释的失败。**它不再是未获解释的**：块群是 $\mathbb{Z}/2$ ，因为序参量是射影的，所以 3 从来就不在供给里。色**确定**不是这个量子数，而且没有任何修补能让它是——这正是第 34 节说它应该是的：一个截面的特征。

33.4 一个粒子是什么

一个粒子 = 一个**阈值** $\in \mathbb{R}$ 、一个 $\mathbb{Z}/2$ **标签**、一个**整数荷** $\in \mathbb{Z}$ 。**框架不提供第四个槽位**。

Lean 出处：Particle.no_further_label, particle_label_structure

复合把它们相加，选择定则由此直接给出：

定理 33.6 (两个奇复合成偶). 两个 $\mathbb{Z}/2$ -奇缺陷复合出平凡块标签。仅凭群，无需动力学。

Lean 出处：Particle.two_odd_make_even

定理 33.7 (整数荷在任何分裂中精确守恒). 这是一个恒等式，故没有任何动力学能违反它。

Lean 出处：Particle.hedgehog_conserved_in_splitting

整数荷是非禁闭的（定理 32.1）且精确守恒。在观测到的世界里，恰有一个内禀量子数同时具备这两条性质——**电荷**：色被禁闭，弱同位旋被破缺，重子数与轻子数有反常。

这是结构上的吻合，而且被作为吻合陈述，不是对电磁学的推导。

注 33.8 (诚实的界限). 没有质量、没有耦合常数、没有代结构，也没有任何理由给出整数荷的具体取值。 $\mathbb{Z}/2$ 标签具有统计标签的形状，但此处没有任何东西推导出自旋或自旋-统计联系，故它**不被称作自旋**。“射影序参量的 π_1 是 $\mathbb{Z}/2$ ”是标准拓扑，与秩一分类同样属于引用。

34 没有基本粒子

第 52 节试图产生色，第 53 节表明它失败得不近。那次失败不是技术性的。整个目标就瞄错了：它拿了标准模型的本体论——一张固定的物种表，每个带内禀标签——然后试图重现它。那是把问题也借了过来，而框架并没有那个问题。

A3 说的是另一件事，而且从一开始就在公理里： $\varepsilon \cdot s = 1$ 。能标就是逆长度标度。所以“存在什么”不是世界的性质，而是**世界在某个分辨率下的性质**。改变分辨率，你不是对同一批粒子知道得更多——**你在看另一批**。

这也正是本框架中“统一”的含义。引力、 $\hbar$ 、粒子内容不是三样待调和的东西，而是同一个变量的三种读法：

- 引力是标度的不均匀性（第 15、8 节）；
- $\hbar$ 是沿标度迈一步的步长（第 35.5 节）；
- 粒子内容是标度上的一个截面——本节。

定理 34.1 (没有完整的清单). 若阈值无上界——A2 允许这一点，因为标度是单位元、永不为零，故没有最小长度来给分辨率封顶——则**对每一个标度都有东西未被分辨**，且内容严格增长无穷多次。

于是根本不存在“那一份”基本粒子清单。问“基本粒子有哪些”预设了一个与标度无关的答案，而公理不提供这样的答案。

Lean 出处: `Emergence.content_never_complete, always_more_above, no_fundamental_list`

定理 34.2 (质量是位置，不是属性). 质量与阈值互相决定。故质量**不是附着在物种上的参数**，而是该物种出现在标度轴上的坐标。

Lean 出处: `Emergence.mass_iff_threshold, Emergence.mass_mono`

这一条同时回溯解释了两个早先的发现。第 51 节发现质量律不被拓扑决定——当然不：质量根本不是缺陷的属性，而是缺陷出现的地方。而有效场论“每换一个能标就得换框架”的尴尬也不是尴尬：定理 37.6 说阈值之间的描述是精确的，本节说没有最后一个阈值。**理论只是在如实报告自己的结构**。

Lean 出 处: `Emergence.content_eq_of_no_threshold, Emergence.content_changes_only_at_threshold`

放弃了什么。色、代结构、Higgs 以及标准模型表的其余部分**不是本报告的目标**。它们是一个截面的特征，而框架没有理由去重现某个截面的偶然内容。

应当向框架索取的是**阈值结构**——内容在哪里改变——那是另一种、而且可检验的预言。第 52 节的色解释就此撤回，其数学作为“简并块的结构”保留。

Part VI

第六部分 量子扇区

此处的“量子”不是另一套理论，是同一个标度的另一个读数。 $\hbar$ 不是外加常数，是沿标度轴平移一步与“在哪里”不对易的失配大小；而几何的全部量子修正是标度梯度的对易子 $[\sigma_i, \sigma_j]$ ，它纯反对称，故对第四部分的一切经典检验不可见。

35 非交换基底：量子力学的回归

A1 的基底是一个环，不要求交换。交换性是经典扇区的性质，不是基底的公理。这不是补丁，而是比补丁更强的事实：**经典扇区的微分结构从来没有用到交换性**——A1 要求的只有 Leibniz 律与混合偏导可交换，而这两条对任意环中的内导子 $\text{ad}_p = [p, \cdot]$ 逐字成立。

注 35.1 (一处开发记录). 本报告初稿确曾把基底取为交换环，理由是它让曲率计算可以由 ring 战术封闭。那是**工具驱动而非物理驱动**的选择，且若成立就等于从一开始把量子力学排除在外 ($[\hat{x}, \hat{p}] = \hbar$ 恰恰是非交换的)。本节是那次修正的结果。

定量引力链条曾长期仍跑在交换扇区上——那是最后一个大缺口，已由第 36 节关闭：曲率计算不再需要交换性，而第一个修正被辨认出来 (是 $[\sigma_i, \sigma_j]$)，不是被假设。

35.1 导数就是对易子

定理 35.2 (任意环中的 Leibniz 律). $\text{ad}_p(ab) = \text{ad}_p(a)b + a\text{ad}_p(b)$ 。

Lean 出处: `Quantum.ad_leibniz`

定理 35.3 (Jacobi 恒等式). $\text{ad}_p\text{ad}_q - \text{ad}_q\text{ad}_p = \text{ad}_{[p,q]}$ 。因此两个内导子可交换，当且仅当其生成元可交换。

Lean 出处: `Quantum.ad_jacobi`, `Quantum.ad_comm_of_commute`

定理 35.2、35.3 合起来说明：A1 中的 ∂_i 不必被假定，它们就是对易子；而“选定一个坐标系”在此获得精确含义——**选定一组互相对易的可观测量**。经典时空的存在性因此不是先验的，而是“存在足够大的对易子代数”这一条件的几何影子。

35.2 经典微积分是对易子的定理

只假设正则对易关系 $[P, X] = c$ (c 中心)，不假设任何别的东西：

定理 35.4 (幂律，由对易子导出)。

$$[P, X^{n+1}] = (n+1) X^n c.$$

取 $c = -\hbar$ 、 $\partial := (\hbar)^{-1}\text{ad}_P$ ，这读作 $\partial(x^{n+1}) = (n+1)x^n$ 。

Lean 出处: `Quantum.ad_pow`

即：微分学的幂律不是分析学的公理，而是关于非交换性的定理。经典扇区中被假定的导子，在这里被推导出来。

35.3 A3 在非交换扇区只能成立到 $\hbar$

A3 说 $\varepsilon \cdot s = 1$ 。在交换代数中这是精确恒等式，给出经典几何。在非交换代数中它不可能精确成立，而偏差的定量形式就是不确定性关系。

定理 35.5 (Robertson 不等式). 对对称算子 A, B 与单位向量 ψ ,

$$\|\langle \psi, (AB - BA)\psi \rangle\| \leq 2 \|A\psi\| \|B\psi\|.$$

Lean 出处: Quantum.robertson

定理 35.6 (Heisenberg 不确定性). 若 $(AB - BA)\psi = i\hbar \psi$, 则

$$|\hbar| \leq 2 \|A\psi\| \|B\psi\|, \quad \text{即} \quad \Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Lean 出处: Quantum.heisenberg

统一的陈述. 标度—能动量对偶 $\varepsilon s = 1$ 有且只有两种实现方式：在对易扇区它精确成立，给出经典几何与广义相对论（第 15 节起）；在非对易扇区它只能成立到对易子，而那个对易子就是 $\hbar$ ，给出量子力学。二者不是两个待调和的理论，而是同一条对偶在仅有的两个可用状态下的读数。

35.4 形变量子化：经典极限的严格形式化

上一小节只说明了对易子满足经典微分公理。真正欠下的是反方向：证明交换的标度代数确实是某个非交换代数的 $\hbar \rightarrow 0$ 极限，从而 ∂_i 就是对易子而非仅仅类似于对易子。

取一阶形变 $A_\hbar = A[\hbar]/(\hbar^2)$ ，星积

$$(f_0 + \hbar f_1) \star (g_0 + \hbar g_1) = f_0 g_0 + \hbar (f_0 g_1 + f_1 g_0 + P(f_0, g_0)),$$

其中 P 是 A 上任意双导子。

定理 35.7 (形变的存在与结合律). 对任意双导子 P ，星积结合。双导子的两条 Leibniz 律恰是一阶 Hochschild 上圈条件。

Lean 出处: Deformation.star_assoc

定理 35.8 (经典极限). $\hbar$ 的零次项恰为 A 的交换乘法，无任何近似。

Lean 出处: Deformation.star_classical

定理 35.9 (对应原理，精确成立). 对易子无经典部分，其 $\hbar$ 系数恰为 P 的反对称化：

$$\hbar^{-1}[f, g]_\star = \{f_0, g_0\}.$$

这里没有极限可取——一阶上该恒等式是精确的。

Lean 出处: Deformation.star_commutator

定理 35.10 (Poisson 括号是导子). $\{\cdot, g\}$ 对交换环 A 满足 Leibniz 律。

Lean 出处: Deformation.Biderivation.poisson_leibniz_left

定理 35.9、35.10 合起来就是所欠的那一步：**A1 中被假定的导子 ∂_i ，正是 $A_\hbar$ 的内导子除以 $\hbar$ ；非交换性是 $\hbar$ 的一阶效应，在 $\hbar = 0$ 处消失，留下引力扇区的交换几何。**

定理 35.11 (正则对易关系). 若 X 只沿方向 p 变化、 Π 只沿 q 变化，则 $\{\Pi, X\} = 1$ ，故在形变代数中 $[\Pi, X]_\star = \hbar$ 。取 $\hbar = i\hbar$ 即 $[\Pi, X] = i\hbar$ 。

Lean 出处：Deformation.ccr_of_canonical

至此闭环：定理 35.11 由经典标度代数产生 CCR，而定理 35.4 由 CCR 复原经典微积分的幂律。引力扇区的交换微分结构与量子力学的正则对易关系，是同一个一阶形变的两端。

35.5 把“一阶”这个限制取消掉

上一小节的形变只做到一阶。那是诚实的，但一阶截断是个不该安放地基的位置。而且它根本不必要——框架里本来就有一个精确的非交换来源。

问：理论实际拥有的是哪两个操作？一个是读取此处的量：乘以 a 。另一个是移到相邻标度：位移 T 。二者不对易，而不对易量不是小参数，是一个有限的、精确的量——标度差本身：

$$[U, M_a] = M_{Ta-a} \cdot U.$$

位置与标度不对易。这是 A3 ($\varepsilon s = 1$) 的算符形式：“分辨”在哪里”与“分辨”在什么标度上”是不相容的操作，而 $\hbar$ 是标度步长，不是一个形式符号。

定理 35.12 (交换关系与对易子的闭形式). $UM_a = M_{Ta}U$ ，且 $[U, M_a] = M_{\delta a}U$ ，其中 $\delta a := Ta - a$ 。**全程精确，无任何展开。**

Lean 出处：Crossed.shift_mul_eq, Crossed.commutator_eq

定理 35.13 (交换性 $\iff$ 标度步长为零). 代数交换当且仅当标度位移平凡。**经典几何不是为方便而取的极限，而是“沿标度什么也没动”的那个情形。**

Lean 出处：Crossed.comm_iff_shift_trivial

定理 35.14 (有限步长下的精确 Leibniz 律).

$$\delta(ab) = \delta(a)Tb + a\delta(b).$$

规则是扭曲的：第二个因子在位移后的标度上读取。此式对任意大的步长精确成立。当扭曲平凡 ($Tb = b$) 时，它退化为 A1 所假设的普通 Leibniz 律。

Lean 出处：Crossed.delta_twisted_leibniz, Crossed.delta_leibniz_of_untwisted

于是经典微分结构**不是“ $\hbar$ 的一阶截断”**，而是一条精确关系在零标度步长处取值。上一小节的限制就此被取消，而不是被绕过。

注 35.15 (仍在的限制). 本节给出的是位移与乘法生成的算符代数，未构造完整的交叉积、未讨论其表示论，也未把 $\hbar$ 的数值与任何具体步长联系起来。

36 闭合量子引力回路

唯一剩下的大缺口是：定量引力链条跑在交换扇区上。定理 14.2 已经证明代价是什么——在交换环上 ad 恒为零，故该扇区**完全没有输运曲率**，第 15 节的一切曲率只能从公设的 δ 进来。在这一步被重做之前，没有任何量子引力陈述可讲。

本节重做它。场景是一个非交换环，带 n 个相互对易的导子——导子仍然对易，因为那是一张图的选择（定理 14.1），但它们产生的值不再对易。

36.1 原封不动的部分

Kronecker 符号是 0 与 1 的像，故**中心**；凡只是把它们挪来挪去的步骤全都不变。Hessian 的对称性只来自 d_{comm} ，Christoffel 的对称性只来自 δ 的对称性。**联络是同一个对象**。

36.2 改变的只有一件事

定理 36.1 (全部量子引力修正，一行).

$$D_{ij} - D_{ji} = -2[\sigma_i, \sigma_j]$$

几何的全部量子引力修正，就是不同方向上标度梯度的对易子。

Lean 出处: `NCConformal.Dfm_antisymm_part`

它不是加进拉氏量的一项；它是**标度无法同时在两个方向上有确定梯度**——正是第 35.5 小节做成精确、第 35 节变成不确定度的那件事。

定理 36.2 (对称 $\iff$ 梯度对易). 故经典几何不是近似，而是对易子恰好消失的那个轨迹。

Lean 出处: `NCConformal.Dfm_symm_iff_commutator, Dfm_symm_iff_commute`

主收缩获得同样的修正，且再无其他。经典情形下 $\sum_m \Gamma_{cm}^a \Gamma_{be}^m$ 含有 $2\delta_{ac}\sigma_b\sigma_e$ ；非交换情形下这个 2· 变成**反对易子**，交叉项保持次序，并出现一个全新项 $\delta_{be}[\sigma_a, \sigma_c]$ 。

定理 36.3 (非交换主收缩及其经典极限). 逐项算出；对易子消失时精确回到第 15 节的结果。

Lean 出处: `NCConformal.sum_Chrr_Chrr_full_nc, sum_Chrr_Chrr_full_classical`

36.3 预言

修正是反对称的。而经典检验——偏折、进动、红移——都由 Ricci 的对称部分算出。

定理 36.4 (对称部分完全未被修正). 形变张量的对称部分**恰是**经典的那个，任何阶都没有对易子修正；全部修正住在反对称部分。

Lean 出处: `NCConformal.symmetric_part_uncorrected, correction_is_pure_antisymmetric`

故领头阶量子引力效应对一切经典检验不可见，只出现在对反对称几何部分敏感的观测量中。那是一种类挠率耦合；而由第 12 节，框架的转动标签恰是标度方向的楔积——**同一个对象**。于是预言是：

量子引力修正首先出现在自旋-几何耦合中，而不是轨道中。

Lean 出处: `NCConformal.quantum_correction_couples_to_rotation, correction_vanishes_on_commuting`

注 36.5 (量级, 诚实地说). 第 35.5 小节把 $[\sigma_a, \sigma_b]$ 的尺度定为标度步长。相对经典项, 修正就是那个量级, 故在太阳系中**完全可忽略**; 此处**不预言任何现有仪器可测的效应**。所主张的是第一个修正的结构, 以及它能与不能出现在何处。

注 36.6 (仍然没有的). 没有引力子、没有散射振幅、没有黑洞熵、没有短距完备化。**被闭合的正是被点名的那一个**: 曲率计算不再需要交换性, 而第一个修正被辨认出来而非假设。

Part VII

第七部分 标度流与内容

37 重整化群是定理，不是方法

37.1 标度流

定义 37.1 (标度流). 耦合空间 S 上的标度流是 $\Phi_t : S \rightarrow S$, 满足 $\Phi_0 = \text{id}$ 、 $\Phi_{t+u} = \Phi_t \circ \Phi_u$ 。群律由 A5 强制：基准先移 u 再移 t , 就是移 $t+u$, 没有别的可能。

Lean 出处: `RG.ScaleFlow`

命题 37.2 (不动点即标度不变). 若 $\Phi_t g = g$ 对一切 t 成立, 则任意可观测量 O 满足 $O(\Phi_t g) = O(g)$ 。

Lean 出处: `RG.ScaleFlow.observable_const_at_fixedPoint`

37.2 自相似只能是幂律

定理 37.3 (Callan–Symanzik). 若无量纲可观测量满足 $\frac{dO}{dt} = \gamma O$, 则

$$O(t) = O(0) e^{\gamma t}.$$

特别地 $\gamma = 0$ (不动点) 给出严格标度不变。

Lean 出处: `RG.callan_symanzik`, `RG.scale_invariant_of_fixedPoint`

反常量纲 γ 是标度协变行为的唯一可能形式。值得注意, 这与第 43 节的耗散律是同一条微分方程: 跑动的耦合与膨胀的宇宙, 是同一个数学在两个标度上的读数——这正是本纲领所主张的自相似性。

37.3 阈值之间, 描述是精确的

这一小节此前只在 Lean 中, 未进正文, 而后文 (第 34、40 节) 的整条论证都依赖它。

定理 37.4 (无阈值区间上内容不变). 若区间 $[t, t']$ 内没有任何阈值, 则活跃内容集合在其上恒等, 故 β 系数在其上是常数, 而有效描述在该区间上不是近似, 是精确。

Lean 出 处: `RG.active_eq_of_no_threshold`, `RG.beta_const_between_thresholds`, `RG.active_mono`, `Emergence.resolved_mono`

这把“有效场论要在每个能标换一套描述”从窘境变成结构。描述之所以要换, 不是因为不够好, 而是因为内容在阈值处真的变了; 而在两个阈值之间它一点都不近似。第 34 节接着证明没有最后一个阈值, 故这件事没有尽头——那不是方法的缺陷, 是理论在如实报告自己的结构。

定理 37.5 (内容只增不减). 更好的探针不会丢失结构: $t \leq t' \Rightarrow$ 活跃集合单调包含。故“在能量 E 上存在什么”至少是良序的——尽管第 49 节表明它在单点上不良定, 内容属于区间。

Lean 出处: `RG.active_mono`, `RG.active_eq_univ_of_ge`, `RG.active_finite_range`

37.4 有效场论塔是定理而非窘境

设激发 i 携带对数阈值 μ_i 。在对数能标 t 上可用的激发集合为 $\mathcal{A}(t) = \{i : \mu_i \leq t\}$ 。

定理 37.6 (EFT 塔). (i) 单调性: $t \leq t' \Rightarrow \mathcal{A}(t) \subseteq \mathcal{A}(t')$; 新物理只随标度升高而出现, 从不消失。 RG.active_mono

(ii) 阈值间恒定: 若 $(t, t']$ 中无阈值, 则 $\mathcal{A}(t) = \mathcal{A}(t')$ 。有效描述在阈值之间是精确的, 而非近似。 RG.active_eq_of_no_threshold

(iii) 有限性: 有限激发内容只给出有限多个不同的有效理论。 RG.active_finite_range

因此, “不同能标下必须更换理论框架” 不是有效场论的缺陷, 而是一个标度分层世界在如实报告自己的结构。

37.5 β 函数从哪里来

第 39 节把单圈系数 b 当作输入, 是从规范理论借来的。这一步可以往回推一层。

A5 说基准平移是几何的对称性而非描述的对称性: 耦合必须补偿。而需要被补偿的只能是实际在场的内容, 即活跃激发。所以补偿率只能是活跃集合的泛函, 别无依赖。

定理 37.7 (β 系数的形状). 设 β 系数为活跃内容的任意泛函 $\Phi(\mathcal{A}(t))$ 。则

(i) 阈值之间它恒定——那里的跑动精确是单系数的, 而非近似; RG.beta_const_between_thresholds

(ii) 它只取有限多个值, 故是一个阶梯函数, 跳变点恰在质量阈值上; RG.beta_finite_range

(iii) 越过全部阈值后它稳定到完整内容的值。 RG.beta_eq_of_all_active

QCD 的系数正是这样: 在每个夸克阈值处跳变。本框架定出了这个形状, 但**不定出数值**—— Φ 的具体形式 (如 $11N_c - 2N_f$) 仍是输入。这一步只把借来的东西从“一个数”缩小为“一个泛函”, 没有消灭它。

38 跑动不需要圈图

第 39 节假设了 $dg/dt = -bg^3$ 并从规范理论取来 b 。这是本报告最后一处大的借用, 值得问一句: 框架非借不可吗?

不必。放下“跑动来自求和图”的成见, 问耦合在这里是什么。处于对数标度 t 的探针有一个分辨率; 它响应它能分辨的缺陷, 而由第 31 节, 那些是带确定对数标度的离散对象。所以累积响应是一个**计数**。

再加上 A5: 标度协变的世界没有优待的对数标度, 故缺陷不能在任何地方聚集——它们每单位对数标度的密度是常数。常密度在 $[t_0, t]$ 上积分即线性。于是

$$g^{-2}(t) = g^{-2}(t_0) + \kappa\rho(t - t_0),$$

这正是单圈形式, 其中 $b = \kappa\rho/2$ 。

定理 38.1 (计数给出线性跑动). 累积响应在对数标度上的斜率恒为 $\kappa\rho$; 该式与单圈解形式相同, 系数被认成“每单位对数标度的缺陷密度 $\times$ 单缺陷响应”。

Lean 出处: `Running.hasDerivAt_invSqCoupling`, `Running.invSqCoupling_eq_one_loop`

定理 38.2 (渐近自由 $\iff$ 正的缺陷密度). 响应在高对数标度处趋零, 当且仅当可分辨的缺陷密度为正。分辨出越多结构, 响应被稀释得越厉害——这就是渐近自由在本框架下的物理内容, 陈述与证明中都没有出现规范群、没有 $11N_c - 2N_f$ 、也没有任何图。

Lean 出处: `Running.asympt_free_iff_pos_density`

线性对数跑动是标度不变的缺陷密度的推论, 不是单圈图的推论。借来的系数由此变成一个缺陷密度——一个计数, 而 $11N_c - 2N_f$ 本来也是一个计数。仍未导出的是密度的数值。

39 强相互作用：从无到有的一个标度

A5 说没有任何标度被优待, 理论完全无量纲。但强相互作用显然有标度——强子有确定的质量。若本框架无法交代这一点, 它恰恰在标度物理最难的地方失败。

它交代得了, 而机制正是标准模型中唯一纯粹关于标度的现象: **量纲嬗变 (dimensional transmutation)**。一个纯数耦合, 在 A5 的基准流下跑动, 会分泌出一个公理中根本不存在的不变标度 Λ 。标度不变性不是被强行破坏的, 而是被一个标度协变方程的解破坏的——在一个没有任何有量纲参数可供破缺的理论里, 这是唯一可能的破缺方式。

由单圈跑动 $dg/dt = -bg^3$ ($b > 0$) 出发:

定理 39.1 (跑动的精确解). $g^{-2}(t) = g^{-2}(0) + 2bt$. 未用任何微扰展开; 对给定流该式精确。

Lean 出处: `QCD.running_inv_sq`

定理 39.2 (渐近自由). $g \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \infty$: 强扇区在标度极小处变得自由。由 A3, 小标度即高能, 这正是所要求的行为。

Lean 出处: `QCD.asymptotic_freedom`

定理 39.3 (量纲嬗变).

$$\Lambda = \exp\left(t - \frac{g^{-2}(t)}{2b}\right)$$

沿流恒定。一个仅以纯数为输入的理论产生了一个标度, 而由 A5, 任何基准选择都无法移动它。

Lean 出处: `QCD.lambda_invariant`, `QCD.lambda_pos`

39.1 对谱的推论与检验

Λ 是强扇区唯一的标度。由 A3, 质量即逆标度, 故每个强子质量必是纯数乘 Λ 。

定理 39.4 (质量比无自由参数). 任意两个强子质量之比是两个纯数之比, 与 Λ 无关, 因而与理论的一切输入无关。

Lean 出处: `QCD.hadron_mass_ratio`, `QCD.spectrum_rigid`

这是本框架对强扇区最尖锐的预言, 也正是**胶球**是检验它的正确场所的原因: 胶球质量不含任何夸克质量, Λ 确实是唯一在场的标度。

39.2 与格点数据的正面对撞：一个失败

淬火格点 QCD 给出 (MeV): $0^{++} \approx 1710$ 、 $2^{++} \approx 2390$ 、 $0^{-+} \approx 2560$ 。第 31 节的缺陷机制预言等比塔, 即相邻质量比相等。检验:

$$\frac{2390}{1710} = 1.398, \quad \frac{2560}{2390} = 1.071.$$

定理 39.5 (最简等比塔被证伪). 两个相邻比值之差大于 0.3。横跨全部胶球态的单一等比塔被格点数据排除。

Lean 出处: `QCD.geometric_tower_fails, ratio1_value, ratio2_value`

这否定的是定理 31.5 所基于的质量律假设 (见第 51 节), 而非缺陷图景或框架本身。我们如实记录, 并已把结论削弱到它应有的强度。幸存下来的是两条较弱但仍可检验的陈述: (i) 塔可能只存在于固定 J^{PC} 通道之内; (ii) 定理 39.4 的无参数比值陈述完全未受影响。

作为待计算的目标: 取 $\Lambda \approx 332 \text{ MeV}$, 最轻胶球位于 $m/\Lambda \approx 5.15$ ——一个本框架最终必须算出而非拟合的纯数。

Lean 出处: `QCD.lightestGlueballInLambda_value`

40 广延的代价、转动是什么、以及为什么是三

三个问题, 而它们互相咬合。

40.1 标签泛滥是覆盖范围的代价, 不是结构的证据

值得认真对待的警告是: 标准模型的那套装置——色、代、弱同位旋、禁闭机制——可能根本不是结构, 而是把一个截面局部的描述广延到一段标度范围上时被迫写下的东西。这是可形式化的, 此处证明。

第 34 节说标度 t 处的内容是 $\{k \mid \mu_k \leq t\}$, 第 37 节说描述在阈值之间是精确的。故单一标度上有效的描述只需要该标度的内容; 而跨范围有效的描述必须携带在下端不可分辨的内容的标签。

定理 40.1 (跨越阈值即强制新标签). 范围内有任何阈值, 广延描述就必须携带局部描述不需要的标签; 而这个超出量随范围单调增长。反之, 不含阈值的范围代价为零。

Lean 出处: `Slice.newContent_nonempty_of_threshold, newContent_mono, newContent_empty_of_no_threshold`

定理 40.2 (没有在所有标度上都够用的标签集). 任何标度之上都还有未分辨的内容, 故任何固定标签集终将不足。在所有标度上都有效的形式体系并不存在, 而它的不存在是定理, 不是谁的巧思不够。

Lean 出处: `Slice.no_finite_universal_labelling, label_count_measures_range`

一个形式体系携带的标签数量, 度量的是它覆盖的对数范围, 不是物理的深度。用一套形式覆盖三十个 e-fold, 就必须为这三十个 e-fold 中任何地方出现过的东西备好标签, 而其中绝大多数在任一给定标度上并未实现。这恰是壳外内容、规范冗余、以及“只在虚过程中存在的物种”的形状。

这并不反驳标准模型。它说的是: 标准模型的标签数是关于它范围的证据, 而复现这个数目不是目标——这正是第 34 节主张过、本节证明了的事。

40.2 转动的原生量是楔积——而这打破了前面

框架自己的量很少：阈值、 $\mathbb{Z}/2$ 标签、整数荷、标度量值。转动不在其中，然而第 9 节生产它。它原生地是什么？

定理 10.2 已经回答：两个缩放生成的转动是 $v_i w_j - v_j w_i$ ，即它们方向的**楔积**。故转动标签在这里不是独立量子数——它是标度结构的函数，没有自由度。

定理 40.3 (楔积是真正的二形式，且平行时为零). 反称、双线性，且 $\text{wedge } v w = 0 \iff v \parallel w$ 。

Lean 出处: `Slice.wedge_eq_bracket`, `wedge_antisymm`, `wedge_bilinear_left`, `wedge_eq_zero_iff_parallel`

定理 40.4 (均匀花样不携带转动标签). $\text{wedge } v v = 0$: 一个矢量与自身的楔积为零。故**均匀** (不随位置变化的) 标度花样转动标签恒为零。

Lean 出处: `Slice.homogeneous_carries_no_rotation`, `rotation_requires_biaxial`

更正 (见第 12 节)。我原先把这条定理命名为“单轴不携带转动”并据此提出一个两难。那个读法是错的，在此撤回。定理讲的是一个矢量与自身的楔积，故它说的是**恒定**花样不生成转动；而“单轴”指标度只取一个不同的值，完全是另一回事。第 12 节表明转动由花样的变化携带，从而绕数缺陷必然带转动，且更多轴根本不可得。第 33 节的标签因此无需限缩。

40.3 为什么是三个空间方向

第 10 节导出了族而不是维数。这里是结构所能提供的唯一一条论证，连同它的确切强度。

A4 只提供一种标签：**方向**。第 29 节使一切可观测标签都是方向间的简并花样。第 9 节使一切转动都是两个方向的楔积。故缩放生成的转动当且仅当楔积空间与方向空间同维时才带有方向标签：

$$\dim \Lambda^2 \mathbb{R}^k = k \iff \frac{k(k-1)}{2} = k \iff k = 3.$$

定理 40.5 (三是唯一解). $k(k-1)/2 = k$ 的唯一正解是 $k = 3$ 。 $k > 3$ 时楔积严格多于方向，故有转动不带方向标签； $k < 3$ 时转动扇区退化。

Lean 出处: `Slice.wedge_dim_eq_iff`, `three_is_unique`, `more_wedges_than_directions`, `fewer_wedges_than_directions`

$k = 3$ 是耦合在公理所提供的标签上闭合的唯一维数，给出 $n = k + 1 = 4$ 。

注 40.6 (这有多强). 算术是定理。而承载物理的那一步——框架要求它生成的转动带方向标签，而不只是允许某些转动不带标签——是一个**判断**，与第 10 节的秩一认定同类。它被明写在外面并已登记，没有藏进任何证明。**有它**， $n = 4$ ； **没有它**， n 仍然自由。

值得一提的自洽： $k = 3$ 也正是 $\mathfrak{so}(3) \cong \mathfrak{su}(2)$ 、转动群获得双覆盖的地方——而那正是第 33 节 $\mathbb{Z}/2$ 的来源。**维数与那个标签同源**。

41 寿命的动量依赖： γ 就是两个标度之比

激发携带自己的时钟，其单位由静止能标 m 设定；实验室使用另一套单位，由总能量 $E = \sqrt{p^2 + m^2}$ 设定。寿命是内部“滴答”的纯数目；实验室报告的是同一数目在它的单位下

的读数，因此要乘以两个标度之比

$$\gamma = \frac{E}{m}.$$

定理 41.1 (寿命). 设 $m > 0$ 、 $\tau_0 \geq 0$ ， $\tau(p) = \gamma(p) \tau_0$ 。则

- (i) $\gamma \geq 1$ ，故 $\tau(p) \geq \tau_0$ ； Particles.one_le_scaleRatio
- (ii) $p^2 \leq q^2 \Rightarrow \tau(p) \leq \tau(q)$ ：寿命随动量单调增加； Particles.lifetime_mono
- (iii) $\tau(0) = \tau_0$ ：静止时两个标度重合，归一化无余项。 Particles.lifetime_at_rest

证明中没有使用任何关于衰变动力学的假设。时间膨胀在此不是“钟走慢了”，而是 A3 的标度比被读了两次。

42 暗物质：相互作用发生，观测失效

本节是两条路径中的第一条，而两条做出相反的预言。本节的低标度路径说：耦合小但非零，故足够匹配的探针终能看见，且这些对象有阈值，故有质量谱。第 48 节给出另一条——各向同性轨迹：在任何标度上都没有可耦合的标签，也没有阈值，故没有谱。哪一条是世界所用，是实验问题；框架容纳两者，它不做选择。

探测器本身是坐落在某个能标 ε_D 上的物理系统；由 A3，这也是它的空间分辨率的倒数。它能登记的不是“一次相互作用”，而是“一次把它自身状态推动了至少阈值 θ 的相互作用”。

定义 42.1. 单次激发的探测响应 $\det(\varepsilon, \varepsilon_D) = \varepsilon/\varepsilon_D$ ；引力响应 $\text{grav}(N, \varepsilon) = N\varepsilon$ （总能量，对能量如何分配是盲的）。

定理 42.2 (相互作用而不可观测). 对任意 $\varepsilon_D > 0$ 与任意阈值 $\theta > 0$ ，存在 $\varepsilon_0 > 0$ ，使得对一切 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ ，

$$0 < \det(\varepsilon, \varepsilon_D) < \theta.$$

即：耦合严格非零（相互作用确实发生），却严格低于阈值（观测必然失败）。

Lean 出处：Dark.detection_failure

定理 42.3 (暗物质). 对任意引力信号 $M > 0$ 、任意探测器标度 $\varepsilon_D > 0$ 、任意阈值 $\theta > 0$ ，存在标度 $\varepsilon > 0$ 与多重度 $N > 0$ ，使得

$$N\varepsilon = M \quad (\text{引力上完全可见}), \quad 0 < \frac{\varepsilon}{\varepsilon_D} < \theta \quad (\text{非引力上不可见}).$$

Lean 出处：Dark.dark_matter_exists

引力可见性与非引力不可见性因此并不冲突：它们是同一位形的两个不同泛函，而标度层级可以把二者拉开任意大的倍数。用户直觉中“超大号、能量极低的粒子”在此获得精确表述——关键不在于它是什么粒子，而在于探测器自身的能标远高于它，使得测量（而非相互作用）失效。

43 暗能量：耗散率就是 Λ

由 A6，宇宙不封闭，其能量标度耗散。由 A3，衰减的能量标度就是增长的长度标度。定义宇宙标度因子 $a := 1/\varepsilon$ （它不是独立场）。

定理 43.1 (耗散的历史唯一). 若 $\dot{\varepsilon} = -\lambda\varepsilon$ ，则

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 e^{-\lambda t}.$$

未假设任何拟设；指数形式是被强制的。

Lean 出处: `Cosmology.dissipation_solution`

定理 43.2 (耗散即膨胀，且加速). 设 $\lambda > 0$ 、 $\varepsilon_0 > 0$ 。则

$$a(t) = a_0 e^{\lambda t}, \quad \dot{a} = \lambda a \text{ (即 } H = \lambda \text{ 为常数)}, \quad \ddot{a} = \lambda^2 a > 0.$$

即精确的 de Sitter 膨胀，全程没有引入任何宇宙学常数。

Lean 出 处: `Cosmology.open_universe_accelerates, hasDerivAt_scaleFactor, hasDerivAt_hubble, acceleration_pos`

结论：所谓“暗能量”在此框架下不是具有负压的物质，而是开放宇宙的耗散率。观测到的加速膨胀是一个倒数的二阶导数， Λ 与 λ^2 同阶。把宇宙自身看作一个“因涨落而诞生、正在耗散的大粒子”，其数学内容恰是定理 43.1——与定理 37.3 的跑动方程同型。

44 时间箭头

基底中没有任何东西区分时间方向：微观动力学是双射。破缺来自观测发生在某个标度上，而标度携带有限分辨率，即一个从微观位形到可分辨对象的非单射映射。

设 X 有限， $\pi : X \rightarrow Y$ 为粗粒化， T 为 X 上的置换（可逆微观动力学）。定义饱和 $\text{sat}_\pi(S) = \{x : \pi x \in \pi(S)\}$ ，观测演化 $F(S) = \text{sat}_\pi(T(S))$ 。

定理 44.1 (H 定理). $|S| \leq |F(S)|$ ，对一切 S 成立。

Lean 出处: `Entropy.entropy_nondecreasing`

证明只用两步：微观步严格保持基数；粗粒化步只能变大。没有任何概率假设。

定理 44.2 (不可逆性). 设 F 满足 H 定理且在某个 S_0 上严格产熵 ($|S_0| < |F(S_0)|$)。则不存在同样满足 H 定理的 G 使 $G \circ F = \text{id}$ 。

Lean 出处: `Entropy.no_reverse_law, Entropy.evolve_no_reverse_law`

即：宏观方程无法被同类型的规律倒着跑。微观层面时间反演不变严格成立，宏观层面它被摧毁——这正是 Boltzmann 方程不具时间反演不变性的确切地位。

正反物质不对称。 我们只给出结构性结论，不宣称推出观测到的重子不对称度。Sakharov 第三条件是“偏离热平衡”。在封闭系统中这是精心安排的插曲；在 A6 之下宇宙永不停止耗散，因而该必要条件结构性地恒被满足：

命题 44.3. 若某荷量在一步演化中发生改变，则系统必不处于平衡 ($F(S) \neq S$)；严格产熵本身即构成偏离平衡。

Lean 出 处: `Entropy.charge_change_implies_nonequilibrium`, `Entropy.entropy_production_implies_nonequilibrium`

45 光：标度盲的类光锥

被测二次型是记账二次型乘以标度因子： $Q_g = s^2 Q_\delta$ 。由于 s 是单位元，乘以它既不能制造零也不能消灭零。

定理 45.1 (光对标度是盲的)。

$$Q_g(v) = 0 \iff Q_\delta(v) = 0.$$

类光锥由记账结构单独决定；任何标度场（即任何引力场）都无法改变哪些方向是类光的。两个使用任意不同标度场的观察者，对“何为类光”的判断完全一致。

Lean 出处: `Light.isNull_iff_bare`, `Light.isNull_scale_invariant`

定理 45.2 (物质不是盲的)。若 $Q_\delta(v)$ 是正则元（特别地， v 非类光），则由被测二次型可唯一确定 s^2 。

Lean 出处: `Light.scale_determined_of_nonnull`, `Light.physForm_ne_bareForm`

两条定理合起来给出本框架完整的认识论：

光确定共形（因果）结构，且仅此而已；标度必须用物质去读。

因此，光的数学本质是几何中权重为零的部分——A5 的基准平移作用于其上平凡的 (`Light.null_weight_zero`)，这正是“无质量”的形式内容。它的实在意义是：光是唯一路径对标度不敏感的探针，因而是唯一能够把局域单位的比较从一个事件无循环论证地传递到另一个事件的比较器。再结合定理 15.6（标度联络平坦），这种传递沿闭合回路无残差，理论自洽。

Part VIII

第八部分 预言与数据

46 可检验的预言

46.1 耗散指数与暗能量状态方程

把 A6 从 $\dot{\varepsilon} = -\lambda\varepsilon$ 推广为幂律 $\dot{\varepsilon} = -\lambda\varepsilon^q$ 。由 $a = 1/\varepsilon$ 得 $H = \lambda a^{1-q}$ ，故 $\rho \propto H^2 \propto a^{2(1-q)}$ ；与连续性方程 $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ 比较指数，得到

$$\boxed{w = \frac{2q - 5}{3}} \iff \boxed{q = \frac{3w + 5}{2}}$$

定理 46.1 (加速判据与状态方程). (i) $2\dot{\varepsilon}^2 - \varepsilon\ddot{\varepsilon} = \lambda^2\varepsilon^{2q}(2 - q)$ ，故 $\ddot{a} > 0 \iff q < 2$ 。
Predictions.powerlaw_accel_numerator, accelerates_iff

(ii) $w = -1 \iff q = 1$ (预言是尖锐的，不是通有的)。 Predictions.eos_eq_neg_one_iff

(iii) $w < -1/3 \iff q < 2$ ：与 (i) 的加速判据一致。 Predictions.eos_lt_third_iff

(iv) $w < -1$ (幻影区) $\iff q < 1$ 。 Predictions.eos_lt_neg_one_iff

(v) 反演公式是双向的： $w \mapsto q \mapsto w$ 恒等。 Predictions.eos_dissipationExponent

这是本框架最容易被杀死的地方，应当明说：

可证伪性. 纯指数耗散 ($q = 1$) 预言 $w = -1$ 精确成立，无任何可调参数。若观测确证 $w \neq -1$ ，则该情形被直接排除；此时理论并不崩塌，而是被数据测定：由 $q = (3w + 5)/2$ 读出耗散指数。例如观测给出 $w = -0.95$ ，则 $q = 1.075$ 。 Predictions.worked_inversion

46.2 代入常数：三项数值核对

以下公式由本框架给出，常数取 SI 定义值或 CODATA 值，算术由 norm_num 验证。

量	本框架公式	计算值	实验值
μ 子寿命	$\tau = \gamma\tau_0$	$64.432 \mu\text{s}$	$64.378 \pm 0.026 \mu\text{s}$
Pound-Rebka	$z = gh/c^2$	2.4551×10^{-15}	$(2.46 \pm 0.03) \times 10^{-15}$
暗能量密度	$\rho_\Lambda = 3\lambda^2/8\pi G$	5.845×10^{-27}	5.86×10^{-27}

- μ 子：CERN 储存环 $\gamma = 29.327$ 、 $\tau_0 = 2.19703 \mu\text{s}$ ，由定理 41.1 得 $\tau = 64.432 \mu\text{s}$ ，与测量符合到 10^{-3} 。 Predictions.muon_matches_experiment

- Pound-Rebka：由定理 18.1 的 $\varepsilon = e^\Phi$ 一阶展开， $h = 22.5 \text{ m}$ 处 $z = 2.4551 \times 10^{-15}$ 。 Predictions.poundRebka_value

- 暗能量：由定理 43.2， λ 即渐近 Hubble 率 $H_\infty = H_0\sqrt{\Omega_\Lambda} \approx 1.8077 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ ，代入 $\rho_\Lambda = 3\lambda^2/8\pi G$ 得 $5.845 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$ 。 Predictions.darkEnergyDensity_value

需要说明：前两项是核对而非新预言（框架落在已知物理的正确数值上）；第三项在 $\lambda \leftrightarrow H_\infty$ 的识别下带有一定循环性，其真正的预言内容是 $w = -1$ 这一形状，而非该数值本身。

46.3 反演公式

定理 46.2 (状态方程与耗散指数互为反演). $w = (2q-5)/3$, 故 $w = -1 \iff q = 1$; $w < -1/3$ (加速) $\iff q < 2$; $w < -1$ (幽灵) $\iff q < 1$. 给定 $w = -0.95$ 反演得 $q = 1.075$.

Lean 出处: `Predictions.eos_eq_neg_one_iff`, `eos_lt_third_iff`, `eos_lt_neg_one_iff`, `worked_inversion`, `accelerates_iff`

注 46.3 (全部数值对照见第 50 节). 本报告只保留一张数值总表, 在第 50 节。此处以及第 47 节曾各有一张部分重复的表, 已合并。

那里同时说明**这些数的地位并不相同**: 偏折、进动、 γ 是从公理链条导出的, 中间无假设; μ 子与 Pound-Rebka 是时间膨胀与红移的算术核对, 检验的是 A3 的读法; ρ_Λ 由 $\lambda = H_\infty$ 换算而来, 而 λ 本身是测量值——它正是那个唯一的自由数。

47 可检验的预言与换算表

第 34 节说该向框架索取的不是物种表而是**阈值结构**。本节索取它, 得到一个可以、并且已经与数据对撞的预言。

47.1 预言: 阈值是标度不变过程

A5 说没有哪个对数标度被优待。于是阈值不能在任何地方聚集: 它们由一个标度不变的过程放置, 即每单位对数标度速率恒为 ρ 的过程。常速率点过程的间距服从指数分布, 而指数分布的变异系数恰为一:

$$CV(\ln m \text{ 的相邻间距}) = 1.$$

这条预言是尖锐的, 而且能区分。等比塔——第 31 节曾假设、第 51 节已撤回的那个——间距相等, 故 $CV = 0$ 。两个假设相距不能再远。

定理 47.1 (等比塔的方差恒为零). 若每个间距都等于 c , 则总体方差恒等于零, 故 $CV = 0$, 没有任何自由度。

Lean 出处: `Spectrum.equal_gaps_variance_zero`

47.2 数据: 标准模型的十二个质量标度

取标准模型十二个互不相同的质量标度 (电子到顶夸克), 作 $\ln m$ 的十一个相邻间距:

	CV^2	CV
标度不变过程 (预言)	1	1
观测	0.875	0.935
等比塔	0	0

Lean 出处: `Spectrum.observed_cvSq_value`, `Spectrum.meanGap_value`

十一个间距的样本很小, 预言自身的抽样范围很宽—— CV 的中央 90% 从 0.58 到 1.28——而观测值 0.935 落在其第 63 百分位, 即正中间。

定理 47.2 (标准模型谱不是等比塔). 观测间距方差为正, 而等比塔方差恰为零。**这是比第 39 节胶球比值检验独立得多、也尖锐得多的一次否定**——它用的是整个观测谱, 而非三个

格点数字。

Lean 出处: `Spectrum.observed_not_geometric`, `Spectrum.observed_within_scale_invariant_range`

阈值密度由平均间距给出: $\rho = 1/\langle \text{gap} \rangle \approx 0.86$ 每 e 倍。

Lean 出处: `Spectrum.densityFromGaps_value`

注 47.3 (诚实的界限). 十一个间距是小样本, 且十二个质量标度是人工挑选的 (无质量态排除, 中微子质量未知)。与 $CV = 1$ 的符合是鼓励性的, 不是决定性的; **决定性的是对 $CV = 0$ 的排除。**

47.3 换算表

框架不预言标准模型的表, 但它说明任何一次测量在它自己的变量里是什么意思。以下每一条都把一个被测量换算为它所定住的框架参数。

被测量	框架参数	换算
暗能量状态方程 w	耗散指数 q	$q = (3w + 5)/2$
PPN 参数 γ	倒数条件	预言 $\gamma = 1$ (无自由参数)
渐近 Hubble 率 H_∞	耗散率 λ	$\lambda = H_\infty$, $\rho_\Lambda = 3\lambda^2/8\pi G$
Λ_{QCD}	嬗变标度	$\Lambda = \mu e^{-1/2bg^2}$ (沿流不变)
跑动系数跳变 Δb	新增可分辨内容 ΔN	$\Delta N = \Delta b/\kappa$
质量 m	阈值 μ	$\mu = \ln m$ (互为逆)
平均对数间距	阈值密度 ρ	$\rho = 1/\langle \text{gap} \rangle$

Lean 出 处: `Spectrum.thresholdOfMass`, `massOfThreshold`, `mass_threshold_inverse`, `qFromW`, `rhoLambdaFromLambda`, `deltaNFromDeltaB`, `densityFromGaps`, `density_gap_inverse`

47.4 对照表已并入第 50 节

此处原有一张数值对照表, 与第 46 节的表部分重复, 且其暗能量一行已过时 (它写作 “ $w = -1$ (若 $q = 1$) ……与 -1.03 ± 0.03 符合”; 而第 48 节此后证明 A5 强制 $q = 1$, 第 50 节则记录 DESI 给出 $2.8\text{--}4.2\sigma$ 的反向偏好)。全部数值对照现在只有一张表, 在第 50 节。

48 这个立场究竟预言什么

纲领现在的立场是: 标签是截面局部的, 内容是标度轴上的一个切面。这是一个强主张, 而它欠账的地方正是开发中最单薄之处——暗能量、开端、暗物质, 以及最尖锐的挑战: **共振峰**, 那是有位置、有宽度、有形状的实测对象。本节偿付能付的, 并标明付不了的。

48.1 耗散速率是常数, 故 w 不演化

第 43 节假设了恒定分数速率 λ 并由之导出精确 de Sitter。假设正是弱点: 没有任何东西挑出 λ 为常数, 故 $w = -1$ 是一种可能而非预言。

A5 提供了它。 设速率依赖于当前标度, $\lambda = \lambda(\sigma)$ 。A5 说全局基准平移 $\sigma \mapsto \sigma + c$ 不可观测, 而速率是可观测的——它就是 Hubble 率。故 $\lambda(\sigma + c) = \lambda(\sigma)$ 对一切 c 成立, 而在一切平移下不变的函数是常数。

$A5 \implies \lambda \text{ 恒定} \implies \text{精确 de Sitter} \implies w = -1 \text{ 且不跑动}$

Lean 出处: `Cosmos.shift_invariant_is_constant, rate_constant_of_fiducial_invariance, w_does_not_evolve`

这是本框架目前最尖锐的可检验陈述：暗能量状态方程的任何演化都证伪 A5。而 A5 是全局承重的——它正是使几何无量纲的那一条。这个预言不可调。

48.2 没有初值，而这是定理

若速率恒定，膨胀的初条件由什么定？框架的回答是：这个问题预设了 A5 所禁止的东西。

定理 48.1 (只有比值，没有起点)。标度因子只以比值进入观测，而比值只依赖于流逝的差；标度是单位故永不消失，历史可延伸到任何给定时刻之下而标度仍为正——没有第一时刻可供赋值；然而任何有限的流逝差给出有限比值，故观测到的历史是有限且可测的，而起点不存在。

Lean 出 处: `Cosmos.scale_ratio_depends_only_on_difference, no_first_moment, finite_lookback_no_origin`

宇宙没有年龄，它只有流逝的比值。

这不是回避：第 26 节早已证明标度不可退化，而第 55 节证明绝对标度不可表达。第一时刻就是一个绝对标度。

48.3 暗物质就是各向同性轨迹

第 42 节此前只有一条自洽陈述。第 13 节现在提供了解释。

定理 48.2 (各向同性但量值变化：只引力，无其他)。 $v(x) = f(x) \cdot u$ 的花样楔积恒为零，故不携带转动标签，从而（定理 13.3）无荷、无多重态；但 f 仍在变，故共形因子非常数，几何仍然弯曲。

Lean 出处: `Cosmos.isotropic_gravitates_without_labels`

无标签、无荷、无多重态——而仍然引力。

这就是暗物质的定义性质，是导出的而非拟合的。两条更尖锐的推论：

- 暗物质没有物种，也没有质量谱。标签是区分内容的东西，而各向同性区域没有标签，故不携带阈值结构。在某个确定质量上寻找峰的直接探测计划，找的是框架说不存在的东西。

Lean 出处: `Cosmos.dark_matter_has_no_species`

- 同一论证禁止电荷型自相互作用——这正是“无碰撞”的含义。

但这不是唯一的路径，我不该把它当作那个答案。第 42 节早已有另一条：能标远低于探针的内容——相互作用发生，探测响应消失。两者是不同机制，而且做出相反的预言，这比单一故事更好：

- 低标度路径：耦合小但非零，故足够匹配的探针终能看见；且这些对象有阈值，故有质量谱。

- 各向同性路径：在任何标度上都没有可耦合的标签，也没有阈值，故没有谱。

哪一条是世界所用，是实验问题。灵敏度提升下的持续零结果支持各向同性路径；任何谱特征支持低标度路径。框架容纳两者，它不做选择。

Lean 出处：Cosmos.two_dark_routes_differ

48.4 共振峰

最难的问题：若标签不实在，共振峰是什么？

共振就是阈值。第 34 节已把质量与标度轴上的位置等同，故峰的位置就是阈值。新内容是宽度。

第 37 节使描述在阈值之间精确；在阈值处它不精确，而那个过渡区的尺寸就是宽度。定它的是框架自己的不确定性定理：第 35.5 小节使标度平移精确非对易，而第 35 节把对易子变成不确定度乘积。故对数标度宽度与驻留时间共轭—— $\Gamma\tau \gtrsim 1$ ，**宽度-寿命关系，出自框架自己的代数而非引进。**

因 $\mu = \ln m$ ，对数标度上的宽度就是**相对宽度** Γ/m 。而阈值可被单独分辨，仅当它不与邻居重叠——实测阈值密度把这变成一条界：

定理 48.3 (可分辨性界). 两个阈值可被单独分辨，仅当其间距超过半宽之和；而平均间隔在对数标度上是 $1/\rho \approx 1.16$ ，故 $\Gamma/m \gtrsim 1.16$ 的结构根本不是单独的内容，它们是连续谱。

Lean 出 处：Cosmos.resolvable_needs_width_below_gap, broad_structures_unresolvable, resolvability_boundary

这是一条真预言，而且在别扭的方向上可证伪：一个窄的、无歧义的、良好分离的共振若其 Γ/m 超过该界，就与之矛盾。它同时预言最宽的那些已知结构恰是其“是否为独立态”存在争议的那些——事实如此。

注 48.4 (这不给什么). 不给耦合常数、不给分宽度、不给产生截面、不给“阈值有宽度”之外的任何线型。**框架说共振是什么，并界定它何时算一个共振；它不计算一个共振。**

注 48.5 (仍然单薄之处). 微观扇区的数值。 $\hbar$ 作为标度步长、曲率作为对易子仍是结构而非数值。但“定量引力链条跑在交换扇区上”这一条已由第 36 节关闭。

49 框架自己的问题

此前的一切都在回答别处提出的问题——它给不给 Schwarzschild、给不给引力子、给不给面积律。那是正确的第一个检验，而它已经跑过了。但那不是正确的最后一个检验：**建立在不同原语上的框架，应当能问出别人问不出的东西，而那些问题正是它要么挣得存在理由、要么被揭穿为一次改写的地方。**

原语只有几个：作为单位的标度、作为单个矢量的花样、单一漂移、楔积、阈值密度、各向同 / 异性二分、一个对易子。以下逐个追问它们要求知道什么。

49.1 分离不是原语，非平行才是

这里没有空间，只有标度。故“两个地方”不能被假设，**它必须被构造**，而唯一可用的构造是楔积。

定理 49.1 (平行的花样不是两个地方). 若两个标度花样平行, 则**没有任何标签区分它们**——无转动, 故无荷, 故什么也没有。而实际存在的分离是**有向的**: 交换二者即反号。

Lean 出处: `Native.not_two_places_of_parallel, separation_is_oriented`

框架自己的图像: 广延不是一个供区域安放其中的容器。两个区域相互区分的程度, 恰是其标度花样偏离平行的程度; 而**完全均匀的区域没有任何内部结构, 连广延都没有**。距离是“非平行度”的一个导出量度。

这引出的问题: 如果不是距离, 那么度量分离程度的观测量是什么? 候选是楔积, 而它反称——故框架自己的分离是一个**有向面积, 不是长度**。标准词汇里没有这样的东西。

49.2 只有一个开关, 不是每种相互作用一个

定理 13.3 说各向同性轨迹上无转动标签、无荷、无多重态、无曲率。它们不是四件恰好一起消失的事——它们同源, 故**只有一个开关**。

第一次各向异性之下什么都没有标签; 之上一切标签同时出现。其后的结构是简并花样的细化 (定理 14.7), **不是第二次开启**。

Lean 出处: `Native.single_anisotropy_boundary, label_forces_anisotropy`

框架自己的问题, 而且很尖锐: 标准图景中, 不同相互作用在不同标度上变得可分。此处只有一个边界, 其后皆为细化。于是: **是否存在某个标签, 其出现不是对既有各向异性花样的细化**? 一次真正独立的开启就会证伪它。这个问题没人问, 因为没有别人有一个“单一开关”需要辩护。

49.3 内容属于区间, 从不属于标度

定理 49.2 (零宽窗口什么也分辨不出). 且任何内容都要求一个阈值严格落在正宽度窗口之内。

Lean 出处: `Native.zero_window_resolves_nothing, content_is_interval_valued`

故“在能量 E 上存在什么”在这里是不良定的问句。存在的东西是一个标度区间的性质, 标度轴上的一个点不携带任何内容。

框架自己的互补性: 标度的锐利与内容的丰富互相对立。完全锐利的标度分辨不出任何东西; 分辨 N 个结构至少要花 N/ρ 的窗口。这不是海森堡的移植——此处的共轭对是**标度锐利度对内容计数**, 而定理 48.3 的共振宽度界是同一陈述的另一面。

问题: 使单个结构无歧义的最小窗口是多少? $1/\rho$ ——这正是可分辨性边界所在之处的原因。

49.4 没有全局场方程, 而 A6 是原因

定理 14.3 证明: 场方程可被写下, 仅当其源满足循环守恒律。而 A6 说宇宙耗散——**全局源不守恒**。

定理 49.3 (没有全局场方程). 不守恒的源不容许任何场方程。故**整个宇宙没有场方程**。局域的仍然存在 (第 25 节证明局域协变性挺过全局耗散)。宇宙学因此不是“带边界条件全局求解场方程”——**没有全局的东西可解**。

Lean 出处: `Native.no_global_field_equation`

框架自己的问题：若无全局方程，是什么定住了大尺度历史？可用的答案是 A5（定理 13.1 所在小节的常速率结果）——那是一个对称性，不是一条动力学定律。

大尺度历史由“什么不可观测”定住，而不是由“什么在演化”定住。

这够不够，是开放问题，而它不是广义相对论提得出的问题。

49.5 量子引力实验是一次“次序检验”

定理 36.1 使全部量子修正就是标度梯度的对易子。而对易子是一个次序差，故原生实验不是“探测引力子”，而是：

沿两个方向比较标度，以两种次序各做一次，看是否有差异。

两次序之差恰为 $-2[\sigma_i, \sigma_j]$ ，那就是几何的全部量子内容。无需测别的，也无需任何粒子存在。

Lean 出处：Native.ordering_discrepancy_is_the_observable

框架自己的问题：“沿一个方向比较标度”由什么物理程序实现？标度比较是局域单位之比，故程序是一次双臂比较——而框架说两臂以相反次序遍历会相差一个对易子。量级由标度步长定，远低于现有一切，这一点被明说而非隐藏；原生的是观测量是一个次序，而不是一个振幅、也不是一个量子。

49.6 缺陷成对出现，且宇称相同

定理 49.4 (宇称守恒，作为算术)。 $\mathbb{Z}/2$ 标签相乘，且每个元素是自身的逆，故绑定两个同宇称缺陷得到偶。整数荷同样恒等守恒。

Lean 出处：Native.parity_conserved_under_binding, both_labels_conserved

框架自己的选择定则：缺陷成对产生与湮灭，且宇称相同，没有自由参数，没有耦合常数。它不是加在拉氏量上的对称性——这里没有拉氏量——它是 $\mathbb{Z}/2$ 中的算术。

问题：有没有任何过程改变总宇称？框架说绝对没有，而这比“由假设的对称性导出的选择定则”更干净，因为没有东西可供破缺。

49.7 没有最大密度

定理 49.5 (标度之比是单位：永不为零、永不为无穷、但量值无界)。物质在此就是标度的各向异性，故没有最大物质密度、没有 Planck 密度，也没有任何标度使描述必须被另一类东西取代。这是定理 27.6 从物质一侧看到的同一件事。

Lean 出处：Native.no_maximum_anisotropy, no_cutoff_either_end

49.8 这七条的共同点

没有一条是翻译。每一条都来自标准词汇所没有的一个原语：作为单位的标度 (VII)、作为单个矢量的花样 (I)、阈值密度 (III)、单一二分 (II)、不守恒的全局源 (IV)、对易子而非场 (V)、以及作为算术而非对称性的 $\mathbb{Z}/2$ (VI)。

注 49.6 (诚实的状态)。七条之中，II 与 VI 原则上现在可检验；III 已通过共振宽度界被检验；VII 只能由其逆否命题检验；而 I、IV、V 是概念性主张，目前没有任何测量。没有一条是对某个数值的预言。

50 与数据对质

预言已经列出；本节把它们带到测量面前。其中一条有麻烦，而且是最承重的那一条，故先说它。

50.1 w 不演化——这与 DESI 有张力

定理 13.1 所在小节由 A5 导出恒定耗散速率，故 $w = -1$ 精确且每个时期皆然。A5 不是框架中可调的部分：它正是使几何无量纲的那一条，故此预言无法软化。

DESI DR2 (2025) 把 BAO 与 CMB 及超新星联合，对演化状态方程的偏好达到

$$3.1\sigma / 2.8\sigma / 3.8\sigma / 4.2\sigma$$

(分别对应 CMB、Pantheon⁺、Union3、DESY5)，落在 $w_0 > -1$ 、 $w_a < 0$ 的象限， w 在 $z \approx 0.5$ 附近穿越 -1 。

这是本框架最严重的经验问题，我不打算把它解释掉。三件事同时为真，三件都该说：

- DESI BAO 单独与 Λ CDM 完全自洽。张力只存在于联合中，而各联合彼此不一致：BAO+CMB 给出 $w_0 \approx -0.42 \pm 0.21$ ，BAO+CMB+SN 给出 $w_0 \approx -0.838$ ——同一参数上相差两个标准差；
- 偏好在最弱与最强超新星编目之间恰好差 1.5 倍；
- 独立分析指出这些数据集相互不自洽，而产生信号的正是那一步联合；
- 若该偏好在数据集自洽的前提下达到 5σ ，A5 被证伪，连同整个开发所依赖的无量纲性一起。不存在带演化 w 的本框架版本。

Lean 出 处：Data.desi_tension_exceeds_three_sigma, desi_significance_dataset_dependent, falsification_threshold

50.2 共振宽度界——两个旗舰确定值分居两侧

对本节前一版本的更正。我曾把 $f_0(500)$ 极点引作 $457 - i279$ ，得 $\Gamma/m = 1.22$ ，并报告该界被违反。279 不是两个标准确定值中的任何一个。正确的两个是：

方法	极点	Γ/m
CCL (Bern, Roy 方程 + ChPT 输入)	$441 - i272$	1.234 界外
GKPY (Madrid, 一次减除, 纯 $\pi\pi$ 数据)	$457 - i249$	1.090 界内
GKPY 更新收敛	$(445-450) - i(220-245)$	0.978-1.101 全界内

定理 50.1 (界恰落在两个旗舰确定值之间)。1.090 < 1.157 < 1.234，而更新后的 Madrid 值全部在界内。

Lean 出 处：Data.ccl_above_bound, gkpy_below_bound, determinations_straddle_bound, gkpy_updated_inside

故该界目前并未被违反。它坐落在介子表中最有争议的共振的最佳确定值的分辨极限上，而两种方法对真极点在界的哪一侧意见相左。框架因此对一个具体的实测数值作出一条活的、可证伪的、当前开放的主张：

$f_0(500)$ 极点满足 $\Gamma/m < 1.157$ ——框架站在一次减除的确定值一边，反对 Roy 方程加 ChPT 的那个。

谱的其余部分远在界内： W, Z, t, H 为 10^{-5} – 0.03 ； $\Delta(1232)$ 、 $N(1440)$ 为 0.10 、 0.15 ； $\rho(770)$ 为 0.19 ； $f_0(1370)$ 为 0.26 ； $K_0^*(700)$ 极点为 0.86 。界仍然落在两个最宽态之间，这正是它是检验而非描述的原因。

Lean 出处：Data.bound_separates_kappa_from_sigma

而 Breit-Wigner 范围对检验依然无用：PDG 引用 $m \in [400, 800]$ 、 $\Gamma \in [100, 800]$ ，使 Γ/m 从 0.125 跨到 2 。故陈述必须读在极点上，现在也确实如此。

Lean 出处：Data.breit_wigner_spans_the_bound

注 50.2 (一条观察，作为观察而非推导给出)。文献中有一支把 $f_0(500)$ 读作标度不变性破缺的赝 Goldstone 玻色子——一个膨胀子。本框架没有任何“其激发是粒子”的场，而标度不是这样的场，故它不预言存在膨胀子态；它预言的是：任何扮演该角色的东西恰好坐在可分辨性边界上，既不明确是态、也不明确是连续谱。 $f_0(500)$ 正在那里。有启发性；此处不推导任何东西。

50.3 光子无色散——通过，而且在分道

定理 27.3 预言恰好为零的色散，即 $E_{\text{QG}} = \infty$ 。Fermi-LAT 对 GRB 090510 的飞行时间给出 $E_{\text{QG},1} \gtrsim 7.6 E_{\text{Pl}}$ (总色散)、 $\gtrsim 2 E_{\text{Pl}}$ (LIV 诱导)，近期分析要求 $E_{\text{QG},1} \gtrsim 1.2 \times 10^{19} \text{ GeV} \approx E_{\text{Pl}}$ 。2024 年一项谱延迟研究给出后验最大值 $E_{\text{QG}} \approx 9 \times 10^{14} \text{ GeV}$ ，但报告数据与精确 Lorentz 不变性相容。

限已经在 Planck 能量之上，而那正是最小长度纲领一般安置该效应之处。每一次收紧都朝本框架靠、朝对手离。这是框架目前最干净的活判别式，而它正在赢。

Lean 出处：Data.dispersion_limit_above_planck, framework_predicts_no_finite_scale

50.4 恰好一个非禁闭精确守恒荷——而无中微子双贝塔衰变裁决它

第 33 节给缺陷恰好一个整数荷，非禁闭且精确守恒。自然界的候选是电荷与 $B - L$ 。而 $B - L$ 在标准模型中精确守恒 (含非微扰)，故表面上有两个，这是框架不允许的。

这不是僵局：无中微子双贝塔衰变把 $B - L$ 破坏两个单位。于是

- 观测到 $0\nu\beta\beta \Rightarrow B - L$ 不守恒 $\Rightarrow$ 电荷是唯一的非禁闭精确守恒整数荷 $\Rightarrow$ 框架的计数正确；
- 排除到 $B - L$ 看起来精确且被规范化 $\Rightarrow$ 有两个 $\Rightarrow$ 框架的计数错误。

Lean 出处：Data.one_charge_prediction, zero_nu_beta_beta_decides

这是一个正在进行的实验 (KamLAND-Zen、LEGEND、nEXO)，而框架关心它的结果，出于一个别人没有的理由。

50.5 总表：全部数值与全部预言

本报告只有这一张数值表。第 46 与 47 节原各有一张部分重复的表，已并入此处。

量	本框架	实测	状态
从公理链条导出，中间无假设（第四部分）			
掠日光线偏折	1.7515''	$1.7509 \pm 0.0002''$	符合 0.04%
水星近日点进动	42.99''/ 世纪	$42.98 \pm 0.04''$	符合
PPN γ	1（精确）	$ \gamma - 1 \lesssim 2 \times 10^{-5}$	符合
A3 读法的算术核对，非独立预言			
μ 子飞行寿命	64.43 μ s	64.378 ± 0.026	符合 10^{-3}
Pound–Rebka	2.455×10^{-15}	$(2.46 \pm 0.03) \times 10^{-15}$	符合
换算而来； λ 本身是测量值，即那个唯一的自由数			
暗能量密度	5.845×10^{-27}	$5.86 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$	符合
当前活的检验			
w 不演化（A5 强制）	$w = -1$ ，不跑动	DESI: $w_0 > -1, w_a < 0$	张力 $2.8\text{--}4.2\sigma$
$f_0(500)$ 极点 Γ/m	< 1.157	CCL 1.234 / GKPY 1.090	开放
光子能量依赖时延	恰为零	$E_{\text{QG}} \gtrsim 7.6 E_{\text{Pl}}$	通过，且与对手分道
引力波速	精确 c ，无色散	$ \Delta v/v \lesssim 10^{-15}$	通过
引力波偏振数	恰为 2，无呼吸模	网络偏振检验	通过（与标量–张量分道）
偶极辐射	恒等于 0	双脉冲星 $< 1.3 \times 10^{-4}$	通过
铃宕回波	反射率 $\neq 0$	搜索零结果	开放，受压
质量谱 CV^2	< 1 （秩一）	0.875	通过
非禁闭精确守恒荷	恰一个	电荷、 $B\text{--}L$ （两个？）	未决， $0\nu\beta\beta$ 裁决
黑洞熵	$\propto \ln R$	——	未测（面积律亦未测）
框架内部被排除的选项——最有信息量的部分			
等比质量塔	$\text{CV} = 0$	0.935	排除
各向同性扇区偏折	0.8758''	1.7509''	排除（2 倍）
各向同性扇区进动	14.33''	42.98''	排除（3 倍）
色 = 块荷	$\mathbb{Z}/2$ （两值）	需要三值	排除（结构不可能）

一条活张力、一个活的开放问题，都不致命——而这两个扇区正在被测量。最后四行是本体体系拒绝掉的东西，它们比符合的那些更有信息量，因为它们说明这套体系确实会拒绝。

关于电荷检验的时间尺度：即便建立在跷跷板机制上的轻子数破坏模型，所预言的 $0\nu\beta\beta$ 半衰期也远高于现有实验的排除范围。这是一个真实但引信很长的检验，“正在进行”不应被读作“即将报告”。

Lean 出处：Data.scorecard

Part IX

第九部分 登记册：撤回、更正、与边界

以下各节不是结果，是记录。它们此前被放在结果部分，那是错的呈现——色荷的识别已被撤回、余维数分析描述的不是本框架、跨扇区检验并不存在、表达力那节的结论被耦合推翻。它们的定理仍然成立且仍被审计，但它们所支持的解读不再成立，故迁到此处。

一个没有撤回记录的开发，是一个没有被审计的开发。

51 自我审查：已发现的思维污染

本节是对整个体系的一次不设辩护的复查，按“基础建构”与“目标问题”两条线。发现的问题分三类：已修复、须撤回、仍存在。第三类未被修复，只被登记。

51.1 须撤回：质量塔曾被当作结论，其实是假设

第 31 节写下 $m_k = m_0 e^{|k|\Delta}$ ，并说它由 A3（质量即逆标度）加“每单位绕数跨一个周期”得出。第 39 节据此检验格点胶球比值，报告被证伪。

复查发现证伪打错了靶。框架真正确立的关于缺陷的性质是拓扑的：绕数是整数、可加、不能连续改变、 $|k|$ 在取向反转下不变。而质量律额外需要的是动力学的：绕数为 k 的缺陷使标度场应变多少——本报告没有任何定理涉及这件事。

定理 51.1 (拓扑不决定质量律). 存在两个真正不同的质量律——指数塔与二次律——都满足关于绕数已证明的全部性质（正性、 $k = 0$ 处归一、取向反转不变）。

Lean 出处: `MassAudit.mass_law_underdetermined`, `MassAudit.both_laws_antiparticle_degenerate`

撤回. 几何质量塔从预言降格为假设。定理 39.5 的胶球检验因此否定的是那个假设，不是缺陷图景、也不是框架——这比上一版报告的结论弱得多，本节存在的目的就是让较弱的那个成为记录在案的版本。

幸存者：粒子—反粒子质量简并（只依赖 $|k|$ ，定理 31.4）；无参数质量比（不用任何质量律，定理 39.4）。

51.2 已修复：光是标度盲的，红移却要靠光

第 45 节证明类光锥标度盲；第 25 节证明宇宙漂移局域完全不可观测。那么膨胀究竟怎么被看见？答案本应是红移——由光携带。但光若对标度是盲的，它就无法携带标度的记录。

两条都被证明，故都为真，“矛盾”意味着有东西被混同了。确实有。

类光矢量没有长度，但有能量——而能量不是矢量的属性。它是矢量与观察者的配对，而观察者由物质构成，物质按定理 45.2 确实携带标度。

定理 51.2 (红移属于观察者，不属于光). 类光方向可以携带非零能量；且两个局域单位为 u_1, u_2 的观察者对同一类光方向给出的能量之比是 $(u_1/u_2)^2$ ——光对这个比值没有贡献，全部来自两个局域单位之差。

Lean 出处: `Observation.null_has_energy`, `Observation.redshift_is_scale_ratio`

这同时化解了第二处张力：A5 说全局基准平移不可观测，A6 说宇宙耗散。红移测量并不是对漂移的局域测量，而是比较发射时与吸收时的标度——那是一个标度差，正是 A5 判为物理的量。宇宙学观测到的恰好是公理允许的那个量，不多不少。

Lean 出处：Observation.redshift_fiducial_invariant

51.3 登记册（一）：已撤回的主张

以下四条曾被作为结论提出，现已收回。其定理仍成立且仍被审计，被收回的是解读。

1. **几何质量塔**。 $m_k = m_0 e^{|k|\Delta}$ 是假设而非推论（本节上文）。定理 39.5 的胶球检验否定的是那个假设。第 34 节此后说明了为什么不存在这样一条律：质量不是缺陷带着的属性，而是它在标度轴上出现的位置。
2. **色的识别**。第 52 节导出的有限禁闭荷不是色。第 33 节表明块群只能是 $\mathbb{Z}/2$ ——序参量是射影的——故三值从来不在供给里。这不是缺口，是被解释了的结构不可能。
3. **跨扇区检验**。第 56 节：谱的 ρ 与跑动的 ρ 不是同一个量（一个是原始计数，一个是扇区受限且带符号的）。
4. **余维数分析**。第 54 节的定理对圆值标度成立，但那不是本框架：方向性 A4 下序参量是无取向轴，点缺陷回来了（第 30 节）。

51.4 登记册（二）：已限缩适用域的主张

定理成立，当初的解读过宽。

1. “对易导子是隐藏的平直性假设”——撤回。把导子全部杀死，曲率原封不动（定理 14.1）。一张图就是一张图；平直性住在联络对不对易里。
2. “方向就是代数， n 是代数维数”——撤回。 $\dim \mathfrak{so}(3,1) = 6 \neq 4$ 。方向是代数所作用的定义表示（定理 11.1）。什么也没丢：定名代数仍然定住 $n = k + 1$ 。
3. “多重态内部平直”——解读撤回。其前提按方向指派缩放算子，而实秩一只提供一个矢量、一个缩放（第 12 节）。
4. “单轴不携带转动”——定理讲的是均匀花样。由此产生的两难随之消解（第 12 节）。这一条挺过了一次形式化与一版报告才被抓住。
5. “标度路与转动路互相独立”——推翻。那是对标量扇区的分析；方向性标度下转动扇区由标度扇区生成（第 9 节）。
6. “ $f_0(500)$ 违反宽度界”——更正。此前引用的极点虚部不是任何一个标准确定值。以真值计，界落在 CCL 与 GKPY 之间：开放，未被违反（第 50 节）。

上列六条中有五条是同一个错误：在结构是方向性的地方用标量推理。它出现在第 16（几何）、30（缺陷）、9（地基——“比值可交换”是标量的说法）、7（平直性解读）、40（单轴解读）节。

抓住它的判据：凡是提到一个计数——一根轴、一个标度、一个方向、一个值——就问是什么的计数。值与方向每一次都会分开。

51.5 登记册 (三): 已解决的项目

以下曾在本清单上, 现已关闭。列出是为了让读者能核对, 而不是为了记功。

曾登记的问题	现状	由何关闭
δ 是被公设的平直度规	已导出	$\kappa(x, y) = \tau(xy)$, 仅需一个迹 (§6)
号差 η 是输入	已导出	漂移区分出恰好一个方向 (§5)
n 是独立输入	不再是	代数定名后 $n = k + 1$ (§11)
$k = 3$ 依赖一个判断	已扶正为 A7	公开的第七条公理 (§13)
单轴 / 双轴两难	已消解	误读所致; 更多轴不可得 (§12)
基本激发形态未定	已澄清	射影序参量给出整数荷点缺陷 (§30)
交叉积未完整构造	结构部分已解决	实秩一使作用群为 $\mathbb{R}$ (§10)
定量引力跑在交换扇区	已关闭	非交换曲率 (§36)
耗散率 λ 是否恒定	已定	A5 强制它恒定 (§48)
两路独立故无跨扇区检验	前提被推翻	耦合被词义强制 (§9)

注意 “ $k = 3$ 已扶正为 A7” 不是一次解决, 是一次降级。它从 “几乎已导出” 变成公开的公理, 读者可以拒绝它并得到别的 k 。

51.6 登记册 (四): 仍然开放

以下没有被解决, 只被登记。

- $a = 1/\varepsilon$ 是识别, 不是导出。把宇宙学标度因子认作逆能标是一个物理假设。de Sitter 的数学 (定理 43.2) 无懈可击, 但它依赖这个识别。
- 标度花样是输入。哪些方向简并、简并到什么程度, 框架不预言。第 29 节的全部规范结论都是给定花样的函数。
- 阈值密度 ρ 的数值是测量的。第 47 节预言的是离散度 (CV), 不是密度; 第 11 节的 $\rho\alpha = k - 1$ 是换算而非预言。
- 暗物质: 两条路径, 框架不选。第 42 节的低标度路径证明的是相容性而非解释; 第 48 节 的各向同性路径是一条导出, 但两者预言相反 (有谱 / 无谱), 哪条为真是实验问题。
- 球对称拟设本身是输入。第 20 节已对各向异性度规 $-A(r)\partial t^2 + B(r)\partial r^2 + r^2\partial\Omega^2$ 逐分量算出 Ricci ($A \neq B$ 正是各向异性), 而 “真空方程 $\Rightarrow$ 标度和为常数” 也已形式化 (定理 19.2)。此前本条写作 “逐分量计算未做”, 那是 RicciDiag.lean 写出之前的旧登记, 已更正。仍是输入的是静态球对称拟设的选取本身, 以及标度响应律 A6’。
- 铃宕的边界条件与回波振幅。这是波动扇区里唯一一处本框架与广义相对论可能分开的地方 (第 28 节): 没有视界就没有 “在视界上纯内向” 这个边界条件, 而部分反射一般产生晚期回波。框架说反射率不为零, 但不预言振幅——那由那一个自由单位决定。而回波搜索目前是零结果。登记为开放且在受压。
不登记为缺口的: 波形、辐射功率、后 Newton 修正、数值相对论。在各向同性扇区 SCD 的场方程与 GR 相同 ($\gamma = 1$, 同一个 κ), 故把它们算出来只会复现 GR, 学不到关于 SCD 的任何东西。力气应当花在两者分开的地方。
- 微观扇区的数值等价于那一个自由单位。措辞需要精确: 框架给出量子修正的形式 $([\sigma_i, \sigma_j])$ 、对称性 (纯反对称) 与标度 (相对经典项为一个标度步长)。一旦任何一次测量

把那个单位定住，量级就随之定住——所以这不是一处独立的缺口，而是“唯一一个自由数”的又一次现身（第 11 节）。真正缺的是**散射振幅**：它需要固定内容的渐近态，而第 34 节说没有哪个标度携带完整清单。

51.7 登记册（五）：引用而未证，与登记的假设

引用（2 条）。若引用有误，其上的约束仍成立，只是识别不成立。

1. 实秩一实单李代数的分类 ($\mathfrak{so}(n, 1)$ 、 $\mathfrak{su}(n, 1)$ 、 $\mathfrak{sp}(n, 1)$ 、 $\mathfrak{f}_{4(-20)}$)。秩 = 1 本身是被证明的；清单的穷尽性不是。
2. 射影空间的同伦： $\pi_1(\mathbb{RP}^n) = \mathbb{Z}/2$ 、 $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$ 、以及李群模离散子群的 π_2 为零。

假设（2 条）。

1. 缺陷在对称空间体积中**均匀分布**——第 11 节的 $\rho\alpha = k - 1$ 换算需要它，无定理提供。
2. **A7 本身**——关于什么算一次观测的承诺，已扶正为公理而非留作判断。

51.8 审查方法本身

值得记录的是，本轮两处最有价值的修正都来自同一个动作：**发现被借走的是“问题”而不是“答案”**。“要不要无挠条件”预设了标架与联络是独立场；“该选哪个规范群”预设了存在一个内禀空间。换掉问句，答案自己就出来了（第 17、29 节）。本节登记的六条“仍存在”，很可能也各自藏着一个同类的问句。

52 （已撤回的解读）块单值性、禁闭与分数电荷

本节的定理成立，本节的解读已被撤回。

下面导出的“绕数 + 块置换”这对单值性数据是对的，禁闭与分数电荷的结论在它自己的假设下也是对的。被撤回的是把这个有限荷读作**色**。

而“它给出 2 而数据要 3，这是一个缺口”这个后续说法同样已过时。第 33 节证明：序参量是射影的，故块群只能是 $\mathbb{Z}/2$ ，**3 从来就不在供给里**。这不是缺口，是被解释了的结构不可能——色不是这个量子数，而且没有任何修补能让它是。

保留本节，是因为它的数学仍被审计，而撤回记录与结论同样重要。**请勿把以下内容当作本框架的现行主张**。

第 31 节只给了缺陷一个整数：标度绕它的绕数。那是不完整的。若缺陷位于一个简并块中——一组携带相同局域单位的方向——则绕它一周时，标度不仅会平移，块内标号也可能被置换，因为块内的标号本来就不是物理的（定理 29.2）。

所以缺陷的单值性数据是一对：一个绕数和一个块置换。这里没有从规范理论抄任何东西；置换是被“简并块没有优先标号”这一事实逼出来的。

以下全部来自一个问题：这样的位形何时是整体自洽的——标号在绕行一周后是否闭合。

定理 52.1 (禁闭)。其单值性真正置换了块的缺陷，**不可能单独存在**。这不是“力随距离增长”，而是孤立位形根本不是单值的，因而那里并没有一个东西可供分离。

Lean 出处：Color.BlockMonodromy.confinement

定理 52.2 (束缚态大小即块大小). k 个拷贝闭合当且仅当 $\pi^k = 1$ 。对一个把大小为 n 的块循环一次的缺陷, 最小自洽的组分数恰为 n 。**重子数就是块大小**, 不是额外的量子数。

Lean 出处: `Color.BlockMonodromy.bound_state_size`

定理 52.3 (介子无需解释; 不存在部分强子). 缺陷与其反缺陷总是闭合, 对 n 无任何条件; 而少于 n 个组分永不闭合。取 $n = 3$: 一个组分不可观测, 两个不可观测, 三个可观测。“没有双夸克强子”不是一条附加规则。

Lean 出处: `Color.BlockMonodromy.pair_observable`, `Color.BlockMonodromy.no_partial_state`

定理 52.4 (电荷成 $1/n$)。束缚态电荷是单个组分的 n 倍:

$$Q(\text{束缚态}) = n \cdot Q(\text{组分}), \quad Q(\text{组分}) = \frac{1}{n} Q(\text{束缚态}).$$

可观测态的电荷必为整数 (它是可观测态的电荷), 故组分电荷落在 $\frac{1}{n}\mathbb{Z}$ 中。

Lean 出 处: `Color.BlockMonodromy.constituent_charge_fraction`, `constituent_charge_rat`, `bound_charge_divisible`

取 $n = 3$ 即观测到的花样: 每个束缚态三个组分、单个组分不可观测、电荷成三分之一。**框架并没有把 3 放进去**——它放进去的是“一个大小为 n 的简并块”, 取出来的是“ n 个组分”与“ $1/n$ 电荷”。

必须明说: **自然界为何选了 $n = 3$, 本报告没有导出**。那需要把标度花样本身导出来。

53 审查: 色荷的块不是空间的块

第 30 节靠“序参量是无取向轴”让点缺陷回来, 而那要求**单轴**花样: 一个方向被挑出, 其余简并。在三维空间中, 简并的那部分恰有**两个**成员。

第 52 节则证明: 块大小为 n 时束缚态有 n 个组分、电荷成 $1/n$ 。

把两者放在一起, 很诱人做一个认同: 色荷的块就是空间简并块。那会是个漂亮结果——色将成为几何的推论而非输入。

它是错的, 本节记录原因。

三维中的单轴块大小为二。于是该认同预言**两组分**束缚态与**二分之一**电荷。而重子有三个组分, 夸克电荷成三分之一。该认同因此被排除——不是被削弱, 是被排除, 而且差得不近。

Lean 出处: `ColorAudit.identification_fails_baryon`, `ColorAudit.identification_fails_charge`

幸存与不幸存:

- 第 52 节**未受影响**。它的定理是关于大小为 n 的简并块的, 对每个 n 都对; 它一直就说 n 是输入。
- 被排除的是那条把 n 从空间标度花样导出来的路线。该路线给出 $n = 2$, 被证伪。
- 因此, 若框架要有色, 色**不是**空间方向的置换, 它必须来自框架目前尚不包含的结构。

这同时消除了一个未曾言明的隐忧: 若该认同成立, 色将是时空对称性而非内禀对称性, 而那正是 Coleman–Mandula 所禁止的混合。**框架没能产生它, 是预期结果而非意外**。

54 (已撤回) 三维中的绕数缺陷究竟是什么

本节的定理成立，但它们描述的不是本框架。

以下余维数分析假设标度是圆值的（对数标度取值于 $\mathbb{R}/\Delta\mathbb{Z}$ ）。在那个假设下，结论——三维中绕数缺陷是弦而非点——是对的。

但那个假设是错的，而错法又是那个熟悉的错法：标度是一个比值，故读数无向，序参量是一根无向轴而非一个圆（第 30 节）。射影序参量的 π_2 非平凡，故点缺陷回来了。这是“标量代替方向性”五次中的第二次（第 51 节）。

保留本节，是因为它记录了一次真实的误判，而登记册与结论同样重要。请勿把以下内容当作本框架对激发形态的主张——那由第 30、32、33 节给出。

试图从代数定住维数 n ，结果撞出的是 Defect.lean 的一个问题，而这个问题比维数本身更有意思。

第 31 节说：“绕任一包围一个点的闭合回路一周，标度可能不闭合”。在二维空间里这句话没问题——回路确实包围一个点。在三维里它是错的：三维空间中的回路不包围一个点，它包围一条线。回路能探测的是余维为二的轨迹，而三维中余维二是一维的。

所以三维空间中的圆值标度不产生点粒子，它产生弦。

这是被逼出来的，不是选的。标度是一个数——一个比值——所以它定义的场是圆值的，其缺陷由回路分类。框架里没有第二个标度可以让缺陷在三维中成为点。这个结论要么被接受，要么框架得改。

定理 54.1 (缺陷维数). d 维空间中绕数缺陷的维数是 $d - 2$ 。故点状绕数缺陷要求恰好二维空间，即一个 $2 + 1$ 世界；而在我们的三维中，缺陷是一维的。

Lean 出处: Codimension.pointlike_iff_two_dim, three_dim_gives_strings, Codimension.no_pointlike_in_four

结合第 5 节（漂移给出恰好一个时间方向），时空维数是空间维数加一，于是两种情形被截然分开：点状激发 $\Rightarrow 2 + 1$ 世界； $3 + 1$ 世界 $\Rightarrow$ 激发是一维的。二者不可兼得。

54.1 这独立地解释了质量律为何不确定

定理 54.2 (绕数不决定质量). 一维缺陷的质量是张力乘长度。绕数相同而长度不同的两个缺陷质量不同，故没有任何仅依赖绕数的函数能充当质量律。

Lean 出处: Codimension.string_mass_not_topological, Codimension.stringMass_strictMono

这条从缺陷的几何出发，独立地抵达了第 51 节由考察候选律得到的同一结论，并且解释了原因：那个对象是有广延的，而拓扑从未度量过它的广延。两条互不相干的路线得到同一个结果，这提高了那次撤回的可信度。

54.2 框架现在面临的选择

要么基本激发是有广延的——那么第 31 节的点图景必须换成弦图景，质量谱不是塔；要么标度不是圆值的——那么第 31 节的离散标度不变性与第 52 节的块单值性都要作废。

我们记录这个析取而不做选择，因为已证的东西还不足以判定它。

Lean 出处: Codimension.extended_or_low_dimensional

注 54.3 (风险). 这是一个真实的预言，也是一次真实的风险。本框架按目前的构造说：3+1 维中的基本激发是一维的广延对象。若这是错的，圆值标度就是错的，`Defect.lean` 与 `Color.lean` 随之作废。（“回路探测余维二”这条本身是标准拓扑事实，此处作为输入而非证明。）

55 这个框架究竟能说什么

第 56 节结尾留下一个我一直在回避的问题：若引力在这里不是耦合，那么“把引力与其他力统一”到底是什么意思？怀疑是这个问法本身借来的。**它确实是**，而弄清原因给出的对本框架的刻画，比再多一条结果都更有用。

标准的统一纲领要一个规范群，让所有力从中降下来。这预设了：力是耦合、耦合是基本描述、“一”意味着一个包含其余的代数对象。**这三条在这里都不成立**。力不是原始量，局域单位的比较才是。所以“统一诸力”是一个用本框架没有的词汇提出的问题。

它能回答的问题是：**什么是可表达的？**

整个开发只由三种操作搭成，别无其他——比较标度、不对易、计数。本节证明这三者确实就是全部词汇。

“三者互相独立”这个结论已被推翻，本节因此被降级为记录。下面关于可表达性的定理仍然成立且仍被审计：可观测量恰是标度差的函数，绝对标度根本不可表达。

但由此得出的“标度路与转动路按构造独立，故不可能有跨扇区检验”是**错的**。第 9 节证明：那是对标量扇区的分析；方向性标度下**转动扇区由标度扇区生成**，耦合是被词义强制的。这是“标量代替方向性”错误的第三次出现（共五次，见第 51 节）。

55.1 标度这一路：恰好表达“差”

定理 55.1 (可观测量 $\iff$ 差的函数). 一个量在 $A5$ 的基准平移下不变（即可观测），**当且仅当**它是标度差的函数。不是“至少是”，是恰好是——两个方向都成立。

Lean 出处: `Expressive.invariant_factors`, `diffPattern_invariant`, `invariant_iff_diffPattern`

定理 55.2 (绝对标度根本不可表达). 在一点读取标度不是不变量，故它**不是本框架的可观测量**——不是“未被测量”，而是在词汇之外。

Lean 出处: `Expressive.eval_not_invariant`

55.2 两路互不通气

第 4 节把一次比较典范地拆成标度（交换化）与转动（对易子子群）。这两者携带不相交的信息。

定理 55.3 (两路独立). 固定其中之一，对另一个毫无约束：标度相同的两次比较相差一个任意的对易子元素；而每个对易子的标度都平凡。

Lean 出 处: `Expressive.scale_says_nothing_about_rotation`, `rotation_says_nothing_about_scale`, `channels_independent`, `neither_channel_complete`

诊断.第 56 节找不到跨扇区检验，那不是运气不好。两路是**按构造**独立的——标度路是一个商，转动路是它的核——所以谁也约束不了谁。跨扇区检验需要它们互相约束，**而公理保证它们不会**。

55.3 框架弱点的诚实表述，因此改变了

不是“尚未导出标准模型”，而是：三条通路彼此太独立，以至于不能联合预言。

“引力、 $\hbar$ 、粒子内容是同一个变量的三种读法”——这句话是对的，而它同时就是它们无法互相核对的原因。

于是今后要找的东西变得具体得多：不是更大的对称群，而是一条通路间的耦合——某种使标度差去约束对易子、或使计数去约束二者之一的结构。A1–A6 不提供任何这样的东西，第 56 节就是这一点的观测后果。

Lean 出处: `Expressive.no_channel_coupling`

注 55.4 (这一节改变了什么). 它没有增加任何物理预言，而是划定了边界：框架能说“标度之差”、“两次比较不对易多少”、“能分辨几个结构”，除此之外说不出别的。之前几轮里反复出现的“借来的问法”，到这里有了一个统一的解释——凡是要求框架谈论绝对标度或两路之间的关系的问法，都不是它的问题。

56 我提议的跨扇区检验并不存在

第 47 节从质量谱量出阈值密度 $\rho \approx 0.86$ 每 e 倍。而第 38 节有一个同名的 ρ 控制 g^{-2} 的斜率。既然框架把两者都叫 ρ ，显然该做的事就是：一个从谱量、一个从耦合跑动量，看它们是否相等——一次不需要任何新假设的真正跨扇区检验。

我做了。它不是一次检验，而原因是我在第 38 节的措辞出了错。

第一，数字不一致。 数全部十二个标准模型质量标度得 $\rho_{\text{all}} \approx 0.864$ ；只数六个夸克——强耦合真正响应的那些——得 $\rho_{\text{quark}} \approx 0.444$ 。相差约两倍。

Lean 出处: `CrossCheck.rhoAll_value, rhoQuark_value, densities_differ, density_ratio_near_two`

第二，也是致命的：它们根本不是同一个量。 第 38 节写的是“探针响应它能分辨的缺陷”，而我把它读成了全部缺陷。规范耦合不是这样：它只响应带有该规范荷的结构。所以跑动里的 ρ 是扇区受限的（且为使符号正确，是带号的）计数，而谱里的 ρ 是对每一个阈值的裸计数。两者没有理由相等，而框架也从未说过它们相等。

第三，在单个扇区内该关系退化为恒等式。 一个方程 $db/dt = \kappa(dN/dt)$ 、一个未知量 κ ：测出跑动跳变与阈值密度是在定义 κ ，而不是检验什么。对 QCD 在粲与顶阈值之间执行，返回 $\kappa = 2/3$ ——那正是每味的 β 跳变倒着写一遍。

Lean 出 处: `CrossCheck.sector_relation_is_identity, qcd_extraction_returns_input, no_second_determination`

幸存下来的。 逐扇区的预言仍可检验：每个扇区的阈值应各自是常速率过程，速率不必相同。单看夸克扇区， $CV^2 = 0.243$ （即 $CV = 0.493$ ），落在五个间距时预言抽样分布的第 12 百分位——偏低、比常速率过程通常给出的更规则，但未被排除。五个间距说不出更强的话。夸克扇区同样不是等比塔。

Lean 出处: `CrossCheck.quarkCvSq_value, quark_not_geometric`

记录在案的结论。本框架目前**不提供**任何关于阈值密度的跨扇区检验。该提议是我的一次越界，第 38 节的措辞已更正为“耦合只计它所响应的那些缺陷”。

真正的检验需要两个独立的同一权重测定，好让后者核对前者。框架只给得出一个，因为每个扇区只有一个类耦合量，且没有任何一个耦合响应所有结构。

57 范围声明：什么被证明了，什么没有

这是本报告最重要的一节。Lean 验证的是蕴含关系，不是自然界的真值。

已被机器证明（从公理出发，零 **sorry**）。定理 35.2、35.3、35.4、35.5、35.6、15.2、15.3、15.4、15.5、15.6、15.7、18.1、18.2、18.3、18.4、37.3、37.6、41.1、42.2、42.3、43.1、43.2、44.1、44.2、45.1、45.2、25.1、25.2、26.1、26.2、46.1、35.7、35.8、35.9、35.10、35.11、16.1、16.2、31.1、31.2、31.3、31.4、16.3、16.4、39.1、39.2、39.3、39.4、39.5、8.1、8.2、8.3、8.4、37.7、35.12、35.13、35.14、29.1、29.2、17.1、17.2、17.3、52.1、52.2、52.3、52.4、51.1、51.2、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、22.1、7.1、7.2、7.3、7.4、23.1、54.1、54.2、21.1、21.2、30.1、30.2、32.1、32.2、24.1、19.1、19.2、20.1、34.1、34.2、47.1、47.2、55.1、55.2、55.3、9.1、9.2、9.3、9.4、14.1、14.2、14.3、14.4、14.5、14.6、14.7、10.1、10.2、10.3、10.4、33.1、33.2、33.3、33.5、33.6、33.7、40.1、40.2、40.3、40.4、40.5、12.1、12.2、12.3、12.4、11.1、11.2、11.3、11.4、13.1、13.2、13.3、48.1、48.2、48.3、36.1、36.2、36.3、36.4、27.1、27.2、27.3、27.5、27.6、49.1、49.2、49.3、49.4、49.5、50.1、38.1、38.2、31.5。

尚未完成——本纲领当前最薄弱之处。

完整的登记册在第 51 节，分五张清单：已撤回 (§51.3, 4 条)、已限缩适用域 (§51.4, 6 条)、已解决 (§51.5, 10 条，附由何关闭)、仍然开放 (§51.6, 7 条)、引用与假设 (§51.7, 各 2 条)。

本栏此前混杂着已解决与未解决的条目并以删除线标注，那是修改痕迹而非登记册；已解决的条目现已移入 §51.5 的表中，本栏只留仍未完成者。

- **标准模型不是目标**（立场，非缺口）。索取一张固定物种表，是把标准模型的本体论也借过来；而 A3 没有它——内容是标度上的截面，没有哪个标度携带完整清单（第 34 节）。色、代结构、Higgs 因此不是本框架应当重现的东西。应当索取的是**阈值结构**，第 47 节已给出并检验。
- **量子场论不是目标**（立场，非缺口）。此前本栏写作“量子场论未被回归”，那个措辞不准确：二次量子化、路径积分、圈图重整化预设了一个固定内容的场论描述，而第 40 节证明那种描述的标签数度量的是它覆盖的范围而非物理的深度。**本框架回归的是量子力学**（对易子、幂律、不确定性，第 35 节）与精确的非交换标度平移（ $\hbar$ 是步长）。真正的缺口是**散射振幅**——它需要固定内容的渐近态，而框架只能给出“两个被指名标度之间的映射”。
- **强扇区没有纯数**。第 39 节证明量纲嬗变、渐近自由与无参数质量比；第 38 节把 β 系数换成缺陷密度并导出线性形式。**仍缺的只有密度的数值**——而那与“唯一一个自由单位”是同一件事（第 11 节），不是一处独立的缺口。任何强子质量的纯数需要格点或解析求解，本框架不提供也不声称提供。

属于物理输入而非定理（续）。

属于物理输入而非定理。

- **A6' 标度响应律** ($e^{2\sigma} R = \kappa \rho$)。本报告未从更基本的原理导出它；它扮演 Einstein 方程的角色。所证明的是：一旦接受它，Newton 极限被强制。 $\kappa = 16\pi G$ 是外部标定。

- **耗散率 λ 的数值**。第 48 节已证明 A5 强制 λ 恒定——故 $w = -1$ 且不演化，这是本框架最暴露的预言。但 λ 的数值不被预言，也不可能被预言：它就是那个唯一的单位（第 11 节）。
- **暗物质的具体候选**。定理 42.3 证明“引力可见 + 探测不可见”在标度层级下是相容的，并给出构造；它不预言具体的粒子谱或截面数值。
- **重子不对称度**。仅证明 Sakharov 第三条件结构性满足，未导出 η_B 的量级。
- **胶球等强耦合谱**。本报告未涉及 QCD 谱的计算；引言所述的实验进展是启发，不构成本报告的证据链条。

形式化的技术边界。 基底采用代数化的“标度代数”而非光滑流形上的解析结构。这使全部曲率恒等式成为任意交换环上的代数恒等式（更强、更干净），但也意味着我们没有形式化测地线方程、整体解的存在性、或 Cauchy 问题。“类光测地线的共形不变性”本报告只证明了其代数内核——类光锥的标度无关性（定理 45.1），未证明参数化曲线层面的完整陈述。

58 形式化与验证

58.1 规模

文件	定理数	内容
第一部分 公理		
Basic.lean	13	标度代数、Kronecker 收缩原语
Axioms.lean	16	A2/A3/A5、红移、基准协变性
Postulates.lean	3	A1–A7 全在一处；证明基底只有一个载体
第二部分 公理逼出什么		
Foundation.lean	10	地基重建：标度即交换化，拆分被导出
Signature.lean	7	时间即漂移方向；号差由耗散导出
Invariant.lean	6	记账形式由迹导出
Quantum.lean	7	对易子即导数、Heisenberg 不确定性
Direction.lean	8	方向是定义表示（原说法已更正）
Connection.lean	9	曲率即对易子、Bianchi
Coupling.lean	8	两次缩放生成转动；耦合被词义强制
Algebra.lean	18	实秩一；筛出 Lorentz 族
Dimension.lean	10	方向是表示；比值不变；量值即单位
Slice.lean	16	广延即标签；转动是楔积； $k = 3$ 唯一
Axes.lean	9	两难消解；轴数被迫为一
第三部分 分叉点		
Locus.lean	11	A7；标签只活在各向异性轨迹上
Dynamics.lean	13	守恒出自 Bianchi
第四部分 各向同性扇区		
Conformal.lean	20	共形曲率恒等式、Ricci、标量曲率
Frame.lean	5	A4' 方向性；旧公理禁止 Schwarzschild

文件	定理数	内容
Unify.lean	9	A4 是 A4' 的各向同性轨迹
Newton.lean	7	线性化、Poisson、对偶数模型
Schwarzschild.lean	5	使倒数关系成立的相消
RicciDiag.lean	4	由联络导出 Ricci, 引力链条闭合
Vacuum.lean	5	倒数关系的常数由渐近平直定出
Deflection.lean	7	各向同性扇区恰好只给一半
PPN.lean	9	$\gamma = 1$; 付清另一半
Precession.lean	8	水星 42.99''
Covariance.lean	7	耗散下的局域协变性
Singularity.lean	6	无度规退化
Waves.lean	16	旋近动力学: 守恒杀掉单极与偶极
Horizon.lean	12	无视界; 波在光锥; 熵是对数; 无最小长度
第五部分 各向异性扇区		
Gauge.lean	5	内禀对称性即标度花样稳定子
Transport.lean	6	输运由花样定出; 规范自由即简并
Axis.lean	9	点粒子回来了
Defect.lean	13	标度缺陷、绕数即荷
Charges.lean	15	两个拓扑荷, 恰一个被禁闭
Particle.lean	16	标签结构 $(\mathbb{R}, \mathbb{Z}/2, \mathbb{Z})$
Emergence.lean	9	没有基本粒子
第六部分 量子扇区		
Deformation.lean	12	一阶形变、对应原理、CCR
Crossed.lean	11	精确非交换; $\hbar$ 是标度步长
NCConformal.lean	18	非交换曲率; 修正 $= [\sigma_i, \sigma_j]$, 纯反对称
第七部分 标度流与内容		
RG.lean	13	标度流、Callan–Symanzik、EFT 塔
Running.lean	6	由计数导出线性跑动
QCD.lean	10	渐近自由、量纲嬗变
Spectrum.lean	9	阈值密度、CV 检验、换算
Entropy.lean	9	H 定理、不可逆性
Light.lean	6	类光锥标度无关
Observation.lean	6	红移属于观察者而非光
Particles.lean	9	标度比、寿命、阈值
DarkMatter.lean	4	探测失效
DarkEnergy.lean	8	耗散唯一性、de Sitter
第八部分 预言与数据		
Predictions.lean	17	$w(q)$ 状态方程、数值核对
Cosmos.lean	13	w 不演化; 无初值; 暗物质两路; 共振宽度界
Native.lean	12	框架自己的七个问题
Data.lean	19	与 DESI / PDG / Fermi-LAT 对质
第九部分 登记册		

文件	定理数	内容
Color.lean	17	块单值性（色解释已撤回）
ColorAudit.lean	8	块 $\neq$ 色块
Codimension.lean	12	（已被方向性 A4 取代）
Expressive.lean	10	可表达性（独立性结论已推翻）
CrossCheck.lean	9	跨扇区检验并不存在
MassAudit.lean	9	拓扑不决定质量律（撤回）
Audit.lean	4	登记册：撤回 / 更正 / 引用 / 假设
合计	611	62 个文件，12055 行 Lean 代码

58.2 公理审计

对全部 615 条定理执行 `#print axioms`，结果全部落在

```
{propext, Classical.choice, Quot.sound}
```

之内——这是 Lean 中经典数学的三条标准逻辑公理。**无一条定理依赖 `sorryAx`**，即全部证明完整闭合。

需要强调：`ScaleAlgebra`、`ScaleField` 以及各条物理假设 不是 Lean 的 `axiom` 声明，而是类型类、结构与显式假设。它们出现在定理的陈述中，因而无法被隐藏在证明背后。本开发中不存在“先把物理结论声明为公理、再宣称已证明”的情形。

58.3 复现

```
lake exe cache get
lake build
lake env lean SCD/Verify.lean # 公理审计
```

59 结语

若把标度而非时空当作基本量，则一条链条从公理一路走下来：

- 标度必须**有方向**（标量版本禁止 Schwarzschild）；
- 一旦有方向，**标度与转动的耦合就被词义强制**——缩放对称、转动反称，而两个对称算子的括号必然反称；
- 耦合加上“漂移是单个泛函”给出**实秩一**，从而 Lorentz 代数族，从而 $n = k + 1$ ； $k = 3$ 出自 A7，而 A7 是一条关于什么算可观测的承诺；
- 各向同性 / 异性的**分叉**决定了标签是否存在，而这是标度相关的事实——这就是“相互作用随能标下降而分离”；
- 曲率是标度形变（各向同性扇区）； $\hbar$ 是标度轴上的步长；几何的全部量子修正是 $[\sigma_i, \sigma_j]$ ，且纯反对称；

- 引力扇区定量闭合：1.7515'' 与 42.99''/ 世纪，中间无假设。

这些不是隐喻。它们是 595 条经机器检验、零 sorry 的定理，且全部经 `#print axioms` 审计（清单由源码生成，非人工挑选）。

但“它回归出了我们已知的物理”这句话，现在说不得。记分牌上有一条活张力——DESI 对 w 不演化给出 $2.8\text{--}4.2\sigma$ 的反向偏好，而那是与 A5 的张力，不是与某个拟合参数的张力，**不存在带演化 w 的本框架版本**；还有一个活的开放问题—— $f_0(500)$ 极点落在宽度界的哪一侧，两个旗舰确定值分居两侧，而框架押其中一个。

同样说不得的是“它解释了标准模型”：第 34 节论证那不是目标，第 51 节记录了为得到现有结论而必须收回的 4 条主张、必须限缩适用域的 6 条、引用而未证的 2 条、以及登记为假设的 2 条——外加同一个“标量代替方向性”的错误出现了 5 次，其中一次挺过了一次形式化和一版报告。

形式化系统能回答的只有一件事：**这些结论确实从这些公理跟出来，中间没有缺口**。公理是否为自然界所采纳，它不能回答，也不应假装能回答。而它不能回答这件事本身，正是记分牌与登记册存在的理由。

A 定理索引：全部 615 条

本索引由 `tools/sync_report.py` 从源码生成，非人工维护。每一条都在 **Verify.lean** 中经 `#print axioms` 审计，故报告正文未展开叙述的定理并非未被检验，只是未被叙述。

第一部分 公理

Basic.lean (13) `d_zero, d_one, d_neg, d_sub, d_sum, d_natCast, d_nsmul, kron_self, kron_symm, d_kron, d_kron_mul, sum_kron_left, sum_kron_right`

Axioms.lean (16) `en_mul_scale, scale_mul_en, d_en, sig_add_const, hess_add_const, lap_add_const, gradsq_add_const, Chr_add_const, Rm_add_const, Ric_add_const, Defm_add_const, geometry_fiducial_invariant, sig_neg, hess_neg, lap_neg, gradsq_neg`

Postulates.lean (3) `scaleAlgebra_is_diffRing_d, three_from_A7, A7_holds_only_at_three`

第二部分 公理逼出什么

Foundation.lean (10) `scale_mul, scale_comm, scale_inv, scale_commutator, curvature_is_scale_invisible, scale_eq_one_of_mem_commutator, mem_commutator_of_scale_eq_one, scale_eq_iff_differ_by_rotation, commutator_eq_one_of_comm, comm_of_scale_injective`

Signature.lean (7) `codim_ker_eq_one, no_time_of_no_drift, spatial_eq_top_of_no_drift, spatial_ne_top_of_drift, drift_direction_unique, spatial_smul, signature_from_dissipation`

Invariant.lean (6) `map_zero, map_sub, form_symm, form_invariant, form_ad_skew, form_commutator_self`

Quantum.lean (7) `ad_zero_left, ad_leibniz, ad_jacobi, ad_comm_of_commute, ad_pow, robertson, heisenberg`

Direction.lean (8) `D_zero_dir, D_neg_dir, curv_self, curv_antisymm, flat_iff_lie_hom, curv_of_abelian, commute_iff_bracket_acts_trivially, transport_determined_by_generators`

Connection.lean (9) `D_sub, F_antisymm, comm_covD, bianchi, curv_of_central, curv_gradient_eq_zero, curv_split, curv_eq_rotation_part, curv_pure_scale_eq_zero`

Coupling.lean (8) `bracket_scaling_scaling, bracket_rotation_scaling, bracket_rotation_rotation, coupling_structure, bracket_self, no_rotation_of_commuting, boost_bracket_eq_rotation, scalings_do_not_commute`

Algebra.lean (18) `scaling_rotation_orthogonal, boost_zero_zero, boost_zero_succ, boost_succ_zero, boost_succ_succ, boost_isScaling, boost_add, boost_smul, boost_mul_succ_succ, boost_bracket_spatial, boosts_commute_iff_parallel, commuting_boosts_lie_on_a_line, commuting_family_one_parameter, no_two_dimensional_commuting_family, boost_drift, commuting_drifts_proportional, boost_spatial_block_zero, boost_eq_zero_iff`

Dimension.lean (10) `algebra_bigger_than_directions, rep_dim_determined, rot_matches_scale_iff, alg_matches_rep_iff, two_matching_conditions_differ, wedge_smul_both, wedge_ratio_invariant, only_ratios_are_fixed, density_normalization_relation, normalization_returns_input`

Slice.lean (16) `mem_newContent, newContent_nonempty_of_threshold, newContent_mono, newContent_empty_of_no_threshold, no_finite_universal_labelling, label_count_measures_range, wedge_eq_bracket, wedge_antisymm, wedge_bilinear_left, wedge_eq_zero_iff_parallel, homogeneous_carries_no_rotation, rotation_requires_biaxial, wedge_dim_eq_iff, three_is_unique, more_wedges_than_directions, fewer_wedges_than_directions`

Axes.lean (9) `rotation_needs_variation, combable_no_rotation, wound_carries_rotation, rotationless_is_trivial, rotation_iff_variation, no_second_axis, axis_or_variation, axis_stabilizer_nontrivial, multiplet_flatness_needs_per_direction_scalings`

第三部分 分叉点

Locus.lean (11) `observability_eq_postulate, three_from_observability, observability_fails_elsewhere, observability_iff_three, no_scale_invariant_interaction, constant_coupling_iff_no_content,`

isotropic_pair_parallel, isotropic_no_rotation, labels_require_anisotropy, everything_switches_on_together, particle_locus_is_anisotropic

Dynamics.lean (13) no_flatness_from_commuting_derivations, nonflat_witness, commutative_sector_transports_commute, commutative_curvature_undetectable, source_conserved_of_field_equation, no_field_equation_of_nonconserved, source_antisymm, field_equation_content, same_multiplet_no_rotation, rotation_implies_different_multiplet, larger_multiplet_fewer_generators, multiplets_fixed_by_pattern, multiplet_change_needs_pattern_change

第四部分 各向同性扇区

Conformal.lean (20) hess_symm, d_sig_comm, sum_mul_gradsq, sum_const_fin, scaleCurv_eq_zero, Chr_symm, sum_d_Chr, sum_Chr_diag, sum_d_Chr_trace, sum_ChrTrace_Chr, sum_Chr_Chr_full, sum_Chr_Chr, Ric_eq, RscBare_eq, Defm_symm, d_Chr_diff, two_Rm_eq, Rm_eq_zero_of_Defm_eq_zero, Ric_eq_zero_of_Defm_eq_zero, two_Ric_eq

Frame.lean (5) isotropic_metric, reciprocal_metric, isotropic_reciprocal_forces_flat, isotropic_reciprocal_metric_bare, exists_reciprocal_nonisotropic

Unify.lean (9) toMetric_of_isotropic, ofScalar_isotropic, ofScalar_toMetric, isotropic_iff_ofScalar, toDirScale_isotropic, toDirScale_toMetric, sector_coherence, isotropic_ratio_const, not_isotropic_of_ne

Newton.lean (7) lap_newtPot, RscBare_linear, poisson, poisson_three, sig_inr, gradsq_inr, poisson_exact

Schwarzschild.lean (5) ricci_combination, vacuum_log_derivative, scale_sum_derivative_zero, vacuum_iff_scale_sum_stationary, area_element_stationary

RicciDiag.lean (4) ricciTT_eq, ricciRR_eq, gravity_chain, area_stationary_derived

Vacuum.lean (5) const_of_deriv_zero_and_vanishing, reciprocity_of_asymptotic_flatness, scale_product_eq_one, product_constant_without_flatness, tr_area_element_constant

Deflection.lean (7) iso_is_exactly_half, iso_ratio_half, missing_half, solarObs_value, solarIso_value, solar_ratio, iso_fails_by_far

PPN.lean (9) gamma_zero_is_isotropic, gamma_one_is_observed, reciprocal_expansion, gamma_eq_one_of_reciprocal, gamma_eq_one_first_order, deflection_reciprocal_eq_observed, halves_equal, solar_reciprocal_value, gamma_prediction_is_sharp

Precession.lean (8) coeff_reciprocal, coeff_isotropic, isotropic_is_third, coeff_affine_in_gamma, mercuryFactor_bounds, mercury_value, mercury_isotropic_value, two_tests_different_factors

Covariance.lean (7) sig_eq, Chr_eq, Rm_eq, Ric_eq_of_drift, Defm_eq, field_equation_form_invariant, no_local_expansion

Singularity.lean (6) scale_ne_zero, energy_ne_zero, conformal_factor_isUnit, conformal_factor_invertible, curvature_indep_of_scale_value, curvature_zero_of_uniform_scale

Horizon.lean (15) gtt_ne_zero, reciprocal_never_degenerate, redshift_never_infinite, no_degeneracy_anywhere, null_cone_scale_independent, waves_travel_on_the_light_cone, no_energy_dependent_speed, two_polarizations, no_breathing_mode, polarization_count, entropy_of_scale_ratio, entropy_doubling_is_additive, entropy_increment_independent_of_size, no_minimum_length, no_final_description

Waves.lean (20) conserved_has_no_dynamics, monopole_does_not_radiate, dipole_does_not_radiate, quadrupole_is_leading, power_pos, power_ratio_halving, inspiral_shrinks_orbit, separation_rate, chirpMass_symm, chirpMass_equal, chirp_exponent, chirp_mass_exponent, hulse_taylor_agreement, dipole_bounded_by_hulse_taylor, gw150914_equal_mass_component, dipole_bounded_by_double_pulsar, double_pulsar_tighter, gw_sector_matches_gr, reflectivity_nonzero_but_unbounded, same_constant_both_sectors

第五部分 各向异性扇区

Gauge.lean (5) mem_stabilizer_iff, stabilizer_eq_bot_of_injective, stabilizer_eq_top_of_isotropic, sameOrbit_iff_eq_scale, internal_symmetry_determined

Transport.lean (6) transports_self_iff, transport_unique_of_nondegenerate, transport_coset, transports_of_stabilizer, transport_unique_iff_stabilizer_trivial, nondegenerate_no_gauge_freedom

Axis.lean (9) bareForm_neg, physForm_neg, neg_indistinguishable, physForm_indistinguishable, isotropic_no_order_parameter, nondegenerate_full_frame, uniaxial_stabilizer, uniaxial_axis_distinguished, scalar_picture_is_the_isotropic_locus

Defect.lean (13) winding_unique, vacuum_winding, combine_winding, anti_winding, pair_winding_zero, vacuum_isTrivial, stable_of_winding_ne_zero, winding_eq_zero_of_trivial, mass_pos, antiparticle_same_mass, mass_zero, mass_ratio_geometric, mass_ratio_const

Charges.lean (15) comp_block, comp_hedgehog, anti_block, anti_hedgehog, triv_observable, block_confined, hedgehog_free, hedgehog_surjective_on_observables, exactly_one_confined, hedgehog_not_determined_by_block, block_not_determined_by_hedgehog, charges_independent, pair_observable, pair_hedgehog_zero, observable_pair_any_hedgehog

Particle.lean (16) boost_injective, pattern_is_one_vector, mixture_second_moment, mixture_cvSq_ge_one, mixture_cvSq_eq_one_iff, observed_disfavours_higher_rank, rate_value_not_fixed, block_two_valued, block_cannot_be_three_valued, block_self_inverse, bind_hedgehog, bind_block, two_odd_make_even, hedgehog_conserved_in_splitting, no_further_label, particle_label_structure

Emergence.lean (9) mem_resolved, resolved_mono, content_never_complete, always_more_above, no_fundamental_list, mass_iff_threshold, mass_mono, content_eq_of_no_threshold, content_changes_only_at_threshold

第六部分 量子扇区

Deformation.lean (12) poisson_antisymm, poisson_self, poisson_leibniz_left, poisson_leibniz_right, star_assoc, star_classical, star_comm_classical, star_commutator, star_comm_iff_poisson_zero, canonical_poisson, ccr_of_canonical, canonical_poisson_self

Crossed.lean (11) map_zero, shift0p_apply, mul0p_apply, shift_mul_eq, commutator_eq, comm_iff_shift_trivial, delta_twisted_leibniz, delta_leibniz_of_untwisted, delta_eq_zero_iff, ScaleShift, shift_mul_eq_comp

NCConformal.lean (18) kr_symm, kr_comm, kr_self, sum_kr_left, sum_kr_right, kr_swap, scalar_mul_scalar, hess_symm, Chr_symm, Defm_antisymm_part, Defm_symm_iff_commutator, Defm_symm_iff_commute, symmetric_part_uncorrected, correction_is_pure_antisymmetric, sum_Chr_Chr_full_nc, sum_Chr_Chr_full_classical, quantum_correction_couples_to_rotation, correction_vanishes_on_commuting

第七部分 标度流与内容

RG.lean (13) observable_const_at_fixedPoint, fixedPoint_invariant, callan_symanzik, scale_invariant_of_fixedPoint, mem_active, active_mono, active_eq_of_no_threshold, active_finite_range, active_eq_univ_of_ge, active_eq_empty_of_lt, beta_const_between_thresholds, beta_finite_range, beta_eq_of_all_active

Running.lean (6) resolvedCount_self, invSqCoupling_at_base, hasDerivAt_invSqCoupling, slope_eq_two_b, invSqCoupling_eq_one_loop, asympt_free_iff_pos_density

QCD.lean (10) running_inv_sq, asymptotic_freedom, lambda_invariant, lambda_pos, hadron_mass_ratio, spectrum_rigid, geometric_tower_fails, ratio₁_value, ratio₂_value, lightestGlueballInLambda_value

Spectrum.lean (9) mass_threshold_inverse, equal_gaps_variance_zero, observed_cvSq_value, meanGap_value, observed_not_geometric, observed_within_scale_invariant_range, densityFromGaps_value, deltaN_inverse, density_gap_inverse

Entropy.lean (9) mem_sat, subset_sat, card_le_card_sat, card_image_perm, entropy_nondecreasing, no_reverse_law, evolve_no_reverse_law, charge_change_implies_nonequilibrium, entropy_production_implies_nonequilibrium

Light.lean (6) unit_sq_mul_eq_zero_iff, isNull_iff_bare, isNull_scale_invariant, scale_determined_of_nonnull, physForm_ne_bareForm, null_weight_zero

Observation.lean (6) null_has_energy, redshift_is_scale_ratio, no_redshift_of_equal_scale, obsEnergy_rescale, redshift_fiducial_invariant, causal_structure_still_blind

Particles.lean (9) energy_pos, energy_ge, one_le_scaleRatio, scaleRatio_mono, lifetime_ge, lifetime_mono, lifetime_at_rest, available_mono, not_available_of_lt

DarkMatter.lean (4) detResp_pos, detection_failure, dark_matter_exists, response_vanishes

DarkEnergy.lean (8) hasDerivAt_exp_mul, dissipation_solution, energy_strictly_decreasing, scaleFactor_eq, hasDerivAt_scaleFactor, hasDerivAt_hubble, acceleration_pos, open_universe_accelerates

第八部分 预言与数据

Predictions.lean (17) accel_numerator, powerlaw_accel_numerator, accelerates_iff, eos_dissipationExponent, dissipationExponent_eos, eos_one, eos_eq_neg_one_iff, eos_lt_third_iff, eos_lt_neg_one_iff, worked_inversion, muon_lifetime_value, muon_matches_experiment, poundRebka_value, darkEnergyDensity_value, logScale_step, logScale_ratio_const, logScale_closed

Cosmos.lean (13) shift_invariant_is_constant, rate_constant_of_fiducial_invariance, w_does_not_evolve, scale_ratio_depends_only_on_difference, no_first_moment, finite_lookback_no_origin, isotropic_gravitates_without_labels, dark_matter_has_no_species, two_dark_routes_differ, resolvable_needs_width_below_gap, mean_gap_bound, broad_structures_unresolvable, resolvability_boundary

Native.lean (12) not_two_places_of_parallel, separation_is_oriented, single_anisotropy_boundary, label_forces_anisotropy, zero_window_resolves_nothing, content_is_interval_valued, no_global_field_equation, ordering_discrepancy_is_the_observable, parity_conserved_under_binding, both_labels_conserved, no_maximum_anisotropy, no_cutoff_either_end

Data.lean (19) desi_tension_exceeds_three_sigma, desi_significance_dataset_dependent, desi_combinations_disagree_internally, falsification_threshold, ccl_above_bound, gkpy_below_bound, determinations_straddle_bound, gkpy_updated_inside, kappa_below_bound, rho_below_bound, delta_below_bound, z_boson_far_inside, bound_separates_kappa_from_sigma, breit_wigner_spans_the_bound, dispersion_limit_above_planck, framework_predicts_no_finite_scale, one_charge_prediction, zero_nu_beta_beta_decides, scorecard

第九部分 登记册

Color.lean (17) comp_perm, anti_perm, triv_perm, charge_comp, charge_anti, triv_observable, confinement, pair_observable, pair_charge, rep_perm, rep_charge, bound_state_observable, bound_state_size, no_partial_state, constituent_charge_fraction, constituent_charge_rat, bound_charge_divisible

ColorAudit.lean (8) identification_predicts_two, identification_predicts_halves, identification_fails_baryon, identification_fails_charge, spatial_block_is_not_colour_block, three_is_forced_by_data, three_matches_charge, geometry_offers_two_data_needs_three

Codimension.lean (12) defectDim_two, defectDim_three, defectDim_four, pointlike_iff_two_dim, three_dim_gives_strings, pointlike_forces_three, our_world_gives_strings, no_pointlike_in_four, string_mass_not_topological, stringMass_strictMono, stringMass_zero, extended_or_low_dimensional

Expressive.lean (10) diffPattern_shift, invariant_factors, diffPattern_invariant, invariant_iff_diffPattern, eval_not_invariant, scale_says_nothing_about_rotation, rotation_says_nothing_about_scale, channels_independent, neither_channel_complete, no_channel_coupling

CrossCheck.lean (9) rhoAll_value, rhoQuark_value, densities_differ, density_ratio_near_two, sector_relation_is_identity, qcd_extraction_returns_input, no_second_determination, quarkCvSq_value, quark_not_geometric

MassAudit.lean (9) massExp_neg, massQuad_neg, massExp_pos, massQuad_pos, massExp_zero, massQuad_zero, mass_law_underdetermined, both_laws_antiparticle_degenerate, massQuad_ratio_not_constant

Audit.lean (4) scalar_for_directional_count, register_nonempty, more_corrected_than_retracted, clean_count