

## Seminár 13: Geometria IV – kružnica vpísaná a opísaná trojuholníku

### Ciele

Precvičiť úlohy zamerané najmä na vlastnosti kružnice vpísanej a opísanej trojuholníku.

### Úlohy a riešenia

**Úloha 13.1.** [57-II-1] Trojuholník  $ABC$  spĺňa pri zvyčajnom označení dĺžok strán podmienku  $a \leq b \leq c$ . Vpísaná kružnica sa dotýka strán  $AB$ ,  $BC$  a  $AC$  postupne v bodoch  $K$ ,  $L$  a  $M$ . Dokážte, že z úsečiek  $AK$ ,  $BL$  a  $CM$  možno zostrojiť trojuholník práve vtedy, keď platí  $b+c < 3a$ .

**Riešenie\*.** Označme  $x = |AK| = |AM|$ ,  $y = |BL| = |BK|$ ,  $z = |CM| = |CL|$  (obr. 1) zhodné úseky dotýčníc z jednotlivých vrcholov trojuholníka ku vpísanej kružnici. Zrejme



Obr. 1:

$$a = y + z, \quad b = z + x, \quad c = x + y. \quad (1)$$

Z uvedených rovností vidíme, že daná podmienka

$$b + c < 3a \quad (2)$$

je ekvivalentná nerovnosti

$$x < y + z, \quad (3)$$

čo je nutná podmienka existencie trojuholníka so stranami dĺžok  $x$ ,  $y$  a  $z$ .

Dosadením z 1 do podmienok  $b \leq c$  a  $a \leq b$  zistíme, že  $z \leq y$  a  $y \leq x$ . To znamená, že ďalšie dve trojuholníkové nerovnosti  $y < z + x$  a  $z < x + y$  sú automaticky splnené, takže nerovnosť 3, a tým aj 2 je podmienkou postačujúcou. Tým je tvrdenie úlohy dokázané.

**Komentár.** Úloha využíva poznatok, že spojnice vrcholov a bodov dotyku so stredom vpísanej kružnice rozdeľujú trojuholník na tri dvojice zhodných trojuholníkov. Ten využijeme v nasledujúcej úlohe aj domácej práci. Okrem toho, aj keď úloha nie je na výpočet nijako extrémne náročná, je študentov potrebné upozorniť, že dokazujú ekvivalenciu, takže nerovnosť zo zadania musí byť nielen podmienkou nutnou, ale aj postačujúcou.

**Úloha 13.2.** [61-S-2] Označme  $S$  stred základne  $AB$  daného rovnoramenného trojuholníka  $ABC$ . Predpokladajme, že kružnice vpísané trojuholníkmi  $ACS$ ,  $BCS$  sa dotýkajú priamky  $AB$  v bodoch, ktoré delia základňu  $AB$  na tri zhodné diely. Vypočítajte pomer  $|AB| : |CS|$ .

$$|SD| = |SE| = |SF| = x \quad \text{a} \quad |CD| = |CG| = |CH| = y.$$
$$|AB| = 6x, \quad |AC| = |BC| = 2x + y \quad \text{a} \quad |CS| = x + y.$$
$$(2x + y)^2 = (3x)^2 + (x + y)^2.$$
$$\begin{aligned} 4x^2 + 4xy + y^2 &= 9x^2 + x^2 + 2xy + y^2, \\ 2xy &= 6x^2, \\ y &= 3x. \end{aligned}$$
$$|AB| : |CS| = 6x : (x + y) = 6x : 4x = 3 : 2.$$
$$|AC| = |AG| + |CG| = |AE| + |CD| = \frac{1}{3}c + (v - \frac{1}{6}c) = v + \frac{1}{6}c,$$
$$(v + \frac{1}{6}c)^2 = (\frac{1}{2}c)^2 + v^2,$$

**Komentár.** Úloha vychádza z poznatku, ktorý si študenti osvojili v úlohe predchádzajúcej a pridáva k nemu ešte prácu s Pytagorovou vetou a manipuláciu s algebraickými výrazmi, takže tvorí prirodzené pokračovanie úlohy predchádzajúcej.

**Úloha 13.3.** [62-S-1] Danému rovnostrannému trojuholníku vpíšme a opíšme kružnicu. Označme  $S$  obsah vzniknutého medzikružia a  $T$  obsah kruhu, ktorého priemer je zhodný s dĺžkou strany daného trojuholníka. Ktorý z obsahov  $S$ ,  $T$  je väčší? Svoju odpoveď zdôvodnite.

**Riešenie\*.** Ukážeme, že sa oba obsahy rovnajú. Označme  $A$ ,  $B$ ,  $C$  vrcholy daného trojuholníka a  $r$  a  $R$  zodpovedajúce polomery jeho vpísanej a opísanej kružnice; dĺžku jeho strany označme  $a$ . Obe uvedené kružnice majú spoločný stred  $S$ . Označme ešte  $P$  bod dotyku vpísanej kružnice so stranou  $AB$ . Keďže trojuholník  $ABC$  je rovnostranný, je  $P$  zároveň stredom strany  $AB$ . Použitím Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku  $PSB$  dostávame

$$R^2 - r^2 = \left(\frac{1}{2}a\right)^2,$$

čo je ekvivalentné s dokazovaným tvrdením  $S = \pi(R^2 - r^2) = \pi\left(\frac{1}{2}a\right)^2 = T$ .

*Poznámka.* Rovnostranný trojuholník so stranou  $a$  má výšku veľkosti  $v = \frac{1}{2}a\sqrt{3}$ , takže skúmané polomery sú  $R = \frac{2}{3}v (= \frac{1}{3}a\sqrt{3})$  a  $r = \frac{1}{3}v (= \frac{1}{6}a\sqrt{3})$ , a preto

$$S = \pi(R^2 - r^2) = \pi\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{9}\right)v^2 = \pi \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}a^2 = \pi\left(\frac{1}{2}a\right)^2 = T.$$

**Komentár.** Úloha je relatívne jednoduchá, využíva znalosť o bode dotyku vpísanej kružnice a taktiež pripravuje študentov na nasledujúcu zložitejšiu analýzu.

**Úloha 13.4.** [61-I-5] Daný je rovnoramenný trojuholník so základňou dĺžky  $a$  a ramenami dĺžky  $b$ . Pomocou nich vyjadrite polomer  $R$  kružnice opísanej a polomer  $r$  kružnice vpísanej tomuto trojuholníku. Potom ukážte, že platí  $R \geq 2r$  a zistite, kedy nastane rovnosť.

**Riešenie\*.** Označme  $S$  stred základne  $BC$  daného rovnoramenného trojuholníka  $ABC$ ,  $O$  stred jeho opísanej kružnice,  $M$  stred vpísanej kružnice a  $P$  päťu kolmice z bodu  $M$  na rameno  $AC$  (obr. 3). Z pravouhlého trojuholníka  $BSO$  pomocou Pytagorovej vety vyjadríme veľkosť  $v$  výšky  $AS$ , pričom



Obr. 3:

v pravouhlom trojuholníku  $BSO$  s preponou dĺžky  $R$  pre odvesnu  $OS$  platí  $|OS| = ||AS| - |AO|| = |v - R|$  (musíme si uvedomiť, že v tupouhlom trojuholníku  $ABC$  bude bod  $S$  ležať medzi bodmi  $A$

a  $O$ !). Dostávame tak dve rovnosti

$$v^2 = b^2 - \frac{a^2}{4},$$

$$R^2 = \frac{a^2}{4} + (v - R)^2;$$

ich sčítaním vyjde

$$v^2 + R^2 = b^2 + (v - R)^2, \quad \text{čiže} \quad b^2 = 2vR.$$

Dosadením z prvej rovnice  $v = \frac{1}{2}\sqrt{4b^2 - a^2}$  do poslednej rovnosti dostaneme hľadaný vzorec pre  $R$ .

Dodajme, že rovnosť  $b^2 = 2vR$ , ktorú sme práve odvodili a z ktorej už ľahko vyplýva vzorec pre polomer  $R$ , je Euklidovou vetou o odvesne  $AB$  pravouhlého trojuholníka  $ABA'$  s preponou  $AA'$ , ktorá je priemerom kružnice opísanej trojuholníku  $ABC$  (obr. 3).

Nájdenný vzorec pre polomer  $R$  zapíšeme prehľadne spolu s druhým hľadaným vzorcom pre polomer  $r$ , ktorého odvodeniu sa ešte len budeme venovať:

$$R = \frac{\sqrt{b^2}}{\sqrt{4b^2 - a^2}} \quad \text{a} \quad r = \frac{a\sqrt{4b^2 - a^2}}{2(a + 2b)}. \quad (4)$$

Druhý zo vzorcov 4 sa dá získať okamžite zo známeho vzťahu  $r = 2S/(a + b + c)$  pre polomer  $r$  kružnice vpísanej do trojuholníka so stranami  $a, b, c$  a obsahom  $S$ ; v našom prípade stačí len dosadiť  $b = c$  a  $2S = av$ , kde  $v = \frac{1}{2}\sqrt{4b^2 - a^2}$  podľa úvodnej časti riešenia.

Ďalšie dva spôsoby odvodenia druhého zo vzorcov 4 založíme na úvahe o pravouhlom trojuholníku  $AMP$ , ktorého strany majú dĺžky

$$|AM| = v - r, \quad |MP| = r, \quad |AP| = |AC| - |PC| = b - |SC| = b - \frac{a}{2}.$$

Pre tento trojuholník môžeme napísať Pytagorovu vetu alebo využiť jeho podobnosť s trojuholníkom  $ACS$ , konkrétne zapísať rovnosť sínusov ich spoločného uhla pri vrchole  $A$ . Podľa toho dostaneme rovnice

$$(v - r)^2 = r^2 + \left(b - \frac{a}{2}\right)^2, \quad \text{resp.} \quad \frac{r}{v - r} = \frac{\frac{1}{2}a}{b},$$

ktoré sú obidve lineárne vzhľadom na neznámu  $r$  a majú riešenie

$$r = \frac{v}{2} - \frac{1}{2v} \cdot \left(b - \frac{a}{2}\right)^2, \quad \text{resp.} \quad r = \frac{av}{a + 2b}.$$

Po dosadení za  $v$  v oboch prípadoch dostaneme hľadaný vzorec pre  $r$ . V druhom prípade je to zrejmé, v prvom to ukážeme:

$$\begin{aligned} r &= \frac{v}{2} - \frac{1}{2v} \cdot \left(b - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{v^2 - b^2 + ab - \frac{1}{4}a^2}{2v} = \frac{2ab - a^2}{4v} = \\ &= \frac{a(2b - a)}{2\sqrt{(2b - a)(2b + a)}} = \frac{a\sqrt{2b - a}}{2\sqrt{2b + a}} = \frac{a\sqrt{4b^2 - a^2}}{2(a + 2b)}. \end{aligned}$$


Ešte ostáva dokázať nerovnosť  $R \geq 2r$ . Využijeme na to odvodené vzorce 4, z ktorých dostávame (pripomínáme, že  $2b > a > 0$ )

$$\frac{R}{2r} = R \cdot \frac{1}{2r} = \frac{b^2}{\sqrt{4b^2 - a^2}} \cdot \frac{a + 2b}{a\sqrt{4b^2 - a^2}} = \frac{b^2}{a(2b - a)}.$$

Nerovnosť  $R \geq 2r$  teda platí práve vtedy, keď  $b^2 \geq a(2b - a)$ . Posledná nerovnosť je však ekvivalentná s nerovnosťou  $(a - b)^2 \geq 0$ , ktorej platnosť je už zrejmalá. Tým je dôkaz nerovnosti  $R \geq 2r$  hotový. Navyše vidíme, že rovnosť v nej nastane jedine v prípade, keď  $(a - b)^2 = 0$ , čiže  $a = b$ , teda práve vtedy, keď je pôvodný trojuholník nielen rovnoramenný, ale dokonca rovnostranný.

**Komentár.** Úloha poskytuje mnoho prístupov k riešeniu a bude zaujímavé nechať študentov porovnať ich výsledky. Spája tiež zistenia z predchádzajúcich úloh, v niektorých prípadoch študenti využijú Euklidovu vetu a nezaobídu sa ani bez zručnej manipulácie s algebraickými výrazmi.

**Riešenie\*.** Vrchol  $B$  je určený polpriamkou  $AT$  a kolmicou  $p$  na výšku  $AP$  v bode  $P$  (obr. 4), na ktorej leží strana  $BC$ . Pritom bod  $T$  musí byť vnútorným bodom úsečky  $AB$ . Stred  $S$  kružnice vpísanej trojuholníku  $ABC$  potom dostaneme ako priesečník kolmice  $q$  na priamku  $AT$  v bode  $T$  s osou uhla



ohraničeného priamkou  $p$  a polpriamkou  $BA$ . Jej polomer bude mať veľkosť  $|ST|$ .

Odtiaľ vyplýva *konštrukcia*:

- Diskusia.* Bod  $B$  konštruovaný v 2. kroku existuje, len ak uhol  $PAT$  je ostrý (inak ani polpriamka  $AT$  nepretne priamku  $p$ ) a zároveň bod  $T$  leží vnútri polroviny  $pA$ , čo je ekvivalentné s tým, že aj uhol  $APT$  je ostrý. Body  $S_1, S_2$  existujú vždy a sú rôzne, lebo ležia v opačných polrovinách určených priamkou  $AB$ . Kružnica vpísaná leží celá v trojuholníku  $ABC$ , a teda i v páse určenom priamkou  $p$  a priamkou s ňou rovnobežnou, ktorá prechádza vrcholom  $A$ , takže stred  $S$  vpísanej kružnice musí padnúť do pásu tvoreného priamkou  $p$  a priamkou  $p'$  s ňou rovnobežnou, ktorá rozpoľuje výšku  $AP$ . V takom prípade dotyčnica ku kružnici ( $S; |ST|$ ) (súmerne združená s dotyčnicou  $AB$  podľa priamky  $AS$ ) určite pretne priamku  $p$  v hľadanom vrchole  $C$ .

5


0 až 2 podľa toho, koľko zo zostrojených bodov  $S_1$  a  $S_2$  leží medzi rovnobežkami  $p$  a  $p'$ .

**Komentár.** V posledných rokoch sa v MO nevyskytlo veľké množstvo konštrukčných úloh. Napriek tomu však považujeme za dôležité vyriešiť so študentmi aspoň jeden takýto problém a poukázať na to, že zostrojením vyhovujúceho útvaru riešenie úlohy nekončí a je potrebné uviesť aj diskusiu, ktorá je častokrát aspoň tak náročná ako vhodná konštrukcia. Zaradenie úlohy v tomto seminári považujeme za vhodné tiež preto, lebo úloha využíva vlastnosti kružnice vpísanej, a tak so ňou uzavrie toto seminárne stretnutie.

## Domáca práca

**Úloha 13.6.** [59-I-4] Kružnica  $k(S; r)$  sa dotýka priamky  $AB$  v bode  $A$ . Kružnica  $l(T; s)$  sa dotýka priamky  $AB$  v bode  $B$  a pretína kružnicu  $k$  v krajných bodoch  $C, D$  jej priemeru. Vyjadrite dĺžku a úsečky  $AB$  pomocou polomerov  $r, s$ . Dokážte ďalej, že priesečník  $M$  priamok  $CD, AB$  je stredom úsečky  $AB$ .

**Riešenie\*.** Keďže kružnica  $l$  má ako tetivu priemer  $CD$  kružnice  $k$  a dané kružnice nie sú totožné, platí pre ich polomery nerovnosť  $s > r$ . Ak označíme  $P$  päť kolmice z bodu  $S$  na úsečku  $BT$  (obr. 5), tak z Pytagorovej vety pre pravouhlé trojuholníky  $CST$  a  $SPT$  vyplýva



Obr. 5:

$$|ST|^2 = s^2 - r^2 \quad \text{a} \quad |ST|^2 = |SP|^2 + (s - r)^2. \quad (5)$$

Odtiaľ pre veľkosť úsečky  $SP$  vychádza

$$|SP|^2 = (s^2 - r^2) - (s - r)^2 = 2r(s - r).$$

A keďže  $ABPS$  je pravouholník, dostávame

$$|AB| = |SP| = \sqrt{2r(s - r)}.$$

Z pravouhlých trojuholníkov  $AMS$  a  $MTS$  ďalej podľa prvej rovnosti v 5 vyplýva

$$|AM|^2 = |SM|^2 - r^2 = |MT|^2 - |ST|^2 - r^2 = |MT|^2 - s^2,$$

pritom z pravouhlého trojuholníka  $MBT$  máme

$$|BM|^2 = |MT|^2 - s^2.$$

Preto  $|AM| = |BM|$  a bod  $M$  je teda stredom úsečky  $AB$ .

*Poznámka.* Záver, že  $M$  je stredom úsečky  $AB$ , vyplýva okamžite aj z mocnosti bodu  $M$  k oboj kružniciam (bod  $M$  leží na tzv. chordále oboch kružníc). Tieto pojmy sú však pre súťažiacich kategórie C zväčša neznáme a nebudú nutné ani pre riešenia ďalších súťažných kôl.

**Úloha 13.7.** [61-I-2] Dĺžky strán trojuholníka sú v metroch vyjadrené celými číslami. Určte ich, ak má trojuholník obvod 72 m a ak je najdlhšia strana trojuholníka rozdelená bodom dotyku vpísanej kružnice v pomere 3 : 4.

**Riešenie\*.** Využijeme všeobecný poznatok, že body dotyku vpísanej kružnice delia hranicu trojuholníka na šesť úsečiek, a to tak, že každé dve z nich, ktoré vychádzajú z toho istého vrcholu trojuholníka, sú zhodné. (Dotyčnice z daného bodu k danej kružnici sú totiž súmerne združené podľa spojnice daného bodu so stredom danej kružnice.)

V našej úlohe je najdlhšia strana trojuholníka rozdelená na úseky, ktorých dĺžky označíme  $3x$  a  $4x$ ; dĺžku úsekov z vrcholu oproti najdlhšej strane označíme  $y$  (obr. 6). Strany trojuholníka majú teda dĺžky  $7x$ ,  $4x + y$  a  $3x + y$ , kde  $x$ ,  $y$  sú neznáme kladné čísla (dĺžky berieme bez jednotiek). Ak má byť  $7x$  dĺžka najdlhšej strany, musí platiť  $7x > 4x + y$ , čiže  $3x > y$ . Zdôraznime, že hľadané čísla  $x, y$  nemusia byť nutne celé, podľa zadania to však platí o číslach  $7x$ ,  $4x + y$  a  $3x + y$ . Údaj o obvode



Obr. 6:

trojuholníka zapíšeme rovnosťou

$$72 = 7x + (3x + y) + (4x + y), \quad \text{čiže} \quad 36 = 7x + y.$$

Pretože  $7x$  je celé číslo, je celé i číslo  $y = 36 - 7x$ ; a pretože podľa zadania i čísla  $4x + y$  a  $3x + y$  sú celé, je celé i číslo  $x = (4x + y) - (3x + y)$ . Preto od tohto okamihu už hľadáme dvojice celých kladných čísel  $x, y$ , pre ktoré platí

$$3x > y \quad \text{a} \quad 7x + y = 36.$$

Odtiaľ vyplýva  $7x < 36 < 7x + 3x = 10x$ , teda  $x \leq 5$  a súčasne  $x \geq 4$ .

Pre  $x = 4$  je  $y = 8$  a  $(7x, 4x + y, 3x + y) = (28, 24, 20)$ , pre  $x = 5$  je  $y = 1$  a  $(7x, 4x + y, 3x + y) = (35, 21, 16)$ . Strany trojuholníka sú teda  $(28, 24, 20)$  alebo  $(35, 21, 16)$ . (Trojuholníkové nerovnosti sú zrejme splnené.)