

Report delle Attività 2025

Riforestazione Salento post Xylella
Zona Cuturni (Carpignano Salentino (LE))

1. Informazioni Generali sul progetto	1
1.1 Caratteristiche del progetto	2
2. Identificazione degli SSR (Sorgenti, Assorbitori e Serbatoi) di GHG Pertinenti	3
2.1 Serbatoi di Carbonio Inclusi:	3
2.2 Gas Serra Inclusi/Esclusi e Giustificazione:	3
3. Attività di monitoraggio su campo	3
4. Attività di monitoraggio da remoto	4
5. Determinazione della Baseline (Scenario di Riferimento)	4
5.1 Descrizione dello Scenario di Riferimento Storico	4
5.2 Periodo di Riferimento	4
5.3 Quantificazione delle Rimozioni Nette di GHG nella Baseline (CRbaseline)	5
5.4 Quantificazione delle Emissioni di GHG nello Scenario di Baseline (GHGbsl)	5
6. Quantificazione delle Riduzioni/Rimozioni di GHG (Scenario di Progetto)	5
7. Valutazione dell'Addizionalità	9

1. Informazioni Generali sul progetto

Proponente del Progetto	OLIVAMI ETS
Titolo del progetto	Riforestazione Salento post Xylella - Zona Cuturni (Carpignano Salentino (LE))
Obiettivo del progetto	Aumentare il sequestro di CO ₂ atmosferica attraverso la piantumazione di ulivi, ripristinando la biomassa persa a causa del batterio Xylella, e generando crediti di carbonio nel Mercato Volontario del Carbonio.
Tipo di progetto	Rimboschimento/Riforestazione agricola.
Localizzazione del progetto	Carpignano Salentino, Lecce, Puglia, Italia.

Data di Avviamento delle Attività	2020 (data di piantumazione)
Periodo di rilevazione	Marzo 2025
Impegno a Lungo Termine	Il progettista si impegna a mantenere gli asset verdi e la compensazione del carbonio per un minimo di 20 anni dalla data di onboarding, conformemente ai requisiti TCR.

1.1 Caratteristiche del progetto

Coordinate	40°12'43.11" N; 18°20'34.18" E
Area del progetto (ettari)	9.23.40 ettari
Specie Piantate	Alberi di ulivo varietà Leccino. La varietà "Leccino" è autoctona della regione mediterranea, garantendo la conformità con il requisito di utilizzo di specie non invasive/preferibilmente autoctone.
Numero di alberi piantati	2.342
Altezza media (H)	3,15 metri
Circonferenza media a petto d'uomo	35 centimetri
Età media	6 anni
Densità di piantumazione	253 alberi/ettaro

2. Identificazione degli SSR (Sorgenti, Assorbitori e Serbatoi) di GHG Pertinenti

Gli SSR di GHG pertinenti al progetto e allo scenario di riferimento sono identificati e classificati come segue.

2.1 Serbatoi di Carbonio Inclusi

Biomassa Vivente:

- **Massa Soprasuolo (AGB - Above Ground Biomass):** Tronchi, rami e foglie degli ulivi piantati.
- **Massa Sottosuolo (BGB - Below Ground Biomass):** Radici degli ulivi piantati.
 - **Carbonio Organico del Suolo (SOC - Soil Organic Carbon):** Cambiamenti nello stock di carbonio organico minerale del suolo dovuti alle pratiche di riforestazione e gestione del suolo.
 - **Prodotti Legnosi Raccolti (HWP):** Non applicabile in questo contesto, poiché gli ulivi sono primariamente per la produzione di frutti e non per il legname. Pertanto, questo pool è escluso dalla quantificazione.

2.2 Gas Serra Inclusi/Esclusi e Giustificazione

CO₂: Inclusa per la quantificazione del sequestro di carbonio nella biomassa e nel suolo.

CH₄ (Metano) e N₂O (Protossido di Azoto): Le emissioni da metanogenesi del suolo, fermentazione enterica del bestiame e deposizione di letame sono generalmente escluse per la loro trascurabilità in contesti di riforestazione agricola senza allevamento intensivo. Le emissioni di CO₂ da combustibili fossili per le operazioni di piantumazione e gestione sono considerate minime e saranno contabilizzate se significative, altrimenti considerate trascurabili per un approccio conservativo. Le emissioni da bruciatura di biomassa non sono consentite dal TCR.

3. Attività di monitoraggio su campo

Le attività di monitoraggio sul campo si sono concentrate sulla rilevazione delle caratteristiche di un campione di ulivi coinvolti nel progetto.

Numero di alberi piantati	2.342
---------------------------	-------

Altezza media (H)	3,15 metri
Circonferenza media a petto d'uomo	35 centimetri
Età media	6 anni
Densità di piantumazione	253 alberi/ettaro

4. Attività di monitoraggio da remoto

{{immagine satellite}}

{{foto di campo}}

{eventuale foto a pianta}}

5. Determinazione della Baseline (Scenario di Riferimento)

5.1 Descrizione dello Scenario di Riferimento Storico

Prima del progetto, il terreno presentava ulivi secolari morti a causa del batterio Xylella che erano stati rimossi. In assenza di intervento (riforestazione), si sarebbe assistito alla continuazione della degradazione del terreno, con minima o nessuna ripristino del sequestro di carbonio e potenziale erosione del suolo. Non essendoci pratiche agricole convenzionali significative (coltivazione continua, monocoltura, aratura a terreno nudo, uso di fertilizzanti chimici) in atto sul terreno degradato, le emissioni associate sarebbero state minime.

5.2 Periodo di Riferimento

Il periodo di riferimento sono i tre anni precedenti l'inizio del progetto (2017-2019) per confermare l'assenza di gestione attiva del carbonio nel terreno post-Xylella.

5.3 Quantificazione delle Rimozioni Nette di GHG nella Baseline (CRbaseline)

Dato che la condizione pre-progetto era caratterizzata da ulivi morti e rimossi, senza alcuna attività di sequestro di carbonio in atto, si assume per un approccio conservativo che le rimozioni nette di carbonio nella baseline siano pari a **0 tCO₂e/anno** per la biomassa. Qualsiasi perdita di SOC dal terreno precedentemente coltivato (se del caso) è anch'essa considerata pari a zero per conservatività.

5.4 Quantificazione delle Emissioni di GHG nello Scenario di Baseline (GHGbsl)

Si assume che le emissioni dirette e indirette derivanti da attività agricole convenzionali (es. consumo di combustibili fossili, fertilizzanti) nella baseline siano state minime o nulle, dato lo stato di degrado del terreno. Pertanto, **GHGbsl = 0 tCO₂e/anno**.

6. Quantificazione delle Riduzioni/Rimozioni di GHG (Scenario di Progetto)

Il beneficio netto di rimozione del carbonio è quantificato confrontando le rimozioni di GHG nel progetto rispetto alla baseline e sottraendo eventuali aumenti di emissioni del progetto.

6.1. Calcoli per la quantificazione del beneficio netto di progetto

- **Formula Generale per il Beneficio Netto di Rimozione:** Beneficio Netto di Rimozione = Rimozioni Totali di Progetto (CRtotal) - Rimozioni Nette di Baseline (CRbaseline) - Aumento Emissioni di Progetto (GHGincrease).
- **Parametri e Valori di Riferimento Utilizzati**

Valore	Coefficiente	Unità di misura	Dettaglio	Fonte
ρ (rho)	1100	Kg/m ³	Densità media del legno	IPCC 2006 - Tabella 4.13 (Guillielma gasipae - valore medio - densità assimilabile)
BEF	2,1		Fattore di espansione della biomassa	IPCC 1996 - Tabella 3A.1.10
R	0,47		Rapporto radici/parte aerea	IPCC 2006 - Tabella 4.4
CF	0,48		Percentuale di carbonio nella biomassa	IPCC 2006 - Tabella 4.3

- **Calcolo delle Rimozioni Totali di Progetto (CR_{total}):** Le rimozioni sono calcolate principalmente dal sequestro di carbonio nella biomassa vivente (soprasuolo e sottosuolo) degli ulivi. Le misurazioni sono riferite ai 3 anni di crescita dal 2022 (t₀) al 2025 (t₁).

- **Calcolo per singolo albero (alla fine del 3° anno di crescita, marzo 2025):**

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
Area Basale (BA)	$BA = \pi \times (DBH/2)^2$	0,0098	m ²
Volume dell'albero	$V = BA \times H$	0,0307	m ³
BCEF	$BCEF = BEF \times \rho$	2.310,00	Kg/m ³
Biomassa Soprasuolo (AGB) per albero	$AGB = BCEF \times V$	70,9690	Kg di materia secca (d.m.) per albero
Biomassa Sottosuolo (BGB) per albero	$BGB = AGB \times R$	33,3555	Kg d.m. per albero
Biomassa Totale per albero	$Totale = AGB + BGB$	104,3245	Kg d.m. per albero
Stock di Carbonio nella Biomassa (CS _{biomassa}) per albero	$CS_{biomassa} = Totale\ Biomassa \times CF$	50,0758	Kg di Carbonio (C) per albero
CO ₂ e sottratta per albero	$CO_{2e_albero} = CS_{biomassa} \times (44/12)$	183,61	Kg di CO ₂ e

- **Stock di Carbonio nella Biomassa per l'intera area di progetto (fino a marzo 2025 - periodo di rilevazione):**

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
Stock Totale di Carbonio nella Biomassa (CSbiomassa_progetto)	$STCProgetto = \text{numero di alberi} \times CSbiomassa$	117.277,43	Kg di Carbonio (C)

○ **Variazione dello Stock di Carbonio (ΔC) da biomassa:**

- Il progetto ha avuto inizio nel 2020 (t_0). Al momento t_0 , corrispondente alla piantumazione, lo stock di carbonio era pari a zero. Nel 2025 (t_1) viene invece determinato il contenuto di carbonio della pianta:

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
Variazione Annuale dello Stock di Carbonio (ΔC) da biomassa	$\Delta C_{biomassa_progetto} = (CS_{biomassa_progetto_t1} - CS_{biomassa_progetto_t0}) / (t1 - t0)$	117.277,43	ΔKg di Carbonio

○ **Rimozione di CO_2 equivalente (ΔCO_2e) da biomassa:**

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
Rimozione di CO_2 equivalente (ΔCO_2e) da biomassa	$(44/12) \times \Delta C_{biomassa_progetto}$	430.017,25	$\Delta Kg CO_2e$

○ **Rimozione di CO_2 equivalente (ΔCO_2e) realizzata dal progetto (in tonnellate)**

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
Rimozione di CO_2 equivalente realizzata dal progetto	$\text{Rimozione di } CO_2 \text{ equivalente } (\Delta CO_2e) \text{ da biomassa} / 1000$	430,02	Tonnellate di CO_2e

- **Carbonio Organico del Suolo (SOC):** La quantificazione del SOC richiede misurazioni dirette nel tempo (minimo ogni 3-5 anni o prima di ogni verifica) utilizzando metodi standardizzati come Walkley & Black. Senza dati di campo specifici (Densità Apparente (BD), Percentuale di Carbonio (C%), Profondità di Campionamento (D), Frazione di Frammenti Grossolani (F)), non è

possibile fornire una quantificazione numerica per questo PDD simulato.
Tuttavia, la metodologia di calcolo è:

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
SOC (Carbonio Organico del Suolo)	$BD \times C\% \times D \times (1 - F)$		Tonnellate di CO ₂ e

La variazione annuale del SOC è calcolata come:

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
ΔSOC (Carbonio Organico del Suolo)	$(SOC_{t1} - SOC_{t0}) / (t1 - t0)$		ΔTonnellate di CO ₂ e

Si prevede che il progetto di riforestazione, attraverso pratiche di gestione sostenibile del suolo, possa contribuire a un aumento del SOC rispetto alla condizione degradata pre-progetto. Per il momento, questo valore non è incluso nella CRTotal numerica.

CRtotal (Totale): le rimozioni totali di progetto (CRtotal) derivano interamente dal sequestro di carbonio nella biomassa degli alberi, data la mancanza di dati specifici per il SOC.

CRtotal = 430,02 tCO₂e (solo da biomassa).

- **Calcolo dell'Aumento delle Emissioni di Progetto (GHGincrease):** Si assume che le attività del progetto (principalmente piantumazione e gestione minimale degli ulivi) hanno generato un aumento trascurabile delle emissioni di GHG (es. consumo di carburante per mezzi agricoli, uso di fertilizzanti in un contesto di pratiche sostenibili), rispetto a una baseline di terreno degradato. In un progetto di carbon farming, tali emissioni sono tipicamente ridotte al minimo o inferiori allo scenario BAU. Pertanto, **GHGincrease = 0 tCO₂e/anno**.
- **Calcolo del Beneficio Netto di Rimozione del Carbonio:** Utilizzando l'interpretazione logica della formula TCR:

Beneficio Netto = Rimozioni Totali di Progetto (CRtotal) - Rimozioni Nette di Baseline (CRbaseline) - Aumento Emissioni di Progetto (GHGincrease)

Beneficio Netto = 430,02 tCO₂e (CRtotal) - 0 tCO₂e (CRbaseline) - 0 tCO₂e (GHGincrease)

Beneficio Netto = 430,02 tCO₂e

6.2 Buffer di Permanenza

Seguendo quanto indicato dallo standard TCR, si accantona un *buffer* pari al **10%** delle unità di rimozione del carbonio generate. Questo *buffer* è destinato a coprire eventuali perdite future dovute a eventi imprevedibili (es. disastri naturali, incendi, nuove patologie).

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
Buffer di permanenza	Rimozione di CO ₂ equivalente realizzata dal progetto x 10%	43,00	Tonnellate di CO ₂ e

La rimozione netta di CO₂ realizzata dal progetto, sarà quindi pari a:

Dato	Formula	Valore	Unità di misura
Rimozione netta di CO ₂ equivalente realizzata dal progetto	Rimozione di CO ₂ equivalente realizzata dal progetto - Buffer di Permanenza	387,02	Tonnellate di CO ₂ e

6.3 Quantità di crediti generata dal progetto

Il progetto, in conformità alla metodologia **TCR**, ha generato nel periodo di riferimento **430,02 tonnellate** di rimozioni di CO₂ equivalente.

Di tale quantitativo, il **10%** (pari a **43,00 tonnellate**) sarà destinato al *buffer di permanenza*, a garanzia di eventuali perdite future.

Il quantitativo rimanente, pari a **387,02 tonnellate**, corrisponde ai crediti di carbonio effettivamente generati dal progetto:

- **387 crediti** saranno immediatamente disponibili;
- **0,02 crediti** verranno accantonati come riserva e sommati a quelli maturati nell'anno successivo.

7. Valutazione dell'Addizionalità

Il progetto dimostra addizionalità in quanto i benefici climatici (sequestro di CO₂) non si sarebbero verificati in assenza dell'intervento di riforestazione, specialmente in un'area colpita dal batterio *Xylella* che ha portato alla morte degli alberi e alla necessità di bonifica.

- **Assenza di Obbligo Legale:** La riforestazione non è imposta da alcuna prescrizione di legge obbligatoria per l'area di studio.
- **Addizionalità Finanziaria:** L'investimento nella piantumazione e gestione di un uliveto dopo una calamità come la *Xylella* rappresenta un rischio significativo. La

vendita dei crediti di carbonio fornisce un incentivo finanziario cruciale che rende il progetto economicamente sostenibile e attraente, altrimenti non attuabile.

- **Superamento dello Scenario BAU:** La ripiantumazione su larga scala di ulivi in un'area devastata dalla Xylella supera chiaramente le pratiche "business-as-usual" di semplice abbandono o minimizzazione degli investimenti.