

一封公开信，致各位新冠病友和即将阳的朋友，做对了病在萌芽阶段就截住！

原创 二羊 养阳医斋 2022年12月20日 12:13 广东

致新冠发烧病友公开信：

大家好！根据我亲身的经历加这两周每天都看大量发热新冠病人。得出几点知识，请大家知晓！

- 1.首先这个病不可怕，大家不用过于担心惶恐和焦虑！
- 2.如果你是刚起病，那恭喜你。接下来你的身心将有一次共同深入参加抗病毒免疫战役！
- 3.这场免疫战役必定要发烧，这是也是清楚病毒的必要和必须过程，大家没必要排斥发烧！
- 4.既然发烧是为了“灭毒”那就让烧飞一小段时间，让身体停下来，平躺休息盖被子！将心神收回来看看这个病毒是怎么对待我们的。38.5以下都不用担心！
- 5.这个过程你会经历以下痛苦过程：全身疼痛，头痛欲裂，嗓子吞刀，胸闷气短等。请你稍微忍一忍！
- 6.二羊能帮助大家的是尽量缩短这个痛苦的过程，不能代替你的身体去免疫，该经历的你自已得去承受！
- 7.这个过程多久可以过去？快的一天，慢的两三天，这是二羊能力范围内的。但不可能选择直接跳过！
- 8.没有用过退烧西药的朋友欢迎你的一次尝试中药治疗，就是将身心合一一起共同抗敌，这个过程有点痛苦但熬过去你一定会笑的！
- 9.已经用过西药退烧，且反复还在烧（过了四天），或者用了也退不下来的朋友，请注意这时候你的身体是一种混乱状态，我需要详细了解后再重新建立一道防线，困难程度会高很多！需要了解更多信息。
- 10.这个寒冬有点难过，我们终将顺利过去。我们用中医方法共同打赢的这场战役，赢

来的免疫力会帮助我们一辈子！小孩尤其珍贵！望珍惜！

二羊.中医

2022.12.19

取消

保存

经方版
第1天

第2天

第3天

第4天

后

新冠发病7日图

中医经方“逆天”图

北京佑安医院感染综合科主任医师、小汤山方舱医院医疗专家李侗曾总结了一份普通中青年患者感染新冠病毒后，从发病第1天到第7天核酸转阴的“症状分析”。

乏力，咽喉不适，发热恶寒

第1天

症状较轻。可能感到轻微咽干咽痛、身体乏力。



怕冷发烧，剧烈头痛，身体痛（腰臀尤其

第2天

开始出现发热症状，部分年轻人高烧至39摄氏度左右。同时咽部不适感加重。



烧退或低烧，咽喉痛

第3天

症状最重的一天。高热39摄氏度以上，浑身酸疼乏力，咽痛加剧。



第4天

体温的高峰开始下降。很多人从这一天体温降为正常，不再发热，但仍然咽痛咽痒。一部分人开始流涕、咳嗽。



第5天

体温基本降到正常。但是鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽，身体乏力仍然存在。



少许咽痛，偶咳嗽，体力恢复

第6天

不再发热。咳嗽、流涕等症状加重。前期病毒导致的呼吸道黏膜破坏，人体通过流涕、咳嗽排出坏死的细胞。



第7天

所有的症状开始明显好转。核酸很大可能转阴。



没有反复咳嗽，反复发烧

味觉嗅觉丧失没机会体验

恶寒
怕冷
是关键

可发汗

汗解

小汗

中医二羊版新冠症状流程



用纯中医方法，我自己三天差不多好了，我的孩子1岁九个月也就两天走出来了！
所以大家请提前准备，及时治疗！不能单纯依赖止痛药来消除疼痛，我们烧多最多两天可退并无太多不适！

大家可以参考主流医学的方法，后遗症多多！

新冠发病7日典型症状过程

症状/ 发病天数	发热	咽干咽痛	身体乏力	咳嗽咳痰	流涕/鼻塞	肠胃不适	核酸情况	总体情况
第1天	尚无	较轻	较轻	尚无	尚无	尚无	阳性	症状较轻
第2天	开始发热 (部分高烧至 39℃左右)	加重	加重	尚无	尚无	尚无	阳性	症状加重
第3天	高热 39℃以上	剧烈	剧烈	尚无	尚无	出现症状	阳性	症状最重
第4天	体温高峰 开始下降 (很多人 变为正常)	仍有症状	仍有症状	出现症状	出现症状	仍有症状	阳性	症状较重
第5天	体温基本 降到正常	仍有症状	仍有症状	仍有症状	仍有症状	减轻	阳性	开始好转
第6天	不再发热	减轻	减轻	加重	加重	减轻	可能转阴	持续好转
第7天	明显好转	明显好转	明显好转	明显好转	明显好转	明显好转	很大可能 转阴	明显好转
对症 常用 药物	对乙酰氨基 酚、布洛 芬、阿司匹 林、金花清 感颗粒、 连花清瘟颗 粒/胶囊、宣 肺败毒颗 粒、清肺排 毒颗粒、疏 风解毒胶囊 等	地喹氯铵、 六神丸、清 咽滴丸、疏 风解毒胶囊 等		咳嗽咳痰： 溴己新、氨 溴索、愈创 甘油醚、乙 酰半胱氨酸 等 干咳无痰： 福尔可定、 右美沙芬等	流鼻涕： 氯苯那敏、 氯雷他定、 西替利嗪等 鼻塞： 赛洛唑啉滴 鼻剂等	恶心呕吐： 桂利嗪、 藿香正气水 /胶囊等	特别提示 用药须按药品说 明书服用或咨询 医生；不要重复 吃多种退烧药； 退烧药和复方感 冒药不要叠加使 用，一旦过量对 身体有损害	
注意 事项	居家治疗人 员应当每天 早、晚各进 行1次体温测 量和自我健 康监测。	如出现发 热、咳嗽等 症状，可进 行对症处置 或口服药治 疗。	有需要时也可 联系基层 医疗卫生机构 医务人员 或通过互联 网医疗形式 咨询相关医 疗机构。	无症状者无 需药物治 疗。	居家治疗人 员服药时， 须按药品说 明书服用， 避免盲目使 用抗菌药 物。	如患有基础 疾病，在病 情稳定时， 无需改变正 在使用的基 础疾病治疗 药物剂量。		

备注：


- 1.普通中青年的发病过程一般适用于以上情况。但个体症状因人而异。
- 2.接种过新冠疫苗并完成加强免疫的人群病程更短、病情更轻。

3.部分老年人，尤其是70岁以上有基础疾病的病程更为复杂。

4.从临床看，儿童和成人感染后症状和病程有明显差异：成人感染3天内发病，儿童多在1天内发病；儿童初期症状是以发热为主，热退伴有消化道症状。

资料综合自国家卫健委、北京市卫健委、央视新闻、北京新闻广播、北京日报

 养阳医斋



二羊

“ 码字不易，感谢支持 ”

 稀罕作者

疫情 · 目录

〈 上一篇

新冠发烧身体痛！30多个例1剂病退！关键第一步你得这样做

下一篇〉

新冠五个疑难退烧案，这类高烧发不出汗！怎么办