

中医二羊，伤寒论笔记之麻黄类方总结

原创 二羊 养阳医斋 2019年11月15日 09:21

大家好，我是中医二羊，继续跟大家总结的麻黄汤类方，归纳起来看这些方子也不用死记硬背，更不需要生搬硬套，知道变通法则才是关键。继续分享二羊学习伤寒论的笔记，我命名为“原味伤寒论”旨在客观总结原文，尽量少的自我发挥。



麻黄类方部分笔记分享

十二、葛根汤方

【组成】葛根12克，麻黄9克，桂枝6克，生姜9克，芍药6克，炙甘草6克，大枣4枚

【原文】

《伤寒论》第31条：太阳病，项背强几几、无汗恶风，葛根汤主之。

《伤寒论》第32条：太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。

《金匮要略痉湿喝病》第12条：太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。

【辨证要点】太阳病，项背强几几、无汗恶风或见下利者。

十三、葛根加半夏汤方

【组成】葛根12克，麻黄9克，桂枝6克，生姜9克，芍药6克，炙甘草6克，大枣4枚，半夏12克

【原文】

《伤寒论》第33条：太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。

【辨证要点】葛根汤证兼见呕逆或下利者。

十四、桂枝麻黄各半汤方

【组成】桂枝5克，芍药、生姜、炙甘草、麻黄、杏仁各3克，大枣2枚

【原文】

《伤寒论》第23条：太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发。脉微缓者，为欲愈也；脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下，更吐也；面色反有热色者，未欲解也，以其不得小汗出，身必痒、宜桂枝麻黄各半汤。

【辨证要点】太阳病发热恶寒见身痒者。

十五、桂枝二麻黄一汤方

【方剂组成】麻黄3克，桂枝6克，芍药6克，生姜6克，炙甘草4克，杏仁3克，大枣2枚

【方解】取桂枝汤二、麻黄汤一合之，故治桂枝汤证多而麻黄汤证少者。

【原文】

《伤寒论》第25条：服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤，如前法。若形似疟，一日再发者。汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

若其人形如疟，日再次发寒热者，此与上之桂枝麻黄各半汤证大致同，小汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

【辨证要点】桂枝汤证多而麻黄汤证少者。


十六、桂枝二越婢一汤方

【组成】桂枝、芍药、麻黄、炙甘草各3克，大枣2枚，生姜5克，石膏5克

【原文】

《伤寒论》第27条：太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。

【辨证要点】桂枝汤证多，越婢汤证少者。



十七、大青龙汤方

【组成】麻黄18克，桂枝6克，炙甘草6克，杏仁6克，生姜9克，大枣4枚，生石膏45 ~ 100克

【用法】先煮麻黄一二沸，去上沫，再内诸药，煮取一杯，温服，取微似汗。汗多者，温粉覆之。一服汗者，停后服。若复服，汗多亡阳，遂虚，恶风、烦躁、不得眠也。

【方解】此即桂枝汤与越婢汤的合方，故治二方的合并证。

【原文】

《伤寒论》第38条：太阳中风，脉浮紧，发热恶寒身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之；若脉微弱、汗出恶风者，不可服之。服之则厥逆、筋惕肉_，此为逆也。

《伤寒论》第39条：伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。

《金匱要略痰饮咳嗽病》第23条：病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之。小青龙汤亦主之。

《金匱要略》曰：“饮水流行，归于四肢，当汗而不汗出、身体肿重谓之溢饮”。大青龙汤主之，小青龙汤亦主之者，谓发汗以治溢饮的作用二方同，但宜依证选一而用之，不是说二方主同一证。

【辨证要点】桂枝扬证、越婢汤证并见者。

十八、文蛤汤方

【组成】文蛤15克，麻黄9克，炙甘草9克，生姜9克，生石膏15克，杏仁9克，大枣4枚

【方解】此为麻杏甘石汤与越婢汤合方，再加酸敛止渴的文蛤，故治麻杏甘石汤与越婢汤的合并证而渴者。

【原文】

《金匱要略呕吐下利病》第19条：吐后渴欲得水，而贪饮者，文蛤汤主之。兼主微风、脉紧、头痛。

《伤寒论》第141条：病在阳，应以汗解之，反以冷水□之、若灌之，其热被劫不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散（文蛤汤）；若不差者，与五苓散。

【辨证要点】麻杏甘石汤证合并越婢汤证又见口渴明显者。

十九、小青龙汤方

【组成】麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝各9克，五味子12克，半夏15克

【原文】

《伤寒论》第40条：伤寒表不解，心下有水气，干呕、发热而咳，或咳、或利、或噎、或小便不利、少腹满、或喘者，小青龙汤主之。

《伤寒论》第41条：伤寒，心下有水气。咳而微喘，发热不渴，服汤已渴者，此寒去欲解也，小青龙汤主之。

《金匱要略痰饮咳嗽病》第35条：咳逆倚息不得卧，小青龙汤主之。

《金匱要略痰饮咳嗽病》第23条：病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之，小青龙汤亦主之。

《金匱要略妇人杂病》第7条：妇人吐涎沫，医反下之，心下即痞，当先治其吐涎沫，小青龙汤主之；涎沫止，乃治痞，泻心汤主之。

【辨证要点】外邪里饮而致咳喘者。

二十、小青龙加石膏汤方

【组成】麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝各9克，五味子12克，半夏15克，石膏30～60克

【原文】

《金匱要略肺痿肺痛咳嗽上气病》第14条：肺胀，咳而上气，烦燥而喘，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏汤主之。

【辨证要点】小青龙汤证兼烦躁者。**总结：**

辛温解表第二拨：

- 1、太阳病，病在表，以项背僵硬为主，核心药为葛根一味。葛根汤为代表，呕则加半夏，
- 2、解表轻剂：桂枝汤合麻黄汤取一定比例来用，详细参本序列第七篇

解表轻剂、小发汗	症状	脉	汗	要点
桂枝二麻黄一汤	发热恶寒、热多寒少	洪大	有汗	偏表虚，重桂枝
桂枝麻黄各半汤	形如疟，日再发	微	无汗	偏表实，重麻黄
桂枝二越婢一汤	发热恶寒、热多寒少	微弱	无汗	表未解，津液不足、入阳明化里热


3、外有太阳表合并里证

里有热--大青龙汤

里有水饮--小青龙汤，夹热加石膏

里有热、水气--**文蛤汤方**

更多总结：



本系类全套文章已经全部将陆续更新于今日头条“中医二羊”的专栏《原味伤寒论》，如有兴趣可自行查看。

后续不再更新此处，本号后续会陆续分享二羊的临床案例：《经方临证录》

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。



如果对你有帮助，欢迎分享

中医二羊

广州中医药大学中医硕士，主导针药并治的大中医观，一个推崇经典古中医的80后中医。

一个铁杆中医脑残粉。有一味赤色栀子心，胸怀山中药，愿为熊胆使君子，继四圣岐黄之术。

长按指纹
一键关注



微信号: 养阳医斋



微信ID: yytcm100



二羊

“ 码字不易，感谢支持 ”

👍 喜欢作者

伤寒论学习、应用、体会 · 目录

《 上一篇

中医二羊：伤寒论六经辨证小结

下一篇 >

伤寒论桂枝汤为经方之首，会用了中医算入门，懂变了中医可入行