

寒潮来袭请大家务必准备好！治感冒发烧的10大经方，而不是莲花清瘟


原创 二羊 养阳医斋 2022年11月30日 09:28 广东

在朋友圈看到兰州的网友分享的“一个中学老师的朋友圈求助”孩子呆在零下环境抱病挣扎！又看到广州天河区大学生连夜撤离，我突然才想提醒大家，这些方药赶紧去准备！


寒潮来袭，普通感冒发烧都会增加，再加上疫情，真的都是雪上加霜！今天一大早起来广州的气温也降了很多，于是赶紧的！我又不厌其烦的提醒大家，这些方药赶紧去准备一些。

说不定能救自己和家人还有身边的朋友！主要是很多地方连治感冒发烧中成药也不给卖了！那就直接准备中药。

感冒发烧经方试用指南，倪海厦整理：



感冒治症簡易圖表(三)




註1：鼻塞嚴重則另加【辛夷+蒼朮+石菖蒲】

註2：女子月經期感冒一律使用小柴胡湯

註3：鼻塞/ 頭身痛 + 無汗+口不渴+怕冷+四肢冰冷+疲累→麻黃附子細辛湯

感冒治症簡易圖表(二)



註1：女子月經期感冒一律使用小柴胡湯，若咳嗽加厚朴杏仁、喉嚨痛加葛根

註2：小青龍湯症但表症(惡寒發熱頭痛)不明顯→射干麻黃湯

註3：咳嗽/ 喉嚨痛 + 無汗+口不渴+怕冷+四肢冰冷+疲累→麻黃附子細辛湯

如果你是受凉引起感冒发烧的症状，不管是不是新冠，可以参考以上图表来使用经方。

主要这10大经方：

葛根汤、桂枝汤、麻黄汤、小青龙汤、大青龙汤、小柴胡汤、射干麻黄汤
麻黄附子细辛汤，白虎汤，甘草桔梗汤。

对应中成药放在最后。

主要是准备这些，可以组合加减。具体说明详见以下内容，内容比较多，请务必收藏好！

感冒治症簡易圖表附註

1. 發燒+有汗+口渴欲飲冷+怕熱 → 白虎湯（陽明熱證）
2. 腸胃型感冒
 - a. 發燒、頭痛、口渴欲飲水、但一喝就吐、或有(拉肚子)水瀉 → 五苓散
 - b. 發燒+瀉肚子（肛門有灼熱感+惡臭） → 葛根苓連湯（陽明濕熱證）
 - c. 腸病毒/手足口病（施合一醫師經驗效方） → 葛根苓連湯加五苓散
 - d. 施合一醫師腸胃型感冒治症：近日腸胃型感冒常用藥方 → 附子理中湯、黃連湯、胃苓湯
3. 發燒/咳嗽/喉嚨痛/鼻塞/頭身痛+無汗+口不渴+怕冷+四肢冰冷+疲累
→ 麻黃附子細辛湯（少陰證）
4. 女子月經期間感冒宜小柴胡湯加減，或合方使用，若咳嗽加厚朴、杏仁，若喉嚨痛加葛根
5. 嚴重之喉嚨痛（伴有灼熱感），例如扁桃腺化膿，可再另加玄參、馬勃、重樓
6. 若為小青龙湯證，但表證(惡寒、發熱、頭身痛)不明顯 → 射干麻黃湯
7. 鼻塞嚴重可加辛夷、蒼朮、石菖蒲
8. 若咳嗽不癒，表示此人平時即多有痰飲體質；如(津虧)聲啞或乾咳無痰，表示此人平時多晚睡、貪食炸烤食物，或服抗生素而傷到津液
9. 感冒後容易有後遺症者，請多運動，並維持良好生活作息及飲食習慣

感冒图表使用说明

读表方式

請由最上方之有汗无汗开始读起，再依症状分支往下走到对应方剂为止。（判断重要性依序由上而下）

使用藥物選擇

【科學中藥】使用方便。【水藥】藥效較強

科學中藥使用方法

- 1、每日服用三次，早中晚餐飯前（空腹）以溫開水送服
- 2、若病情較重，可於睡前加服一次

科學中藥每次服用劑量

參考年齡	科學中藥劑量（公克）
1歲以下幼兒	0.3~0.5
1~3歲	0.5~1.5
3~6歲	1.5~2.0
6~10歲	3.0
10~14歲	4.0
14歲~18歲	5.0
18歲以上成人	6.0

- 1、此劑量僅供參考，請依體格及醫師建議酌量增減
- 2、小baby的餵食方法：請以溫開水與科中藥粉混合稀釋服送，或請父母以潔淨的手指直接沾科中粉末給小嬰兒吸允即可，盡量避免以牛奶混合服用

感冒患者必須遵守原則

- 1、飲食清淡
- 2、少食肉最佳，復原速度將更迅速
- 3、感冒癒後應在家多休息一天，可避免外出再次感冒

科學中藥單方與複方使用比例原則

（以下採18歲成人為例，其餘年齡請依比例自行換算）

- 1、每次服用總劑量6公克不變
 - 2、若使用單一種【複方】（如葛根湯），用量即為6公克
 - 3、若同時使用【複方】及【單方】（如杏仁、厚朴），其中複方佔5~4公克，單方則佔1~2公克
- 舉例1：若為『麻杏甘石湯』證，則每次用量6公克
舉例2：若為『小柴胡湯+葛根』證，比例採（5：1），假設喉嚨痛或口渴嚴重，可將比例調整為（4：2）
舉例3：若為『桂枝湯+杏仁+厚朴』證，可依咳嗽嚴重程度調整比例（5：0.5：0.5）或（4：1：1）
舉例4：若為『葛根湯+玄參+馬勃+重樓』證，可使用比例（4：0.7：0.7：0.7）

湯藥使用方法

各藥方之參考劑量及使用法請詳見後列附件資料，實際使用量請依合格中醫師處方。小孩服用量依照與成人體重之比例，如60公斤成人需喝一碗，30公斤小孩則喝半碗

感冒治症簡易圖表使用原則

若對證下藥，病情多半24小時內可以明顯改善，如連續服用1~2日仍然無效時，應該轉方或停服，並立刻到診所就醫，避免延誤病情

重要提醒

「浸泡膽巴」或「硫磺薰製」（二氧化硫）的中藥，等同含防腐劑一樣，都會嚴重損傷肝腎，請務必慎選藥材

感謝倪海廈恩師無私的教導，並承蒙施合一、張孟浩、葉昭呈、陳彥成的協助，分享此圖表的誕生。

常见问题与说明【一】

首先感谢倪海厦恩师无私的教导、张孟浩的精心制作，及叶昭呈完美的slides show，才有此图表的诞生。

※读表的方法：请由最上方之有汗无汗开始读起，再依症状分支往下走到对应方剂为止。

1. 服用科学中药的剂量，及方法为何？

- a. 每日三次，早中晚餐飯前，空腹，温开水送服
- b. 若病情较重，可于睡前加服一次。
- c.

1岁以下幼儿	每次剂量 0.3 ~ 0.5 公克
1 ~ 3岁	每次剂量 0.5 ~ 1.5 公克
3 ~ 6岁	每次剂量 1.5 ~ 2 公克
6 ~ 10岁	每次剂量 3 公克
10 ~ 14岁	每次剂量 4 公克
14 岁以上成人	每次剂量 5 公克

此剂量仅供参考，请依体格及医师建议，酌量加减。

2. 服用多久，仍然无效时应该停服？

- a. 若对证，多半24小时以内，病情改善，如连续服用2日仍然无效时，应该转方或停服，并到诊所就医，避免延误病情。

浸泡胆巴或硫磺薰制(氧化硫)的中药,与防腐剂一样,都会严重损伤肝肾,请务必慎选药材。

3. 服药后，退烧，不再恶寒身痛(表解)，但有后遗症，如咳嗽不愈，声哑怎么办？

- a. 若是咳嗽不愈，表示此人平时即多有痰饮体质。
---如(寒性)白痰，则用苓甘姜味辛夏仁汤。
---如(热性)黄痰，则用千金苇茎汤。
《芦根、冬瓜子、桃仁、苡仁》

- b. 如(津亏)声哑，或干咳无痰，表示此人平时多晚睡，贪食炸烤食物，或服抗生素，伤到津液，则用麦门冬汤。

4. 病症看起来像似表寒桂枝汤证(有汗，恶寒，口不渴)，又有鼻流黄涕看似有热证的麻杏甘石汤证该如何选方？

- a. 恭喜，您已进入合方运用的殿堂。请用桂枝汤加麻杏甘石汤但总剂量不变。

5. 月经期间感冒喉痛，可否用小柴胡汤合葛根汤？

- a. 正确答案，但小柴胡汤量要大一些。

6. 严重之喉痛,如扁桃腺化脓,可再加桔梗,玄参,石膏

7. 若服用水药，各方之参考剂量及使用法请详见后列之投影片，实际使用量请依合格中医师处方。小孩服用量依照与成人体重之比例。如60公斤成人需喝一碗，30公斤小孩则喝半碗。

张孟超敬笔2-20-2010

伤寒论治感冒常用10大经方详细说明

第一、桂枝汤

- **桂枝汤**

- 处方内容是：桂枝10克、白芍10克、生姜二片、炙甘草10克
红枣十枚，每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，三小时空腹时喝一碗，小孩减半，服用后会得到微汗出来。

-
- 这个处方使用的最多，民众如果在服用第一碗汤药后，感冒症状就好了，就不需要去服用第二碗，服用此汤药后需要喝一点粥，来帮助药力达到四肢末梢。
- 如此就可以将感冒病毒清除于体外，病人会迅速恢复过来，使用此方时要注意病人的感冒症状，当你发现感冒病人有出汗同时全身肌肉痛，不喜欢被风吹到身体，加上一点发烧又没有胃口时，你就可以按照我说的比例来抓药服用，在服用过后的第二天中午，如果病人的胃口恢复，就代表病已经完全好了。

- 桂枝汤加葛根：桂枝汤再加入-葛根9克(3钱)，用法同桂枝汤。
- 桂枝汤加厚朴、杏仁：桂枝汤再加入-厚朴9克(3钱)、北杏仁9克(3钱)，用法同桂枝汤。

- **※桂枝汤使用时机：有汗，怕冷，头痛，有点发烧，肌肉有些酸痛**

- **※桂枝汤煮法及注意事项：**

- 以上五味药，用七碗水煮成三碗。每次温服一碗。服完药后再喝一碗热稀饭，以帮助药力。
- 喝完药后以全身微微出汗为最佳。切记不可使病人流太多汗。汗出后须擦干,避免吹风受凉.
- 若微出汗后，病状消失，则可以停药，不用再服。若是两小时后汗仍不出，可服第二碗；再不出汗，每一小时到一小时半再服一碗...余此类推。半日内可喝完三碗。若是病情比较严重，可以早晚各服用一帖药（共六碗）。
- 照顾者要在旁观察病人病情的变化。若是病状有改善，但仍未消除，可以继续服用桂枝汤。或是汗一直不出，可以连续服用到两、三帖药都可以。

二羊反复强调！喝桂枝汤一定要喝热粥和盖被子来助药力发汗！否则效果打折一半！

第二、葛根汤处方

- **葛根汤处方**

- 葛根12克(4钱) 麻黄9克(3钱) 生姜切片9克(3钱) 桂枝6克(2钱) 芍药6克(2钱) 炙甘草6克(2钱) 大枣擘(用手掰开) 12枚

- **【注意】**：有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱**来取代麻黄.

- **※葛根汤使用时机**：项强,头痛,发热,怕冷,无汗,喉咙痛.

-

- **※葛根汤煮法及注意事项**：

- 以上七味药，以水十碗，先煮麻黄、葛根，等水量减少三碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。

- 喝完药后以全身微微出汗为最佳。切记不可使病人流太多汗，汗出后须擦干,避免吹风受凉.

- 和桂枝汤不同处是使用葛根汤时，**不需要**喝稀饭助药力。

- 若微出汗后，病状消失，则可以停药，不用再服。若是两小时后汗仍不出，可服第二碗；再不出汗，每一小时到一小时半再服一碗...余此类推。半日内可喝完三碗。若是病情比较严重，可以早晚各服用一帖药（共六碗）。

- 照顾者要在旁观察病人病情的变化。若是病状有改善，但仍未消除，可以继续服用桂枝汤。或是汗一直不出，可以连续服用到两、三帖药都可以。

- 服用葛根汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

-

第三、麻黄汤

- **麻黄汤处方**

- 处方内容是：麻黄5克、桂枝10克、杏仁5克、炙甘草10克
- 付药加入三碗水然后用大火煮成一碗，空腹时服用，这个处方是专门治疗一种特殊的感冒，主要症状是非常怕冷，身体关节疼痛，发烧，没有汗，这个感冒症状多发生于冬天寒冷时，但是也有时会发生在夏天，大家只要记住一点，只要出现这个症状就可以使用它，唯一要注意的是如果你有心脏病的记录，就不可以服用它，其它的都可以服用。

- **【注意】**：有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱**来取代麻黄.

※**麻黄汤使用时机**：头痛、全身关节痛、发高烧、无汗，非常怕冷.

- **※麻黄汤煮法及注意事项：**

- 以上四味药，以水九碗，先煮麻黄，等水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。汗出停后服。
- 和桂枝汤不同处是使用麻黄汤时，**不需要**喝稀饭助药力。
- 喝完药后以全身微微出汗为最佳。切记不可使病人流太多汗。汗出后须擦干,避免吹风受凉.
- 服用麻黄汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

第四、小柴胡汤

- **小柴胡汤处方**

- 处方内容是：柴胡15克、半夏15克、黄芩15克、党参15克
生姜二片、大枣十枚、炙甘草10克

- **※小柴胡汤使用时机：忽冷忽热，恶心，胸胁胀满感，无食欲。**

- **※小柴胡汤煮法及注意事项：**

- 上述七味药，以水十二碗，煮成六碗，去滓，再煎成三碗，每次温服一碗。一天三次。
- 每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，**晚餐前空腹时喝一碗，小孩减半，此方主要症状是病人自觉忽冷忽热，有呕心感，同时两胸肋位感觉有胀满感，这时就可以服用此方，还有要注意一点，就是女子在月经期中，如果得到任何感冒时，无论妳其它感冒症状是如何不同，请一律使用此方就可以恢复过来，千万不要去吃其它处方，如果妳同时有严重的痛经问题，妳可以在此方中自行加入茜草15克，白芍25克，而煮法与服用方法不变。

-
- **第五、麻杏甘石汤**

- **麻杏甘石汤处方**

- 麻黄12克(4钱)??杏仁9克(3钱)??炙甘草6克(2钱)??石膏，打碎用棉袋装，24克(8钱)

- **【注意】：**有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥六钱,防风四钱,浮萍四钱**来取代麻黄.

- **※麻杏甘石汤使用时机：有汗，咳嗽不止，痰出黄粘，胃口尚可。**

- **※麻杏甘石汤煮法及注意事项：**

以上四味药，以水七碗，先煮麻黄，等水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。汗出后须擦干,避免吹风受凉.

- 服用麻黄汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

-
- **第六、小青龙汤**

- **小青龙汤处方**

- 处方内容是：麻黄10克、白芍10克、干姜5克、细辛5克
桂枝15克、五味子10克、炙甘草10克、半夏10克，|
- **【注意】**:有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱**来取代麻黄.
- **※小青龙汤使用时机**：怕冷、无汗，发烧，咳嗽重，出白痰，口不渴，身体痛，没有胃口
- **※小青龙汤煮法及注意事项**：
 - 1.以上八味药，以水十碗，先煮麻黄，等水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。
 - 2.喝完药后以全身微微出汗为最佳。切记不可使病人流太多汗。汗出后须擦干,避免吹风受凉.
- 服用小青龙汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物
- 每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，**三小时空腹时喝一碗，小孩减半，服用后会得汗出来，此方主要的感冒症状是发烧，咳嗽吐清白痰，病人自觉身体里面非常冷，体表没有出汗，也有身体疼痛现象，没有口渴也没有胃口，喉咙中时常觉得痒痒的想咳嗽，有时感觉背后两肩胛骨之间有一块如拳大的冷块区，此时就可以服用这个处方，服用后身体会出汗，之后高烧就会退去，咳嗽就会好转。

第七、大青龙汤

• 、

- **大青龙汤处方**

- 处方内容是：麻黄10克、杏仁10克、石膏20克、炙甘草10克、桂枝15克、生姜二片 大枣十枚
每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，三小时空腹时喝一碗，小孩减半，服用后会得汗出来。
- 【注意】：有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱**来取代麻黄.
- ※**大青龙汤使用时机**：怕冷,无汗,发烧咳嗽重,咳出黄痰,身体痛,口渴重,喜饮冷水,没有胃口.这也是SARS、禽流感的主要证型之一。
- ※**大青龙汤煮法及注意事项**：
 - 1.用六碗水大火快煮成二碗,汤成后立刻关火,待温时空腹喝第一碗。
 - 2.如果一小时内汗出烧退咳止,就不需要喝第二碗。
 - 3.如果三小时内无出汗,就再喝第二碗,汗出时就不用再喝了,
 - 4.当身体出汗时须待静室中,等到出汗自然停止后,再出房间,
 - 5.切不可以出汗时吹到风,如此病毒将无法排尽,还会再发的。
 - 6.成人每次一碗,小孩每次半碗,婴儿每次四分之一碗。
 - 7.记住：一旦汗出,就不用再喝第二碗了,因为已经好了,再喝恐怕伤到津液。
 - 8.一般病人在服药后第二天中午时会很饿,胃口大开,这表示痊愈了。
- 服用大青龙汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物
- 此方主要的感冒症状是发烧，咳嗽吐浊痰，病人自觉体外怕冷体内很热，体表没有出汗，有身体疼痛现象，口渴又没有胃口，此时就可以服用这个处方，大青龙汤是我国千年来专门用来治疗瘟疫之类的传染病时所使用的最有效处方，近来发生所谓的禽流感，就是大青龙汤证，民众一旦发现得到此病而当你们当地的西医与中医都宣布无法治疗时，大家就可以使用此方来保命。

第八、咽喉痛方

- **甘草桔梗汤 就两味药生甘草15 桔梗20，小孩减半**

- **肺炎咳嗽常用方**

1、白虎汤--肺炎急性期高热

组成：知母18克(6钱)石膏打碎用棉袋装， 45克(1两半)炙甘草6克(2钱)粳米18克(6钱)

※**白虎汤使用时机：发烧,怕热,大汗,口渴重,喜饮冷水.**

• **※白虎汤煮法及注意事项：**

- 以上四味药，以水十碗，煮米熟汤成，去滓。每次温服一碗，一日三次。烧退停后服，服过量易伤胃气。

2、射干麻黄汤处方--咳嗽哮喘

- 射干9克(3钱) 麻黄12克(4钱) 生姜切片12克(4钱) 细辛6克(2钱) 紫菀9克(3钱) 款冬花9克(3钱) 大枣擘（用手掰开）7枚
半夏9克(3钱) 五味子9克(3钱)

- **【注意】：**有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥六钱,防风四钱,浮萍四钱**来取代麻黄.

※**射干麻黄汤使用时机：怕冷,咳嗽,痰多而清稀,口不渴,喉咙痒而不舒服.**

• **※射干麻黄汤煮法及注意事项：**

- 以上九味药，以水十二碗，先煮麻黄，等水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。
- 服用射干麻黄汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

3、苓甘姜味辛夏仁汤处方--感冒后期寒咳

- 茯苓12克(4钱) 炙甘草9克(3钱) 干姜9克(3钱) 细辛6克(2钱) 半夏9克(3钱)

五味子9克(3钱) 杏仁9克(3钱)

※**苓甘姜味辛夏仁汤使用时机：咳嗽,白痰,无表证(恶寒、发热、身痛)时使用.**

• **※苓甘姜味辛夏仁汤煮法及注意事项：**

- 以上七味药，以水十碗，煮成三碗。去滓，每次温服半碗。一日三次。
- 服用苓甘姜味辛夏仁汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

4、千金苇茎汤处方--肺炎肺热咳嗽

- 苇茎45克 (1两半) ??薏苡仁30克 (1两) ??冬瓜子18克 (6钱) 桃仁9克 (3钱)

※**千金苇茎汤使用时机：咳嗽,黄痰,不易咯出,无表证(恶寒、发热、身痛)时使用.**
常配合大青龙汤,麻杏甘石汤使用.

• **※千金苇茎汤煮法及注意事项：**

- 以上四味药捣碎，以水六碗，煮取三碗，每次服一碗，分三次服用。
- 服用千金苇茎汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物
- 现今药房买不到苇茎，多以芦根代替。

5、麦门冬汤处方--感冒后期

- 麦门冬 18克(6钱) 人参6克(2钱) 炙甘草 6克(2钱) 粳米9克(3钱) 大枣擘(用手掰开) 12枚 半夏9克(3钱)

※**麦门冬汤使用时机**：干咳无痰, 声哑,无表证(恶寒、发热、身痛)时使用。

- ※**麦门冬汤煮法及注意事项**:

- 以上六味药，以水十二碗，煮取六碗，温服一碗，早中晚及睡前各一碗。
- 服用麦门冬汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

肠胃型感冒及泌尿道

1、五苓散处方

- 猪苓9克(3钱)泽泻15克(5钱) 白朮9克(3钱) 茯苓9克(3钱) 桂枝6克(2钱)

※**五苓散使用时机**：发烧,头痛,口渴欲饮水, 但一喝就吐, 或有(拉肚子)水泻。

- ※**五苓散使用法及注意事项**:

- 将上述五味药材打成粉末，一次吃一平汤匙，原方是用很稀的米汤配着服下，不习惯者可以用温水送服，一天吃三次，吃完后多喝温热水，汗出则愈，还有小便也会增加。

虚人感冒

平时比较虚的人感冒发烧常用到桂枝汤，另外有部分人，没有汗，手脚常年冰冷，怕冷重的！则需要用到这个方子。

麻黄附子细辛汤处方

- 麻黄6克(2钱) 炮附子9克(3钱) 细辛6克(2钱)

- ※**麻黄附子细辛汤使用时机**：发烧/咳嗽/喉咙痛/鼻病,无汗,口不渴,怕冷,四肢冰冷, 疲累。

- ※**麻黄附子细辛汤煮法及注意事项**:

- 以上三味药，以水十碗，先煮麻黄，待水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗，去滓，每次温服一碗，一天三次。
- 请务必使用不含胆巴的附子。胆巴就等于防腐剂,会造成肝肾功能异常.甚至衰竭,害人性命。最好用炮附子。
- 辨别有无含胆巴之方法：以舌尖舔一下炮附子，若有咸味即是有胆巴。
- 服用麻黄附子细辛汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

治感冒发烧常用经方成药

- 小柴胡颗粒、葛根汤颗粒、风感冒颗粒、小青龙汤颗粒、表虚感冒颗粒、感冒疏风颗粒/片----解表发汗，治表寒为主。
- 麻甘颗粒、柴桂退热颗粒、桂黄清热颗粒、抗病毒口服液、防风通圣丸---治表寒加里热
- 通宣理肺丸、杏苏合剂、二陈丸----止咳祛痰
- 玉屏风颗粒--体虚感冒，加预防
- 双黄连口服液、小儿肺热颗粒、葛根芩连片--清里热为主

最后

内容比较多，请大家务必收藏好！同时赶紧去准备一点这些方药，按上面的参考剂量去准备就可以了！请务必赶紧行动，不要等到封楼或者买不到药的时候就晚了！寒潮来袭，希望医圣仲景师爷能够帮助到大家，安度这个寒冬！也要感谢倪海厦老师的精心整理和无私分享。

有缘看到的朋友，请分享给你的家人和朋友！

更多倪海厦精华：

- 经方治疗感冒秘籍？中医大毕业打死也不会这样治感冒！
- 倪海厦中医问诊十法详解
- 倪海厦中医心法，一招辨别阴阳，手把手教
- 小儿鼻涕、流鼻血、踢被子正常吗？--经方大师倪海厦解答
- 倪海厦的53个诊病治病经验精华（收藏）
- 倪海厦：学中医不知如何入手，跟着这五个步骤可学好纯正中医

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。



二羊

“ 码字不易，感谢支持 ”

👍 喜欢作者

#感冒 5 #倪海厦精要 1 #发烧 17

感冒 · 目录

〈 上一篇

中医二羊：小孩肺热咳嗽典型案例，草莓舌打呼噜用麻杏甘石汤两天的大变

下一篇 〉

感冒发烧中成药怎么选用？经方思路以及常用的成药推荐，二羊建议收藏！

修改于2022年11月30日