

CPS-NAID / NCAPC — Avaliação de Dor em Adultos com DI

Identificação

Paciente: _____

Idade: _____ Data: ____/____/____

Nível de DI: _____

Avaliador: _____

Observação: _____ minutos

CPS-NAID (0–3 por item; 24 itens)

Expressões vocais/verbalizações: 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

Observações:

Expressões faciais: 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

Observações:

Comportamentos corporais (rigidez/proteção/inquietação): 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

Observações:

Sociais/emocionais (irritabilidade/evitamento/busca conforto): 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

Observações:

Total CPS-NAID: _____ /72 Interpretação: ≤ 9 sugere ausência provável; ≥ 10 sugere presença provável

Síntese clínica:

NCAPC — Lista de 18 comportamentos (assinale e descreva)

1) Expressões faciais de dor ☐ Observações:

2) Mudanças respiratórias ☐ Observações:

3) Postura/proteção corporal ☐ Observações:

4) Movimentos específicos ☐ Observações:

5) Vocalizações de desconforto ☐ Observações:

6) Alterações no convívio ☐ Observações:

(... complete até 18 conforme protocolo institucional ...)

Resumo NCAPC:

Plano terapêutico e reavaliação:

Assinatura do profissional: _____