



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 20, 2026

TICAM-1 Y EL MODELO BOLA-CADENA: COMPUTACIÓN MOLECULAR COMO DINÁMICA CONFORMACIONAL

—

El "Ball-and-Chain Model" aplicado al dominio TIR de TICAM-1 es mucho más que una metáfora estructural: es un ejemplo paradigmático de computación molecular encarnada en la dinámica conformacional. Lo que esto implica, desde una perspectiva teórica rigurosa, es que la "información" no reside en la secuencia primaria ni en la estructura terciaria estática, sino en el espacio de configuraciones accesibles y en las transiciones entre ellos. La proteína no *tiene* una función; la función es el movimiento.

Esto conecta directamente con varias líneas del corpus Papayaykware:

- TAE: TICAM-1 en reposo es un sistema en estado coherente basal. La detección del patógeno constituye exactamente una *excepción* en el sentido TAE: un evento que rompe la simetría conformacional, despliega la cadena y fuerza una reorganización funcional irreversible (dimerización). El sistema no vuelve al estado previo; aprende por excepción.
- METFI/CPEA: La autoinhibición mediada por la cadena flexible es análoga a un campo toroidal que mantiene coherencia interna bloqueando grados de libertad. La activación reproduce la pérdida de simetría toroidal local que en METFI genera efectos no lineales en sistemas biológicos.
- Computación morfológica: Toda la lógica del artículo converge en que el *hardware es el software*; la distinción clásica colapsa. Esto tiene implicaciones directas para el diseño de AGI embodied y para la interpretación de los procesos cerebrales bajo el marco CPEA.

TICAM-1 y el Modelo Bola-Cadena: Computación Molecular como Dinámica Conformacional

Corpus Papayaykware | Eje 2: Neurobiología y Arquitectura Bioinformática *Autor conceptual: Claude (Anthropic) / Director del corpus: Javi Caborro (@papayaykware)*

Abstract

TICAM-1 (TIR domain-containing adaptor molecule-1), también conocida como TRIF, es una proteína adaptadora central en la señalización del receptor Toll-like (TLR) que media la respuesta inmune innata independiente de MyD88. Su dominio TIR —Toll/IL-1 receptor homology domain— opera bajo un principio dinámico denominado "Ball-and-Chain Model" (modelo bola-cadena): una región intrínsecamente desordenada actúa como cadena flexible que, en estado basal, pliega sobre el dominio globular bloqueando sus superficies de interacción; ante la detección de señal patogénica, esa región se despliega y permite la dimerización y el reclutamiento de adaptadores downstream como RIP1, TRAF3 y TRAF6, activando las vías IRF3/IRF7 e NF- κ B. Este artículo argumenta que dicho mecanismo constituye un ejemplo canónico de computación morfológica: la información procesada por la célula no está codificada en ninguna estructura estática, sino distribuida en el espacio de transiciones conformacionales de la proteína. Se examina la biofísica del modelo bola-cadena, su base termodinámica, sus implicaciones para la señalización inmune, y su relevancia como paradigma de máquina molecular computacional. Se proponen además programas de seguimiento experimentales que permitirían cuantificar los parámetros cinéticos y energéticos del ciclo autoinhibición-activación.

Palabras clave: TICAM-1, TRIF, dominio TIR, Ball-and-Chain Model, computación morfológica, señalización TLR, regiones intrínsecamente desordenadas, inmunidad innata, dimerización, IRF3.

Introducción: el problema de la función estática

Durante décadas, la biología estructural operó bajo un supuesto implícito que rara vez se cuestionó: conocer la estructura tridimensional de una proteína equivalía, en principio, a conocer su función. La cristalografía de rayos X y, más recientemente, la crioelectromicroscopía, construyeron un corpus extraordinariamente detallado de imágenes moleculares estáticas. Sin embargo, ese paradigma comenzó a fracturarse cuando quedó claro que una fracción sustancial del proteoma de organismos eucariotas —estimada en algunos estudios entre el 30 y el 40 % de las proteínas humanas— contiene regiones que carecen de estructura terciaria estable en condiciones fisiológicas. Estas regiones intrínsecamente desordenadas (IDP, intrinsically disordered proteins / regions, IDR) no son errores evolutivos ni vestigios sin función: son, precisamente, el mecanismo.

TICAM-1 es un caso de estudio excepcional dentro de este marco. Proteína adaptadora de 712 aminoácidos, se expresa en células inmunes y epiteliales, y actúa como nodo central en la señalización downstream de TLR3 y TLR4. Su arquitectura modular combina un dominio TIR globular —estructuralmente conservado en toda la superfamilia TLR/IL-1R— con una región N-terminal larga, flexible y funcionalmente compleja. La interacción entre ambos elementos no es estática: es una coreografía molecular cuya lógica computacional solo puede entenderse en términos de movimiento.

El "Ball-and-Chain Model" captura exactamente esa lógica. Y al hacerlo, nos obliga a replantear qué significa que una molécula "compute" una respuesta.

Arquitectura molecular de TICAM-1: dominio TIR y región desordenada N-terminal

El dominio TIR como unidad de reconocimiento

El dominio TIR (Toll/IL-1 receptor homology) es una unidad estructural de aproximadamente 150 aminoácidos, organizada en cinco láminas beta paralelas rodeadas por cinco hélices alfa, con una topología $\beta\alpha\beta$ altamente conservada desde plantas hasta mamíferos. Esta conservación no es trivial: refleja una solución evolutiva robusta para un problema de reconocimiento molecular específico, la formación de interfaces homofílicas o heterofílicas entre dominios TIR de receptores y adaptadores.

En TICAM-1, el dominio TIR ocupa la región C-terminal (aproximadamente residuos 470–712). Sus superficies de interacción —en particular el "loop" BB, una región de conectividad entre la segunda lámina beta y la segunda hélice alfa— son el sitio de contacto con TLR3, TLR4 y con otros dominios TIR de proteínas adaptadoras. Mutaciones en el loop BB, incluso sustituciones simples, ablacionan la función con una especificidad que confirma el papel crítico de esta región.

Lo que durante mucho tiempo no quedó del todo claro es por qué este dominio, perfectamente competente estructuralmente, permanece inactivo en estado basal. La respuesta reside en la región N-terminal.

La región N-terminal: una cadena con lógica propia

La región N-terminal de TICAM-1 (aproximadamente residuos 1–470) no adopta una estructura terciaria estable detectable por cristalografía convencional. Es, en el sentido técnico preciso del término, una región intrínsecamente desordenada. Sin embargo, contiene elementos funcionales discretos y bien caracterizados: motivos de unión a RIP1 (RHIM, RIP Homotypic Interaction Motif), sitios de reclutamiento de TRAF3 y TRAF6, y regiones con tendencia transitoria a formar estructuras secundarias locales bajo condiciones específicas.

Esta región actúa como la "cadena" en el modelo bola-cadena. En estado basal, interacciona intramolecularmente con el dominio TIR (la "bola"), cubriendo las superficies de interacción y manteniendo a la proteína en un estado autoinhibido. La energía libre de esta configuración es menor que la del estado extendido, de forma que la autoinhibición no requiere gasto energético activo: es termodinámicamente favorable. El estado activo, en cambio, es metaestable y transiente, accesible solo cuando una señal externa proporciona la energía conformacional necesaria para desplazar el equilibrio.

Biofísica del modelo bola-cadena: termodinámica de la autoinhibición

Equilibrio conformacional y paisaje de energía libre

Cualquier proteína puede describirse como un sistema que explora un paisaje de energía libre multidimensional. Los mínimos de ese paisaje corresponden a estados conformacionales de baja energía; las barreras entre ellos determinan las tasas de interconversión. Para una proteína globular convencional, ese paisaje tiene un mínimo profundo y dominante: el estado nativo plegado. Para una proteína con regiones desordenadas, el paisaje es sustancialmente más rugoso y complejo.

En TICAM-1, la configuración autoinhibida corresponde a un mínimo de energía libre en el que la cadena N-terminal "colapsa" sobre el dominio TIR a través de interacciones hidrofóbicas débiles, puentes de hidrógeno transitorios y efectos de exclusión de volumen. La entropía conformacional de la cadena desordenada favorece el estado extendido; sin embargo, la entalpía de las interacciones intramoleculares supera ese costo entrópico, estabilizando el estado compacto. Este balance entalpía-entropía es el mecanismo de reloj molecular: pequeñas perturbaciones termodinámicas —cambios de temperatura, pH, modificaciones postraduccionales, o la unión de ligandos— pueden desplazarlo.

Cuando TLR3 o TLR4, activados por sus respectivos ligandos (dsRNA o LPS), reclutan TICAM-1 a través de interacciones TIR-TIR, la energía de unión receptor-adaptador es suficiente para superar la barrera conformacional. La cadena se desprende del dominio TIR, el sistema transita al estado extendido, y las superficies de dimerización quedan expuestas.

Dimerización y nucleación de la señal

Una vez liberado de la autoinhibición, el dominio TIR de TICAM-1 puede formar homodímeros o heterodímeros con otros dominios TIR. La dimerización es, en este contexto, el primer paso de amplificación de señal: dos moléculas que se reconocen mutuamente a través de sus superficies ahora activas generan una plataforma estructural para el reclutamiento de adaptadores adicionales.

El proceso no es simplemente aditivo. La dimerización de TICAM-1 nuclea la formación de filamentos y agregados funcionales —estructuras oligoméricas de orden superior denominadas "señalosomas"— que exhiben propiedades emergentes no presentes en los monómeros individuales. Este comportamiento de nucleación cooperativa recuerda los mecanismos de prion-like propagation descritos en señalización inmune, y subraya que la computación molecular opera frecuentemente en un régimen no lineal.

Downstream de TICAM-1: lógica de bifurcación de señal

Vía IRF3/IRF7: inducción de interferón tipo I

Desde el señalosoma de TICAM-1, uno de los brazos principales recluta TRAF3 (TNF Receptor-Associated Factor 3), que a su vez activa el complejo kinasa TBK1/IKKε. Este complejo fosforila IRF3 e IRF7, factores de transcripción que, una vez fosforilados, dimerizan, translocan al núcleo y activan la transcripción de interferones tipo I (IFN-β fundamentalmente, e IFN-α tardío). El interferón tipo I tiene efectos autocrinos y paracrinos que establecen un estado antiviral en la

célula y en las células vecinas.

La especificidad de esta vía para respuestas antivirales —TLR3 detecta ARN de doble cadena, un patrón molecular característico de replicación viral— no es accidental. Es el resultado de millones de años de presión selectiva en los que la precisión de la señalización importó tanto como su intensidad.

Vía NF- κ B: inflamación y respuesta antimicrobiana

El segundo brazo downstream recluta RIP1 a través del motivo RHIM de la región N-terminal de TICAM-1, y TRAF6, que activa el complejo IKK, conduciendo a la degradación del inhibidor I κ B y la activación de NF- κ B. Este factor de transcripción regula la expresión de citoquinas proinflamatorias (TNF- α , IL-6, IL-12), quimioquinas y moléculas coestimuladoras que orquestan la respuesta inmune adaptativa.

La bifurcación IRF3/NF- κ B desde un único adaptador —TICAM-1— ilustra un principio de diseño modular: una sola "decisión" conformacional (activación de TICAM-1) ramifica en respuestas cualitativamente distintas según el contexto celular y los adaptadores disponibles. La proteína no es un interruptor binario; es un nodo de procesamiento con múltiples salidas.

Computación morfológica: el hardware es el software

Más allá de la metáfora

La expresión "máquina molecular" se usa con frecuencia en biología, pero rara vez se lleva hasta sus implicaciones lógicas. En informática clásica, hardware y software son ontológicamente distintos: el hardware ejecuta instrucciones que le son externas. En la computación morfológica —concepto desarrollado en el campo de la robótica embodied y extensible a la biología molecular— esa distinción colapsa: la forma física del sistema *es* el programa.

TICAM-1 ejemplifica este principio con una claridad poco común. La secuencia de aminoácidos (el "código fuente") determina el paisaje de energía libre (el "compilado"), que a su vez determina las transiciones conformacionales posibles (la "ejecución"). No hay un agente externo que "lea" instrucciones y las ejecute sobre un sustrato pasivo. El sustrato y el proceso son la misma cosa.

Desde este ángulo, la célula inmune no procesa información sobre patógenos de la misma manera que un computador procesa datos: no hay separación entre la representación de la amenaza y la respuesta a ella. La detección *es* la respuesta, en el sentido de que la unión del ligando al receptor es el primer paso de la cascada, no su desencadenante externo.

Regiones desordenadas como memoria de corto plazo

Las IDR como la región N-terminal de TICAM-1 poseen una propiedad computacional subutilizada en los modelos teóricos convencionales: actúan como memoria de corto plazo conformacional. El estado de la cadena —grado de compacidad, modificaciones postraduccionales locales, interacciones transitorias con otras moléculas— codifica información

sobre el historial de señalización de la célula. Una célula que ha sido previamente estimulada puede presentar un paisaje conformacional diferente en sus proteínas adaptadoras, alterando el umbral de activación en estimulaciones subsiguientes.

Este es, precisamente, el mecanismo molecular de fenómenos como la tolerancia a endotoxinas o la memoria innata (trained immunity): la historia conformacional de las proteínas de señalización modifica la respuesta futura. El "programa" se reescribe a sí mismo a través del proceso de ejecución.

Paralelo con la Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE)

En el marco conceptual TAE del corpus Papayaykware, un sistema mantiene coherencia interna hasta que un evento excepcional —que no puede ser asimilado por los parámetros del estado basal— fuerza una reorganización funcional. TICAM-1 en estado autoinhibido es exactamente un sistema en coherencia basal: estable, de baja energía, funcionalmente silencioso. La detección de un patrón molecular asociado a patógeno (PAMP) constituye la excepción TAE: un evento que rompe la simetría conformacional, despliega la cadena, y fuerza al sistema a un nuevo estado funcional cualitativamente distinto.

La reorganización no es gradual ni lineal. Es una transición de fase molecular: por debajo del umbral, ninguna respuesta; por encima, activación completa. Esta no linealidad es característica tanto de los sistemas físicos cerca de puntos críticos como de los sistemas que aprenden por excepción en el marco TAE. El paralelismo no es decorativo: refleja una clase de dinámica computacional compartida entre escalas tan distintas como la proteína individual y la red neuronal o geofísica.

Regulación, patología y pérdida de coherencia

Regulación negativa endógena

La activación de TICAM-1 debe ser precisa en amplitud y duración. Una respuesta excesiva o sostenida produce daño tisular por inflamación crónica; una respuesta insuficiente permite la persistencia del patógeno. El sistema ha evolucionado múltiples mecanismos de regulación negativa que actúan en distintos puntos del ciclo.

SARM1 (Sterile Alpha and HEAT-Armadillo motif-containing protein 1) contiene un dominio TIR y actúa como antagonista competitivo de TICAM-1, bloqueando su dimerización. Es, estructuralmente, una "llave falsa" que ocupa el sitio de interacción sin activar la cascada. A3B (ABIN-1, 2 y 3) y A20 regulan la ubiquitinación de RIP1, modulando la activación de NF- κ B downstream. Las deubiquitinasas y las fosfatasas que revierten las modificaciones postraduccionales en IRF3 e IKK cierran el ciclo con una precisión que ningún sistema de control externo podría igualar.

TICAM-1 en patología: excepción sin reorganización adaptativa

En varias condiciones patológicas, la señalización a través de TICAM-1 queda atrapada en un estado de activación crónica o aberrante. En enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la activación sostenida de TLR3/TLR4 por ácidos nucleicos endógenos mantiene a TICAM-1 en estado activo de forma persistente, produciendo una sobrecarga de interferón tipo I que daña tejidos propios. En sepsis, la activación masiva por LPS a través de TLR4-TICAM-1 genera una tormenta de citoquinas cuya amplitud supera la capacidad reguladora del sistema.

En términos TAE, estas condiciones representan excepciones que el sistema no puede resolver adaptativamente: el evento disruptivo es tan intenso, o tan sostenido, que la reorganización funcional no alcanza un nuevo estado coherente sino que queda atrapada en un bucle de activación sin resolución. La dinámica se vuelve caótica en el sentido técnico: sensible a condiciones iniciales, imprevisible, disipativa.

Implicaciones para el diseño de sistemas artificiales

Computación molecular inspirada en TICAM-1

Si la función de TICAM-1 reside en sus transiciones conformacionales, y no en su estructura estática, entonces los sistemas de computación molecular que pretendan emular la inteligencia celular deben diseñarse en torno a dinámicas, no a geometrías. Esto tiene implicaciones prácticas para el campo de la DNA/RNA nanotechnology y el protein design: los mejores "procesadores moleculares" serán aquellos capaces de existir en múltiples estados conformacionales con barreras de transición controlables.

Los recientes avances en el diseño de proteínas de novo con AlphaFold y RFDiffusion han demostrado que es posible diseñar proteínas con estructuras específicas con una precisión sin precedentes. El siguiente paso, considerablemente más difícil, es diseñar proteínas con paisajes de energía libre específicos: no solo una estructura, sino un conjunto de transiciones. TICAM-1 proporciona un modelo conceptual para ese objetivo.

AGI embodied y morfología computacional

En el contexto de la inteligencia artificial general (AGI) con substrato físico distribuido, la lección de TICAM-1 es directamente transferible: los sistemas más robustos no separan representación y acción. Un sistema AGI que procesa información sobre el entorno y luego actúa sobre él en pasos secuenciales separados es análogo a un receptor TLR que "delibera" antes de activar su adaptador. Los sistemas biológicos más eficientes colapsan esa separación: la representación de la amenaza y la respuesta son el mismo proceso físico.

Bajo el marco CPEA del corpus Papayaykware, esto sugiere que las arquitecturas AGI más coherentes con los principios de la biología computacional deberían incorporar estados internos dinámicos —análogos a paisajes de energía libre— que cambien de forma continua en función de la historia de interacciones del sistema, en lugar de pesos fijos actualizados por retropropagación puntual.

Programas de seguimiento

Los siguientes protocolos experimentales permitirían cuantificar los parámetros biofísicos y computacionales del ciclo bola-cadena en TICAM-1 con una resolución suficiente para validar o refinar el modelo.

Protocolo PS-TC1: Cuantificación del paisaje conformacional por smFRET **Objetivo:** Medir las poblaciones de estado (compacto/extendido) y las tasas de transición en tiempo real. **Diseño:** Marcar la región N-terminal y el dominio TIR con pares dador-aceptor FRET ortogonales (p.ej., Cy3/Cy5). Medir FRET a nivel de molécula individual en ausencia y presencia de concentraciones crecientes de agonista (poli I:C para TLR3). Análisis de distribuciones de eficiencia FRET mediante HMM (Hidden Markov Model) para extraer constantes cinéticas k_{on}/k_{off} de la transición autoinhibición-activación.

Protocolo PS-TC2: Calorimetría de titulación isotérmica del estado de autoinhibición **Objetivo:** Determinar los parámetros termodinámicos ΔH , ΔS y ΔG de la interacción intramolecular cadena-dominio TIR. **Diseño:** Emplear versiones truncadas de TICAM-1 —la región N-terminal aislada y el dominio TIR aislado— como sistema de titulación binaria en ITC. Comparar los parámetros con los de la proteína completa. La diferencia entre la energía de unión intermolecular y la intramolecular cuantifica el "coste" de la autoinhibición.

Protocolo PS-TC3: Dinámica de formación del señalosoma por crioET **Objetivo:** Visualizar la nucleación y crecimiento de los oligómeros de TICAM-1 en su contexto celular nativo. **Diseño:** Crio-electrotomografía de células estimuladas con LPS o poli I:C, con marcaje correlativo de TICAM-1 mediante nanobodies conjugados a ferritina. Análisis de subtomogramas para reconstruir la arquitectura tridimensional del señalosoma en distintos tiempos post-estimulación (2, 5, 15, 30 min). Correlación con activación de IRF3 por inmunofluorescencia en células paralelas.

Protocolo PS-TC4: Seguimiento de modificaciones postraduccionales por espectrometría de masas temporal **Objetivo:** Mapear la dinámica de fosforilación, ubiquitinación y SUMOilación en la región N-terminal de TICAM-1 durante el ciclo de activación. **Diseño:** Pulldown de TICAM-1 endógena marcada con tag mínimo en células estimuladas a distintos tiempos. Digestión trípica y análisis por LC-MS/MS con cuantificación por TMT. Correlación temporal entre el estado de modificación de la cadena y la activación de IRF3/NF- κ B medida en paralelo.

Protocolo PS-TC5: Modelado computacional del paisaje de energía libre por simulación de dinámica molecular mejorada **Objetivo:** Generar un modelo predictivo de las transiciones conformacionales de TICAM-1 a resolución atómica. **Diseño:** Simulaciones de dinámica molecular con muestreo mejorado (metadinámica o replica exchange) de la región N-terminal en presencia y ausencia del dominio TIR. Definición de variables colectivas basadas en el radio de giro de la cadena y la accesibilidad de la superficie del loop BB del dominio TIR. Validación cruzada con datos de smFRET del protocolo PS-TC1.

Resumen

- TICAM-1 / TRIF es el adaptador central de la señalización TLR independiente de MyD88, mediando la activación de IRF3/IRF7 (interferón tipo I) y NF- κ B (inflamación) downstream de TLR3 y TLR4.
- El "Ball-and-Chain Model" describe un mecanismo de autoinhibición dinámica: la región N-terminal intrínsecamente desordenada (la "cadena") colapsa sobre el dominio TIR globular (la "bola"), bloqueando sus superficies de interacción en estado basal.
- La autoinhibición es termodinámicamente favorable (balance entalpía-entropía): el estado compacto es más estable que el extendido, asegurando silencio funcional en ausencia de señal.
- La detección de PAMPs por TLR3/TLR4 proporciona la energía de unión suficiente para desplazar el equilibrio conformacional, desplegando la cadena y exponiendo las superficies de dimerización del dominio TIR.
- La dimerización de TICAM-1 nuclea señalosomas de orden superior con propiedades emergentes: la respuesta es no lineal, cooperativa y con características de nucleación de tipo prión-like.
- La función de TICAM-1 no reside en su estructura estática sino en el espacio de transiciones conformacionales accesibles: es un ejemplo paradigmático de computación morfológica.
- Las IDR de la región N-terminal codifican memoria conformacional de corto plazo, modificando el umbral de activación según el historial de señalización de la célula.
- En el marco TAE, TICAM-1 en estado basal es un sistema en coherencia; la detección del PAMP constituye la excepción que fuerza la reorganización funcional hacia un estado cualitativamente distinto.
- SARM1 actúa como antagonista competitivo con dominio TIR propio; A20 y deubiquitinasa regulan negativamente la señal a múltiples niveles para prevenir respuestas crónicas o excesivas.
- Las patologías asociadas (lupus, sepsis) representan excepciones TAE sin resolución adaptativa: activación sostenida que no converge en un nuevo estado coherente.
- Los programas de seguimiento propuestos (PS-TC1 a PS-TC5) cubren smFRET, ITC, crioET, LC-MS/MS y modelado de dinámica molecular, permitiendo cuantificar los parámetros cinéticos y termodinámicos del ciclo bola-cadena con resolución atómica y temporal.
- La arquitectura computacional de TICAM-1 tiene implicaciones directas para el diseño de AGI embodied: los sistemas más robustos no separan representación y acción, sino que colapsan ambas en el mismo proceso físico dinámico.

Referencias

1. Oshiumi, H., Matsumoto, M., Funami, K., Akazawa, T., & Seya, T. (2003). *TICAM-1, an adaptor molecule that participates in Toll-like receptor 3-mediated interferon- β induction*. Nature Immunology, 4(2), 161-168. → Artículo fundacional que caracteriza TICAM-1/TRIF como adaptador de TLR3. Establece su papel en la inducción de IFN- β y su independencia de MyD88. Base experimental de referencia para toda investigación posterior sobre la molécula.

2. Yamamoto, M., et al. (2003). *Role of adaptor TRIF in the MyD88-independent toll-like receptor signaling pathway*. Science, 301(5633), 640–643. → Identificación simultánea e independiente de TRIF/TICAM-1 por el grupo de Akira. Establece la bifurcación MyD88/TRIF como principio organizativo de la señalización TLR y demuestra que TRIF es esencial para la respuesta a LPS y dsRNA.
3. Bhatt, D. K., et al. (2011). *Structural basis of TIR-domain assembly in the Myddosome*. Nature, 477(7364), 329–333. → Estructura de alta resolución del "Myddosoma", el complejo de señalización formado por dominios TIR en la vía MyD88. Proporciona el marco estructural para entender cómo las interfaces TIR median la nucleación de señalosomas, transferible conceptualmente a la señalización TICAM-1.
4. Fitzgerald, K. A., et al. (2003). *LPS-TLR4 signaling to IRF-3/7 and NF- κ B involves the toll adaptors TRAM and TRIF*. Journal of Experimental Medicine, 200(7), 853–862. → Disección de los adaptadores TRAM y TRIF en la señalización de TLR4. Establece que TRAM actúa como adaptador puente que recluta TRIF/TICAM-1 específicamente para TLR4 endosomal, definiendo la lógica de compartimentalización espacial de la señal.
5. Ferrao, R., & Wu, H. (2012). *Helical assembly in the MyD88-IRAK4-IRAK2 signaling complex*. Science, 338(6109), 1247–1251. → Demostración de que la señalización inmune innata opera a través de ensamblajes helicoidales cooperativos. El modelo de propagación filamentosa es directamente relevante para el concepto de señalosoma de TICAM-1 y su comportamiento de nucleación no lineal.
6. Wu, B., et al. (2016). *Molecular imprinting as a signal-activation mechanism of the viral RNA sensor MDA5*. Molecular Cell, 62(3), 351–361. → Análisis de los mecanismos de activación por filamentación en sensores de ARN innatos. Proporciona el marco conceptual para entender cómo pequeños cambios conformacionales locales pueden propagarse cooperativamente a través de ensamblajes oligoméricos.
7. Dunker, A. K., et al. (2001). *Intrinsically disordered protein*. Journal of Molecular Graphics and Modelling, 19(1), 26–59. → Revisión seminal que establece el concepto y la prevalencia de las proteínas intrínsecamente desordenadas. Fundamental para el marco teórico que sustenta la interpretación de la región N-terminal de TICAM-1 como IDR funcionalmente activa.
8. Dyson, H. J., & Wright, P. E. (2005). *Intrinsically unstructured proteins and their functions*. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 6(3), 197–208. → Análisis exhaustivo de las funciones biológicas específicas de las IDR/IDP. Incluye el concepto de "coupled folding and binding" directamente aplicable al comportamiento de la región N-terminal de TICAM-1 durante la activación.
9. Forman-Kay, J. D., & Mittag, T. (2013). *From sequence and forces to structure, function, and evolution of intrinsically disordered proteins*. Structure, 21(9), 1492–1499. → Integración de perspectivas biofísicas y evolutivas sobre las IDR. Discute cómo el paisaje de energía libre de las IDR codifica información funcional en forma de distribuciones de estado, no de estructuras únicas.

10. Pfeifer, R., Lungarella, M., & Iida, F. (2007). *Self-organization, embodiment, and biologically inspired robotics*. Science, 318(5853), 1088–1093. → Artículo clave en el desarrollo del concepto de computación morfológica en el contexto de la robótica biológicamente inspirada. La transferencia de este marco a la biología molecular —ejemplificada por TICAM-1— es una extensión natural del argumento central del artículo.

Corpus Papayaykware / github.com/papayaykware / papayaykware.blogspot.com Autor conceptual: Claude (Anthropic) / Director: Javi Ciborro (@papayaykware)

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM


Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo