



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 17, 2026

INTER-14: ENTRAINMENT OSCILATORIO GAMMA (40 HZ) — DIFERENCIACIÓN MECANICISTA RESPECTO A LA FOTOBIMODULACIÓN Y EXTENSIÓN HIPOTÉTICA AL TDAH

El artículo que adjuntas es uno de los trabajos más relevantes en este campo. No propone que una luz parpadeante "cure" el Alzheimer, sino algo más específico: comprobar si la estimulación audiovisual a **40 Hz (banda gamma)** es segura y si realmente consigue sincronizar la actividad cerebral en pacientes con deterioro cognitivo leve.

Los resultados fueron interesantes:

- La estimulación fue segura y bien tolerada.
- El EEG confirmó que el cerebro sincronizaba ("entrained") su actividad con el estímulo.
- La resonancia magnética sugirió cambios en la conectividad funcional.
- Algunos biomarcadores inmunológicos del líquido cefalorraquídeo mostraron modificaciones compatibles con cambios en la neuroinflamación.

Eso es importante porque se apoya en años de investigación previa del grupo del MIT dirigido por Li-Huei Tsai.

¿Por qué precisamente 40 Hz?

Aquí aparece un aspecto fascinante.

Las oscilaciones gamma (30-80 Hz aproximadamente) participan en procesos como:

- atención
- memoria de trabajo
- integración sensorial
- sincronización entre regiones cerebrales

En el Alzheimer estas oscilaciones suelen deteriorarse.

El laboratorio del MIT descubrió en modelos animales que una estimulación luminosa y sonora a 40 Hz producía varios efectos:

- disminución de placas de beta amiloide
- reducción de proteína tau patológica
- activación de microglía con mayor capacidad de limpieza
- mejora del flujo sanguíneo cerebral
- cambios en la expresión génica relacionada con inflamación

Lo sorprendente es que posteriormente comprobaron que el efecto no era exclusivamente visual; también aparecía mediante sonido e incluso mediante estimulación táctil.

Eso sugiere que el objetivo no es el ojo o el oído, sino la **dinámica oscilatoria del cerebro**.

¿Qué ocurre realmente?

No parece que la luz esté "inyectando energía" al cerebro.

Lo que hace es actuar como un **marcapasos externo**.

Igual que un metrónomo sincroniza músicos, un estímulo periódico puede sincronizar poblaciones neuronales.

Ese fenómeno se denomina **entrainment**.

El cerebro ya funciona mediante oscilaciones:

- delta
- theta
- alfa
- beta
- gamma

Una estimulación periódica puede favorecer que millones de neuronas disparen de forma más coordinada.

¿Tiene sentido desde la biofísica?

Sí.

Y aquí conecta con algo que comentas muy acertadamente: normalmente pensamos en el sistema nervioso desde la bioquímica (neurotransmisores, microbiota, inflamación...), pero el cerebro también es un sistema electromagnético.

Cada potencial de acción genera:

- corrientes eléctricas
- campos magnéticos extremadamente débiles

- oscilaciones colectivas

El EEG precisamente mide esa actividad eléctrica colectiva.

Por tanto, modificar los patrones de sincronización mediante estímulos externos es perfectamente compatible con la neurofisiología conocida.

¿Dónde entran los campos electromagnéticos?

Aquí conviene distinguir varios niveles.

Nivel 1 (bien demostrado):

Los estímulos luminosos y auditivos modifican las oscilaciones cerebrales.

Eso está ampliamente demostrado.

Nivel 2 (evidencia creciente):

La sincronización gamma modifica:

- actividad de microglía
- flujo sanguíneo
- metabolismo neuronal
- conectividad

Aquí existen numerosos estudios en animales y algunos ensayos clínicos iniciales.

Nivel 3 (todavía especulativo):

Que la sincronización produzca una reorganización sistémica del campo electromagnético cerebral capaz de explicar por sí misma las mejoras cognitivas.

Todavía no hay evidencia sólida.

Es una hipótesis interesante, pero aún abierta.

Lo que me parece más interesante de tu reflexión

Has mencionado algo que creo que representa una evolución conceptual importante.

Has dicho que hasta ahora te habías centrado en:

- microbioma
- microbiota
- sistema neuroentérico
- bioquímica

Pero empiezas a incorporar el componente electromagnético.

Actualmente la neurociencia tiende precisamente a integrar ambos enfoques.

El cerebro no funciona solo mediante moléculas.

Funciona mediante una interacción continua entre:

- bioquímica
- bioelectricidad
- sincronización de redes
- metabolismo
- mecánica vascular
- respuesta inmunitaria

No son sistemas independientes.

Son distintas manifestaciones del mismo sistema dinámico.

¿Y qué hay de la "ciencia soviética secreta"?

Aquí es donde conviene ser prudente.

Durante la Unión Soviética hubo bastante investigación sobre:

- estimulación luminosa
- ritmos cerebrales
- biofeedback
- fototerapia
- sincronización audiovisual

Parte de esos trabajos eran rigurosos.

Otros tenían poca calidad metodológica.

El problema es que muchas publicaciones actuales mezclan estudios serios con afirmaciones extraordinarias sobre tecnologías "secretas", sin documentación sólida. Es mejor evaluar cada estudio por sus datos y no por el aura histórica que se le atribuye.

Mi valoración

Creo que la idea central de Brian Roemmele es **científicamente plausible** si se formula así:

La estimulación audiovisual rítmica, especialmente alrededor de 40 Hz, puede modular la sincronización neuronal y desencadenar cambios funcionales e inmunológicos que podrían contribuir a preservar o mejorar ciertas funciones cognitivas.

Esa afirmación está respaldada por evidencia experimental inicial.

En cambio, afirmaciones como:

- "rejuvenece el cerebro",

- "revierte el Alzheimer",
- "equilibra completamente el campo electromagnético",

van mucho más allá de lo que los datos actuales permiten concluir.

Dicho esto, creo que este campo merece atención porque representa un cambio de paradigma: no solo tratar el cerebro desde la química (fármacos), sino también desde la **dinámica de redes neuronales**, utilizando estímulos sensoriales capaces de modular la actividad cerebral. Es una línea que conecta neurociencia, biofísica, inmunología y fisiología de sistemas, y cuya evolución en los próximos años será especialmente interesante.

Autor conceptual: GPT (Open I) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro

INTER-14: Entrainment oscilatorio gamma (40 Hz) — diferenciación mecanicista respecto a la fotobiomodulación y extensión hipotética al TDAH

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro *Javi Ciborro no reclama autoría del contenido conceptual de este documento; su rol es el de originador y director de la línea de investigación dentro del Corpus Papayaykware.*

Abstract

Brian Roemmele ha divulgado recientemente la hipótesis de que la estimulación audiovisual periódica a 40 Hz constituye una vía terapéutica para el deterioro cognitivo, apoyándose en el programa de investigación GENUS (Gamma ENtrainment Using Sensory stimuli) iniciado en el laboratorio de Li-Huei Tsai en el MIT. Este documento separa tres niveles epistémicos dentro de esa propuesta —evidencia consolidada, evidencia clínica emergente y especulación no verificada— y establece una distinción mecanicista que la literatura divulgativa tiende a diluir: el entrainment oscilatorio gamma no comparte mecanismo con la fotobiomodulación ni con la terapia de luz roja, dos líneas que Javi Ciborro ha tratado previamente en su blog. La primera opera sobre la temporalidad del estímulo, independientemente de su modalidad sensorial; la segunda opera sobre la fotoquímica mitocondrial de una longitud de onda específica. Se propone además una extensión hipotética hacia el TDAH, contrastando el marcador clásico de ratio theta/beta —cuya validez como biomarcador ha sido recientemente cuestionada por un análisis multiverso— con el acoplamiento theta-gamma de fase-amplitud, una vía con mayor respaldo mecanicista. Se declaran los conflictos de interés institucionales relevantes y se cierra con un conjunto de programas de seguimiento verificables, no promesas de investigación futura.

Delimitación del problema

La entrada de Roemmele que motiva este documento combina, en un mismo relato, tres cosas que conviene no tratar como una sola: un mecanismo neurofisiológico con respaldo experimental sólido (la sincronización oscilatoria inducida por estímulos periódicos), un programa clínico en curso con resultados parciales prometedores pero no concluyentes, y una capa narrativa —la referencia a investigación soviética no documentada, la retórica de "rejuvenecimiento cerebral"— que excede ampliamente lo que los datos permiten afirmar. Separar estas capas no es un ejercicio de cautela retórica. Es la condición para que la hipótesis sea útil: una afirmación que mezcla registros verificables y no verificables se vuelve, en la práctica, no falsable como conjunto, aunque partes de ella sí lo sean por separado.

Javi Ciborro ha cubierto en su blog tres líneas relacionadas pero distintas: deterioro cognitivo, TDAH, y dentro de estimulación con luz, la fotobiomodulación y la terapia de luz roja. Ninguna de esas entradas abordó la luz intermitente como vector de sincronización de red. Este documento cierra ese hueco, pero lo hace marcando con precisión dónde termina un dominio y empieza el otro, porque tratarlos como continuación natural uno del otro sería aplicar una analogía estructural sin base causal — exactamente el tipo de error que la norma INTER-8 del corpus exige evitar.

Fundamento neurofisiológico de la sincronización gamma

Las oscilaciones corticales se organizan en bandas de frecuencia —delta, theta, alfa, beta, gamma— que reflejan distintos regímenes de comunicación entre poblaciones neuronales. La banda gamma, convencionalmente definida entre 30 y 80 Hz, se asocia con procesos de integración: unión perceptual entre atributos de un mismo objeto, sostenimiento de representaciones en memoria de trabajo, y coordinación temporal entre regiones corticales distantes. La hipótesis del "binding" por sincronización gamma, formulada originalmente por Wolf Singer y colaboradores en los años noventa, propone que la coherencia de fase entre poblaciones neuronales —no solo su tasa de disparo individual— codifica qué elementos de la actividad cerebral pertenecen a una misma representación.

El entrainment sensorial aprovecha una propiedad conocida de los circuitos talamocorticales: un estímulo periódico externo puede arrastrar la fase de las oscilaciones endógenas hacia su propia frecuencia, un fenómeno bien descrito en el EEG como "steady-state response". Que esto ocurra con luz parpadeante, con clics auditivos, o con vibración táctil, y que el efecto dependa de la frecuencia de repetición del estímulo y no de su naturaleza sensorial, es dato consistente con que el objetivo real del entrainment sea la dinámica de red, no un órgano sensorial concreto. Esto es lo que en el documento de origen se describe correctamente como "marcapasos externo": el estímulo no aporta energía relevante al sistema, redistribuye la fase de una actividad que el cerebro ya genera.

Nivel 1 — evidencia consolidada

Que la estimulación periódica a 40 Hz produce entrainment medible por EEG en sujetos sanos y en pacientes con deterioro cognitivo leve está bien establecido; es el hallazgo más replicado de todo el

programa GENUS y no depende de ninguna interpretación adicional. La cadena original de hallazgos en modelos animales —Iaccarino y colaboradores en 2016, con extensión posterior en Adaikkan et al. (2019) y Martorell et al. (2019), este último ya con estimulación combinada visual y auditiva— mostró en ratones reducción de carga amiloide, activación de microglía con perfil fagocítico, y cambios en la expresión génica relacionada con respuesta inmune tras exposición diaria a luz y sonido a 40 Hz. Ese cuerpo de trabajo, salido del laboratorio de Li-Huei Tsai en el MIT, es sólido dentro de su dominio: modelos murinos, con mecanismo parcialmente caracterizado a nivel de microglía y vasculatura.

La traducción a humanos es más reciente y bastante menos madura de lo que la cobertura divulgativa sugiere. El primer estudio de seguridad y viabilidad en pacientes con Alzheimer probable leve confirmó que la estimulación diaria era tolerada y que el entrainment gamma efectivamente se producía en el EEG humano, sin señales de daño ni de fotosensibilidad problemática en las cohortes estudiadas.

Nivel 2 — evidencia clínica emergente

Aquí es donde el panorama se vuelve más interesante y, a la vez, más frágil metodológicamente. Cognito Therapeutics, la empresa surgida del laboratorio del MIT, ha llevado el protocolo GENUS — comercializado bajo el nombre Spectris— a ensayos de mayor escala. El estudio de viabilidad OVERTURE y su extensión abierta, con datos presentados en la Alzheimer's Association International Conference de 2025, reportaron reducciones relativas del 76% en declive cognitivo, 77% en declive funcional y 69% en atrofia cerebral global a seis meses, además de preservación de sustancia blanca en resonancia magnética. La extensión abierta llegó a describir hasta 9,9 meses de "tiempo ganado" en marcadores clínicos e imagenológicos a los dieciocho meses.

Estas cifras necesitan contexto antes de poder usarse como argumento. Primero, "tiempo ganado" (time saved) es un endpoint compuesto de uso relativamente reciente en oncología y neurodegeneración, no un formato estadístico estándar equivalente a un ensayo con endpoint primario clásico de superioridad; su interpretación depende de cómo se modele la trayectoria de declive esperada en el grupo comparador. Segundo, los datos de OVERTURE proceden de un estudio de viabilidad con extensión abierta —no ciega, sin grupo control en la fase de extensión— lo cual infla sistemáticamente el tamaño de efecto aparente respecto a lo que cabe esperar en un ensayo controlado. Tercero, el ensayo confirmatorio de verdad, el estudio pivotal HOPE (NCT05637801), fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con simulación (sham), con 670 participantes en 70 centros, completó reclutamiento mencionado en la cobertura de 2026 pero todavía no ha reportado resultados de eficacia confirmatoria a fecha de este documento. La solidez real de la hipótesis GENUS en humanos se decide con ese ensayo, no con los datos de viabilidad previos.

Un dato adicional, publicado por el propio MIT en noviembre de 2025, matiza aún más el cuadro: un estudio piloto de seguimiento a dos años en cinco pacientes mostró que las tres participantes que mantuvieron mejor cognición y menor tau fosforilada (pTau217) eran mujeres, mientras que los dos varones del estudio, ambos con Alzheimer de inicio temprano, no mostraron beneficio significativo. La muestra es demasiado pequeña para generalizar, pero introduce la posibilidad de heterogeneidad de respuesta por sexo o por subtipo de la enfermedad, algo que ningún resumen divulgativo del

tema suele mencionar y que cualquier evaluación sería debería señalar como límite, no como nota al pie.

Nivel 3 — la zona especulativa

La idea de que la sincronización gamma inducida reorganiza de forma sistémica el campo electromagnético cerebral, y que esa reorganización explica por sí misma —más allá de los mecanismos celulares ya descritos de aclaramiento amiloide y modulación microglial— las mejoras funcionales observadas, no cuenta hoy con evidencia experimental directa. Es una extrapolación razonable dado lo que sabemos de bioelectricidad cerebral, pero extrapolación al fin.

Hipótesis H1 (corpus INTER-13): *la magnitud del entrainment gamma medido por EEG (coherencia de fase estímulo-respuesta) correlaciona, dentro de un mismo paciente y a lo largo del tiempo de tratamiento, con la magnitud de cambio en marcadores de neuroinflamación en biofluido periférico, de forma independiente al efecto atribuible únicamente a la activación microglial local ya descrita.*

Condición de falsabilidad: si en una cohorte con seguimiento longitudinal de coherencia de fase EEG y biomarcadores plasmáticos (GFAP, NfL, pTau217) no se observa correlación intraindividual significativa tras corrección por comparaciones múltiples, H1 queda refutada como formulada. La hipótesis no exige mecanismo de "campo electromagnético sistémico" en sentido fuerte; exige solo que exista una vía de acoplamiento medible entre sincronización de red y respuesta inflamatoria periférica, que hoy no está establecida.

Diferenciación mecanicista: arrastre gamma frente a fotobiomodulación

Esta es la distinción que la entrada original de Roemmele, y en menor medida la respuesta que la evaluó, no marcan con suficiente nitidez, y es la razón central por la que este documento existe.

La fotobiomodulación y la terapia de luz roja, que Javi Ciborro ya trató en su blog, dependen de la absorción de fotones en un rango de longitud de onda específico —aproximadamente 600 a 1000 nanómetros, con ventanas de eficacia particularmente estudiadas en rojo profundo e infrarrojo cercano— por parte de la citocromo c oxidasa mitocondrial (complejo IV de la cadena respiratoria). Esa absorción modifica la producción de ATP, altera transitoriamente la generación de especies reactivas de oxígeno, y desencadena cascadas de señalización redox-dependientes. El parámetro crítico es el color de la luz, no su temporalidad.

El entrainment gamma no depende del color ni de la longitud de onda del estímulo. Depende exclusivamente de su periodicidad. Esto no es una afirmación teórica: es un hallazgo empírico repetido en la literatura GENUS, donde el mismo efecto de sincronización se obtiene con luz blanca parpadeante, con clics auditivos a 40 Hz, o con estimulación táctil rítmica, siempre que la frecuencia de repetición coincida con la banda gamma. El parámetro crítico aquí es el tiempo entre pulsos, no el fotón.

Tratar ambas líneas como una progresión natural "ya trabajé la luz roja, ahora amplió a la luz intermitente" sería, en términos del corpus, una homologación de dominio sin base mecanicista compartida. Son dos ejes ortogonales que pueden convivir en la misma serie editorial siempre que se presenten como líneas independientes, cada una con su propio nivel de evidencia y su propia cadena causal. Nada impide, dicho esto, que ambas coexistan en un mismo protocolo de intervención, por ejemplo, luz roja continua para efecto mitocondrial local combinada con estimulación gamma pulsátil para efecto de red, pero esa combinación sería, hoy, una hipótesis de diseño experimental por explorar, no una consecuencia lógica de la evidencia existente para cada componente por separado.

Extensión hipotética al TDAH

El TDAH tiene su propia historia con los biomarcadores oscilatorios, y es una historia con más advertencias que certezas. El marcador más divulgado, el ratio theta/beta (TBR), propuesto originalmente por Lubar en 1991 y que llegó a recibir autorización de la FDA como ayuda diagnóstica en 2013, ha sido objeto de un cuestionamiento creciente. Una revisión de literatura describe hallazgos inconsistentes entre estudios —algunos reportan theta elevado, otros theta reducido, con la edad y el curso del desarrollo pesando tanto o más que el diagnóstico— y un análisis multiverso publicado en eLife en 2026, que evaluó cientos de especificaciones analíticas plausibles sobre dos grandes bases de datos EEG, no encontró evidencia consistente de que el TBR diferencie a personas con TDAH de controles sanos una vez se controla adecuadamente por la frecuencia alfa individual y la pendiente aperiódica del espectro. El TBR, dicho sin rodeos, no sostiene hoy su estatus de biomarcador diagnóstico.

Existe, sin embargo, una vía distinta y menos divulgada con mejor anclaje mecanicista: el acoplamiento de fase-amplitud entre theta y gamma. Kim y colaboradores (2015) describieron en niños con TDAH un patrón alterado de acoplamiento theta-gamma —la modulación de la amplitud de oscilaciones gamma rápidas por la fase de oscilaciones theta lentas, un mecanismo candidato para la coordinación entre módulos de procesamiento de información a distinta escala temporal— proponiéndolo como marcador neurofisiológico más específico que la potencia espectral aislada de cualquier banda.

Hipótesis H2 (corpus INTER-13): *la aplicación de entrainment gamma periódico, aplicado como intervención breve pre-tarea (no como tratamiento continuo), modifica transitoriamente el índice de acoplamiento de fase-amplitud theta-gamma en niños o adultos con TDAH, y esa modificación correlaciona con mejora en medidas conductuales de atención sostenida en la misma sesión.*

Condición de falsabilidad: si un diseño cruzado, controlado con estimulación sham de frecuencia no-gamma, no muestra diferencia en el índice de acoplamiento de fase-amplitud ni en desempeño conductual entre condición activa y control, H2 queda refutada. Es importante remarcar que esta hipótesis no tiene, a día de hoy, ningún ensayo publicado que la haya puesto a prueba directamente: es una extrapolación razonada desde dos cuerpos de literatura que hasta ahora no se han cruzado —GENUS en Alzheimer y acoplamiento theta-gamma en TDAH— no una síntesis de resultados existentes.

Relación homológica con METFI: declaración explícita

Dentro del marco METFI se ha tratado la dinámica de forzamiento periódico sobre sistemas toroidales acoplados como principio general de reorganización de fase en sistemas complejos. Es tentador leer el entrainment gamma como una instancia particular de ese principio —un forzamiento externo periódico que reorganiza la fase de un sistema oscilatorio acoplado, en este caso la red talamocortical en lugar de un sistema geofísico. Esa lectura se declara aquí, siguiendo la norma del corpus, como homología estructural entre dos formalismos matemáticamente análogos, no como evidencia de que el mismo mecanismo causal opere en ambos dominios. METFI describe un sistema electromagnético planetario con parámetros físicos propios; su aplicación a la dinámica talamocortical es un ejercicio de transferencia formal —útil para generar hipótesis, no un argumento a favor de la validez empírica de ninguna de las dos hipótesis por separado.

Conflictos de interés y evaluación de fuentes

La mayor parte de los datos clínicos favorables sobre GENUS/Spectris proceden de estudios patrocinados por Cognito Therapeutics, empresa derivada del laboratorio de Li-Huei Tsai en el MIT, quien mantiene vinculación con la compañía como cofundadora. Esto no invalida los datos —el diseño de los ensayos posteriores, incluido el pivotal HOPE con enmascaramiento y control sham, sigue estándares regulatorios exigentes— pero sí exige lectura atenta de qué estudios cuentan con revisión independiente y cuáles no. La replicación por grupos sin vinculación comercial con Cognito Therapeutics es todavía limitada, lo cual es habitual en tecnologías médicas en fase de desarrollo comercial temprano, pero debe declararse explícitamente en lugar de mencionarse solo de pasada.

La literatura sobre TBR en TDAH no presenta ese mismo tipo de conflicto comercial concentrado, pero sí un problema metodológico transversal heterogeneidad de protocolos de análisis espectral, que el propio estudio multiverso de 2026 identifica como causa probable de tres décadas de resultados contradictorios.

Programas de seguimiento

- **Protocolo A — replicación de entrainment con seguimiento de coherencia de fase.** Registro EEG de 64 canales antes, durante y después de 20 minutos de estimulación audiovisual a 40 Hz en sujetos sanos, calculando coherencia de fase estímulo-respuesta en electrodos occipitales y frontales, con sesión sham de frecuencia no-gamma (por ejemplo, 23 Hz) como control cruzado en la misma cohorte.
- **Protocolo B — biomarcadores periféricos ligados a H1.** En pacientes ya matriculados en programas de estimulación gamma domiciliaria, extracción de biofluido (plasma) para GFAP, NfL y pTau217 en los mismos puntos temporales que la evaluación de coherencia EEG, con análisis de correlación intraindividual y corrección de Benjamini-Hochberg para comparaciones múltiples, siguiendo el marco CPEA-PFI-1 ya establecido en el corpus.
- **Protocolo C — acoplamiento theta-gamma pre-tarea en TDAH (H2).** Diseño cruzado en adultos con diagnóstico de TDAH: sesión de 10 minutos de entrainment gamma frente a sesión sham inmediatamente antes de una tarea de atención sostenida tipo Continuous Performance

Test, con registro EEG continuo para calcular índice de modulación de fase-amplitud theta-gamma antes y después de cada condición.

- **Protocolo D — separación de ejes fotobiomodulación/entrainment.** Diseño factorial 2x2 en modelo animal o línea celular relevante: luz roja continua (efecto fotoquímico) combinada o no con luz blanca pulsátil a 40 Hz (efecto de entrainment), midiendo por separado marcadores mitocondriales (ATP, potencial de membrana) y marcadores de sincronización de red, para comprobar si los dos ejes son aditivos, independientes o interactúan.
- **Seguimiento documental — resultados del ensayo HOPE.** Revisión trimestral de registros públicos de ensayos clínicos (ClinicalTrials.gov, NCT05637801) y de comunicados de Cognito Therapeutics, incorporando los resultados de eficacia confirmatoria en cuanto se publiquen, dado que son el dato que decide si el Nivel 2 de este documento se consolida o se revisa a la baja.

Resumen

- El entrainment gamma a 40 Hz cuenta con evidencia sólida de que produce sincronización oscilatoria medible por EEG; eso está bien establecido en animales y en humanos.
- Los datos clínicos de eficacia en Alzheimer (OVERTURE, extensión abierta) son prometedores pero proceden de diseños sin control cegado en su fase abierta y están patrocinados por la empresa que comercializa el dispositivo; el ensayo pivotal HOPE, con datos aún pendientes de reportar, es la prueba real.
- Un estudio piloto del MIT con seguimiento a dos años sugiere heterogeneidad de respuesta por sexo o subtipo de enfermedad, un matiz ausente de la mayoría de coberturas divulgativas.
- La hipótesis de reorganización electromagnética sistémica como mecanismo causal de las mejoras clínicas no tiene respaldo experimental directo; se formula aquí como H1, con condición de falsabilidad explícita.
- El entrainment gamma y la fotobiomodulación/terapia de luz roja son mecanismos ortogonales —temporalidad del estímulo frente a longitud de onda— y no deben presentarse como líneas continuas de un mismo eje.
- El ratio theta/beta como biomarcador de TDAH ha perdido respaldo tras un análisis multiverso reciente; el acoplamiento de fase-amplitud theta-gamma es una vía alternativa con mejor anclaje mecanicista, aunque sin ensayos que prueben directamente la hipótesis H2 propuesta aquí.
- La homología con METFI se declara explícitamente como analogía estructural entre formalismos, no como mecanismo compartido demostrado.
- Cognito Therapeutics, la empresa que patrocina la mayoría de los datos clínicos favorables, es una spin-off del laboratorio que originó la hipótesis; esto se declara como conflicto de interés relevante, no como motivo de exclusión de la fuente.

Referencias

1. Iaccarino, H.F. et al. (2016), *Nature*. Primer estudio en ratones mostrando reducción de placa amiloide y activación microglial tras estimulación visual a 40 Hz. Origen del programa GENUS;

sin conflicto comercial en esta publicación inicial, previa a la fundación de Cognito Therapeutics.

2. **Martorell, A.J. et al. (2019), *Cell*.** Extiende el hallazgo a estimulación audiovisual combinada en ratones, con mayor efecto que la modalidad visual aislada.
3. **Adaikkan, C. et al. (2019), *Neuron*.** Caracteriza mecanismos celulares adicionales del entrainment gamma en modelos murinos.
4. **Estudios de seguridad y viabilidad en humanos, laboratorio de Tsai/MIT (NCT04042922, NCT04055376).** Primeras traducciones a pacientes con Alzheimer probable leve; establecen seguridad y entrainment medible por EEG, no eficacia clínica a gran escala.
5. **Hajos, M. et al. (2024), *Frontiers in Neurology* — ensayo OVERTURE.** Datos de viabilidad y su extensión abierta; conflicto de interés declarado (patrocinado por Cognito Therapeutics).
6. **Estudio piloto de seguimiento a dos años, MIT News (noviembre de 2025), publicado en *Alzheimer's & Dementia*.** Muestra muy pequeña (n=5); relevante por señalar heterogeneidad de respuesta por sexo/subtipo, dato con potencial de matizar el optimismo divulgativo dominante.
7. **Ensayo pivotal HOPE (NCT05637801), Cognito Therapeutics.** Fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con sham; reclutamiento completo (670 participantes) según cobertura de 2026; resultados de eficacia aún no reportados a la fecha de este documento — es el dato que debe seguirse activamente.
8. **Kim, J.W. et al. (2015), *Neuroscience Letters*.** Acoplamiento theta-gamma de fase-amplitud como marcador neurofisiológico candidato en TDAH infantil; base de la hipótesis H2 de este documento.
9. **Análisis multiverso del ratio theta/beta en TDAH (eLife, 2026).** Evidencia reciente y metodológicamente robusta en contra de la validez del TBR como biomarcador diagnóstico una vez controlados frecuencia alfa individual y pendiente aperiódica.
10. **Singer, W. y Gray, C.M. (1995), *Annual Review of Neuroscience*.** Formulación clásica de la hipótesis de binding por sincronización gamma; fundamento teórico general para el papel funcional de esta banda de frecuencia.
11. **Nature de 2024 (Murdock et al., grupo Tsai/MIT)** que identifica un mecanismo concreto: la estimulación gamma multisensorial activa interneuronas VIP, que regulan la pulsatilidad arterial y facilitan el aclaramiento glinfático de amiloide. Es un hallazgo real, revisado por pare. Ojo: es en ratones (modelo 5XFAD), no en humanos

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024


N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo