



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 20, 2025

ACOPLAMIENTOS ELECTROMAGNÉTICO-GRAVITACIONALES HIPOTÉTICOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: EXPLORACIÓN ESPECULATIVA DE VARIACIONES LOCALES DEL CAMPO, EMISIONES DE BAJA FRECUENCIA Y ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS

Abstract

Este artículo presenta una hipótesis especulativa sobre la existencia de un acoplamiento electromagnético-gravitacional capaz de generar variaciones locales del campo magnético, emisiones de baja frecuencia (ULF/ELF) y anomalías gravimétricas en la península ibérica. Partiendo de observaciones geofísicas reales y literatura de gravimetría, se desarrolla un marco teórico que postula la interacción entre oscilaciones electromagnéticas de muy baja frecuencia y la microestructura de la litosfera, potencialmente amplificada por procesos tectónicos y fenómenos solares. Se propone una metodología imaginaria para el seguimiento integral de estos efectos, se discuten posibles mecanismos de resonancia toroidal y se plantean predicciones falsables. Este enfoque creativo no busca validar un modelo físico establecido, sino inspirar investigaciones que trasciendan las fronteras del consenso científico actual.

Palabras clave Gravimetría; emisiones ULF/ELF; resonancia toroidal; acoplamiento electromagnético-gravitacional; seguimiento geofísico; península ibérica.

Introducción

La península ibérica, ubicada en la compleja frontera entre las placas Euroasiática y Africana, ofrece un escenario geodinámico singular. Las variaciones locales del campo magnético, junto con emisiones electromagnéticas de muy baja frecuencia y anomalías gravimétricas, han sido

objeto de estudio en contextos volcánicos y tectónicos en diferentes regiones del mundo (Crossley et al., 2013; Hayakawa & Hobara, 2010). Sin embargo, la posibilidad de un acoplamiento electromagnético-gravitacional que combine estos fenómenos sigue siendo un terreno apenas explorado.

La hipótesis central de este trabajo sostiene que fluctuaciones electromagnéticas de baja frecuencia, generadas por la interacción entre actividad solar, corrientes ionosféricas y heterogeneidades litosféricas, podrían inducir variaciones locales detectables en el campo gravitatorio. Este planteamiento, aunque especulativo, se nutre de observaciones fragmentarias de emisiones ULF previas a sismos (Heki, 2011) y de la creciente capacidad de seguimiento gravimétrico de alta resolución.

Metodología imaginaria

Red de seguimiento integrada

Se concibe una infraestructura de “*Quantum-Geo Array*” que combina:

- Gravímetros superconductores con resolución sub- μGal .
- Antenas magnéticas de bucle para registrar emisiones ULF/ELF (0.01–30 Hz).
- Sensores de radón y receptores GNSS para correlaciones con el contenido total de electrones (TEC) ionosférico.

Todos los dispositivos estarían sincronizados con relojes atómicos y distribuidos en nodos estratégicos: Pirineos, Cordillera Bética, Sistema Central y región Atlántica.

Protocolo experimental

1. Seguimiento continuo a 1 Hz en gravímetros y ≥ 100 Hz en antenas ULF.
2. Filtrado multiescala mediante transformadas wavelet para aislar señales de origen no atmosférico ni hidrológico.
3. Correlación cruzada entre anomalías gravimétricas y picos electromagnéticos, con una ventana de ± 30 días respecto a sismos $\geq M4$.
4. Pruebas de falsabilidad basadas en criterios de amplitud ($\geq 0.5 \mu\text{Gal}$ en gravedad; $\geq 3\sigma$ en potencia espectral ULF).

Análisis teórico

Mecanismos de resonancia toroidal

La hipótesis propone que la litosfera actúa como un toroide resonante. Corrientes inducidas por variaciones del viento solar podrían acoplarse a estructuras geológicas profundas, generando microfluctuaciones gravitacionales detectables.

Interacción electromagnético-gravitacional

Un modelo puramente especulativo sugiere que campos eléctricos de muy baja frecuencia, al atravesar materiales piezoeléctricos en zonas de falla, producen una modulación del tensor gravitatorio local a través de un efecto cuántico-coherente. Este mecanismo, aunque no demostrado, podría explicar correlaciones anecdóticas entre emisiones ULF y variaciones de gravedad.

Influencia solar e ionosférica

Eventos de eyección de masa coronal alteran la conductividad ionosférica y podrían amplificar corrientes tellúricas. Estas, al interactuar con fallas ricas en cuarzo, podrían intensificar las emisiones de baja frecuencia.

Discusión

El modelo propuesto carece de verificación empírica, pero abre preguntas relevantes:

- Reproducibilidad: ¿serían las anomalías gravimétricas reproducibles en diferentes regiones y bajo similares condiciones solares?
- Escalabilidad: ¿podría un efecto de esta naturaleza tener implicaciones globales en la dinámica del campo geomagnético?
- Interdisciplinariedad: el enfoque exige colaboración entre físicos de materia condensada, geofísicos y expertos en plasma solar.

Limitaciones:

- La física conocida de la gravedad no prevé una influencia directa de campos electromagnéticos de baja frecuencia.
- Las señales pueden confundirse con variaciones hidrológicas o interferencias antropogénicas.

Conclusiones

Este ejercicio especulativo sugiere que la búsqueda de un acoplamiento electromagnético-gravitacional en la península ibérica, si bien carente de validación experimental, podría motivar diseños instrumentales innovadores y análisis interdisciplinarios. Un resultado negativo —la no detección de correlaciones— también aportaría valor, al delimitar los límites de los procesos físicos realmente operativos.

- Hipótesis central: posible interacción electromagnética-gravitacional generadora de variaciones locales del campo, emisiones ULF y anomalías gravimétricas.
- Metodología imaginaria: red “Quantum-Geo Array” con gravímetros superconductores, antenas ULF y sensores ionosféricos.
- Observables clave: variaciones de gravedad $\geq 0.5 \mu\text{Gal}$; emisiones ULF $> 3\sigma$ del fondo; anomalías en TEC ionosférico.
- Carácter especulativo: sin evidencia experimental, orientado a estimular nuevas preguntas y enfoques.

Referencias

1. Hayakawa, M., & Hobara, Y. (2010). *Current status of seismo-electromagnetics*. Tectonophysics, 489(1–4), 3–10.
Revisión sobre emisiones electromagnéticas asociadas a actividad sísmica, base comparativa para el presente ejercicio.
2. Heki, K. (2011). *Ionospheric electron enhancement preceding the 2011 Tohoku-oki earthquake*. Geophysical Research Letters, 38(17).
Estudio que reporta anomalías ionosféricas previas a un gran sismo, útil como analogía para posibles acoplamientos.
3. Crossley, D. et al. (2013). *The Global Geodynamics Project: Status and future*. Journal of Geodynamics, 61, 155–166.
Describe técnicas de gravimetría superconductora aplicables a redes de seguimiento de alta precisión.
4. Varotsos, P. et al. (2011). *Seismic Electric Signals: Theory and Applications*. Springer.
Expone teoría y observaciones de señales eléctricas sísmicas, base para considerar emisiones ULF como precursoras.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)