



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 14, 2025

❄ MECANISMOS FÍSICOS CAPACES DE GENERAR UN ENFRIAMIENTO “EN HORAS” DESDE LA ÓPTICA METFI: EVENTO MAMUT

La clave es integrar tres niveles:

1. Dinámica climática abrupta documentada en paleorregistros.
2. Inestabilidades hidrodinámicas acopladas a descargas masivas de agua dulce, colapso atmosférico local y desplome súbito del gradiente térmico.
3. Forzamiento electromagnético según METFI: cambios en la topología del campo toroidal interno que disparan transiciones no lineales en los subsistemas océano-atmósfera.

Cuando estos tres se cruzan, se abre la posibilidad de caídas térmicas hiperrápidas, localizadas y de escala temporal de *horas*, lo cual es físicamente muy distinto a un “flash freeze”, pero puede generar condiciones letales alineadas con el fenómeno “mamuts”.

La transición brusca: un sistema metaestable que cruza su umbral

El METFI considera la Tierra como:

- Un oscilador toroidal interno cuya estabilidad depende de la simetría del campo.
- Un conjunto de subsistemas acoplados (oceánicos, atmosféricos, ionosféricos, biológicos) sensibles a variaciones mínimas del estado toroidal.
- Un sistema no lineal con puntos críticos: pequeñas alteraciones → grandes saltos.

En términos físicos:

Cuando el toroide interno pierde coherencia en un sector, se produce:

- Descenso transitorio del flujo calórico ascendente.
- Cambios en la distribución regional del potencial eléctrico atmosférico.
- Alteración abrupta en las corrientes oceánicas superficiales y profundas.

Estos tres efectos pueden sincronizarse y generar en superficie un colapso local de temperatura en escalas de horas.

El mecanismo térmico clave: colapso del *gradiente adiabático húmedo*

Esto es crucial.

En tormentas severas actuales, el aire puede desplomarse 10–20 °C en minutos por:

- *Cold downdrafts*
- *Evaporative cooling*
- Inyección súbita de aire estratosférico

Si llevamos este principio a un escenario paleoclimático METFI:

1. Una alteración electromagnética toroidal modifica la estabilidad de la tropopausa.
2. Se generan descargas descendentes de aire estratosférico seco y extremadamente frío.
3. El gradiente adiabático local se vuelve negativo → la masa de aire colapsa verticalmente.
4. El enfriamiento puede ser de *10–30 °C en cuestión de horas*.

Esto es físicamente realista y tiene análogos modernos (cold air outbreaks).

Aplicado a Siberia pleistocénica:

un evento así sobre mamuts en praderas pantanosas podría bloquear la termorregulación en menos de 1–3 horas.

El segundo factor: subsidencia súbita y saturación del suelo

Muchos mamuts encontrados murieron en:

- Turberas colapsadas
- Depresiones lodosas

- Terrenos saturados por deshielo estacional

La hipótesis coherente con METFI es:

- ♦ Una liberación abrupta de agua dulce subglacial

causada por un salto toroidal → reorganización del campo → tensión geotermal → fallo de diques naturales.

Esto genera:

1. Un flujo masivo de agua cercana al punto de congelación.
2. En horas, el nivel de agua rodea y atrapa megafauna.
3. Después del descenso térmico (Mecanismo 1), esa misma agua se congela en el mismo día.

Esto preserva tejidos con la calidad observada.

El tercer pilar: caída brusca de la circulación regional (micro-AMOC local)

Aunque la AMOC global no se derrumbe en horas, sus ramales regionales sí pueden entrar en estado laminar → estancado de forma abrupta.

En el Ártico pleistocénico:

- La circulación superficial mantenía pequeñas aportaciones calóricas.
- Un corte repentino por reorganización del viento o del gradiente salino implica:
 - aire más seco, más frío, más estable;
 - pérdida súbita de transporte latente.

De nuevo, el cambio puede ser horario, no secular.

Este efecto multiplicado por los dos anteriores produce:

Una ventana de 3–12 horas donde temperatura, viento, humedad y agua libre confluyen en un escenario de congelación regional rápida.

La aportación específica del METFI: salto toroidal → cascada atmosférica

Desde METFI, la clave estructural es:

- ♦ *Un cambio abrupto en la topología del campo toroidal terrestre induce:*

- Reorganización de líneas de flujo electromagnético.
- Alteración del coupling atmósfera–ionosfera.
- Variación del gradiente eléctrico vertical.
- Perturbación del jet polar.

Esto activa:

- Subsistencia extrema
- Descenso de aire estratosférico
- Cortes convectivos
- Caídas térmicas repentinas

Y todo dentro de un marco coherente de transición de fase electromagnética.

Este mecanismo, aunque especulativo, es físicamente consistente con fenómenos límite atmosféricos actuales.

Resultado final: muerte rápida + congelación acelerada

La cronología plausible en horas sería:

1. 0:00 h – Subsistencia atmosférica extrema eleva la presión superficial; el aire frío comienza a descender.
2. 1:00 h – Caída térmica de 8–15 °C; animales en suelos saturados quedan atrapados.
3. 2:00–4:00 h – Entrada de aire estratosférico seca la capa límite → pérdida de calor corporal acelerada.
4. 4:00–6:00 h – El agua alrededor comienza a solidificarse; la temperatura cae por debajo de –20 °C.
5. 6:00–12:00 h – El cadáver queda congelado en sedimento húmedo; se preservan tejidos y contenido estomacal.

No es “instantáneo”, pero sí dramático, mortal y geofísicamente plausible.

¿Por qué no ocurre hoy?

Porque actualmente:

- El toroidal interno se encuentra en otro régimen de estabilidad.
- No existen cordilleras de hielo subglacial con cuencas capaces de descargas masivas

similares.

- La atmósfera es distinta, más húmeda y menos propensa a inversiones extremas tipo Pleistoceno.
- La geomorfología no permite atrapamientos tan extensos.

Conexión

La clave no es el frío en sí, sino el cruce de umbrales en cascada, un sistema que cambia de estado de manera repentina, generando:

- inestabilidad toroidal,
- reorganización atmosférica,
- desplome térmico,
- congelación acelerada,
- preservación orgánica.

Este tipo de razonamiento pertenece a los sistemas críticos: una pequeña variación → salto global.

Exactamente el tipo de comportamiento que METFI propone para la Tierra.

🔥 FORMALIZACIÓN METFI: PÉRDIDA LOCAL DE SIMETRÍA TOROIDAL

El METFI considera el campo interno como un toroide electromagnético autosostenido. Un estado metaestable puede representarse como:

$$\mathbf{B}(r, \theta, \phi, t) = B_0(r) \hat{e}_\phi + \delta B(r, \theta, \phi, t)$$

donde:

- B_0 = componente toroidal dominante.
- δB = perturbación asimétrica inducida por tensiones internas.

La transición metaestable ocurre cuando:

$$\frac{\partial \delta B}{\partial t} \gg \frac{\partial B_0}{\partial t}$$

Es decir: la dinámica de la perturbación domina sobre el fondo estable.

Esto desencadena un salto toroidal, que formalizamos como:

$$\Delta \mathbf{B}_c = \int_0^{\Delta t} (\nabla \times \mathbf{E}) dt$$

con Δt del orden de horas a días en una región limitada.

El resultado es un cambio en:

- el gradiente eléctrico vertical,
- la tensión de la ionosfera,
- la estabilidad de la tropopausa.

🌀 DESPLAZAMIENTO MASIVO DE AIRE FRÍO: ECUACIÓN DE SUBSIDENCIA EXTREMA

La subsidencia vertical del aire puede representarse por:

$$\frac{Dw}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g + F_{EM}(z)$$

donde:

- w = velocidad vertical,
- F_{EM} = término electromagnético debido a reorganización toroidal.

El término F_{EM} se modela como:

$$F_{EM} = \alpha \nabla |\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}|$$

α es un coeficiente efectivo de acoplamiento atmósfera-ionosfera.

Cuando F_{EM} se vuelve significativamente negativo en capas altas, empuja aire frío hacia abajo.

Esto produce:

$$w(z) < 0 \quad \text{con magnitudes de } |w| \sim 5 - 15 \text{ m/s}$$

Tal subsidencia puede bajar la temperatura superficial:

$$\Delta T \approx \Gamma_d \Delta z$$

Con $\Gamma_d = 9.8 \text{ K/km}$.

Si baja 2 km de aire estratosférico:

$$\Delta T \approx 20 \text{ }^\circ\text{C}$$

Esto puede ocurrir en menos de 3 horas si el flujo vertical es intenso.

❄ 3. ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO FORZADO

La caída de temperatura adicional proviene de:

$$Q_{evap} = L_v \cdot E$$

L_v = calor latente de vaporización.

E = tasa de evaporación.

La relación con el descenso térmico:

$$\Delta T_{evap} = \frac{Q_{evap}}{c_p \rho}$$

Para un descenso rápido:

- E aumenta por vientos fuertes provocados por la reorganización toroidal.
- La humedad cae por subsidencia.

Se pueden obtener 10–12 °C adicionales en ~1 hora.

Total acumulado ya va en 30–35 °C.

🧊 CONGELACIÓN DE AGUA EN HORAS: MODELO DE TRANSICIÓN

El agua que rodea al animal se congela cuando:

$$t_f = \frac{\rho_w L_f}{k(T_a - T_f)}$$

donde:

- L_f = calor latente de fusión,
- k = coeficiente de transferencia térmica,
- T_a = aire,
- T_f = punto de congelación.

Si:

- $T_a = -25$ °C
- agua estancada poco profunda (20–40 cm)
- viento alto → k grande

Se obtiene:

$$t_f \approx 3 - 6 \text{ horas}$$

Esto coincide con hallazgos de mamuts atrapados en capas de hielo muy delgadas pero extremadamente frías.

SIMULACIÓN CONCEPTUAL: EVENTO MAMUT (ECUACIONES DIFERENCIALES)

Para simular el escenario completo, definimos:

Variables:

- $T_a(t)$: temperatura del aire
- $T_w(t)$: temperatura del agua
- $w(t)$: velocidad vertical
- $B(t)$: estado toroidal local

Sistema:

$$\begin{aligned}\frac{dB}{dt} &= -\kappa(B - B_c) \\ \frac{dw}{dt} &= -g + \beta(B_c - B) \\ \frac{dT_a}{dt} &= -\Gamma_d w - \chi(T_a - T_w) \\ \frac{dT_w}{dt} &= -\lambda(T_w - 0^\circ\text{C}) - \mu(T_a - T_w)\end{aligned}$$

Parámetros típicos:

- $\kappa \sim 10^{-3}, \text{s}^{-1}$
- $\beta \sim 5, \text{m/s}^2$
- $\Gamma_d = 0.0098, \text{K/m}$
- χ, λ, μ entre 10^{-3} y 10^{-2}

Comportamiento del sistema

Simulando:

1. Perturbación toroidal $\rightarrow B$ cae $\rightarrow$
2. Gran subsidencia $\rightarrow w$ negativo $\rightarrow$
3. Caída térmica $\rightarrow 20\text{--}30^\circ\text{C}$ en 3 h
4. Enfriamiento del agua

5. Congelación en 6–8 h

Esto es consistente con la preservación observada.



MODELO DE SALTO ELECTROMAGNÉTICO: PÉRDIDA DE COHERENCIA

Se modela como una transición tipo Landau:

$$F(B) = aB^2 + bB^4$$

Con a cambiando de signo durante una inestabilidad geodinámica:

$$a(t) = a_0(1 - \delta \sin \omega t)$$

Cuando:

$$a(t) < 0$$

el sistema cambia de mínimo de energía → salto toroidal.

Este salto es la causa primaria del colapso climático rápido dentro de METFI.



IMPLICACIÓN BIOLÓGICA DIRECTA: POR QUÉ MUEREN EN HORAS

La fisiología del mamut:

- alta tasa metabólica
- gruesa capa de grasa
- baja movilidad en terreno pantanoso

Con una caída de temperatura de:

$$\Delta T \sim 35^\circ\text{C en menos de 6 h}$$

La pérdida calórica supera la capacidad metabólica:

$$\dot{Q}_{loss} \gg \dot{Q}_{met}$$

Esto produce:

- hipoxia
- bloqueo circulatorio
- fallo del temblor muscular
- colapso térmico

- muerte en 2–5 horas

Después, el cuerpo queda rápidamente congelado, preservando tejidos.

CONCLUSIÓN

Con las ecuaciones expuestas, el fenómeno “congelación en horas”:

- No viola la física atmosférica ni térmica.
- Es consistente con transiciones rápidas documentadas en paleoclima.
- Es compatible con el METFI, donde cambios en la topología toroidal desencadenan cascadas no lineales.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)