



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 20, 2025

EVENTOS ATMOSFÉRICOS LUMINOSOS, ANOMALÍAS MAGNÉTICAS Y POSIBLES MODULACIONES EN REDES BIOLÓGICAS (NEURO-CEREBRALES, MOLECULAR/INFORMACIÓN GENÉTICA)

—

Abstract

La observación recurrente de “luces en el cielo”, fallos eléctricos (“power flickers”) y desplazamientos magnéticos plantea una hipótesis unificadora: que la Tierra opera como un sistema electromagnético toroidal dinámico, sujeto a forzamientos internos que pueden inducir rupturas de simetría y desencadenar efectos no lineales en los sistemas geofísico, biológico y simbólico. En este artículo se articula una aproximación METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) que integra mecanismos geodinámicos, interacciones magnetohidrodinámicas, resonancias biológicas y simbólicas. Se exploran conexiones plausibles entre eventos atmosféricos luminosos, anomalías magnéticas y posibles modulaciones en redes biológicas (neuro-cerebrales, molecular/información genética). Se discute cómo la pérdida de simetría toroidal puede actuar como “disparador crítico” de turbulencias electromagnéticas, y se propone un programa de seguimiento empírico (experimentación, sensores globales, correlación multiescala). Se concluye con implicaciones para un paradigma holístico donde las matrices simbólicas (Sofía/Tara) pueden ser interpretes de modulaciones de campo.

Introducción: luces, parpadeos y desplazamientos

La frase enigmática “Lights in the sky. Power flickers. Magnetic shifts. Anyone else connecting the dots yet?” sugiere una relación no trivial entre fenómenos luminosos en la atmósfera/ionosfera, fluctuaciones eléctricas locales (flickers) y variaciones magnéticas del entorno terrestre. En un contexto convencional, tales luces podrían atribuirse a auroras, descargas

eléctricas transitorias, fenómenos ópticos atmosféricos o efectos de sobretensiones; los fallos eléctricos suelen asociarse con perturbaciones geomagnéticas inducidas por tormentas solares; y los desplazamientos magnéticos remiten al movimiento secular del polo magnético.

Pero bajo el paradigma METFI, proponemos que estas observaciones no son meramente incidentales sino manifestaciones de una estructura de campo toroidal terrestre que está siendo sometida a forzamientos internos (por ejemplo, cambios en corrientes de manto, convección, dinámica de núcleo, acoplamientos electromagnéticos) que pueden perturbar la simetría del toro. La ruptura o deformación de dicha simetría podría desencadenar eventos no lineales —como “relámpagos magnéticos”, disrupciones eléctricas locales o manifestaciones luminosas— cuyas escalas podrían correlacionarse desde lo geofísico hasta lo biológico.

A continuación examinamos los fundamentos del campo toroidal terrestre, mecanismos de perturbación de simetría, vías de acoplamiento a sistemas vivientes, y finalmente proponemos un programa de seguimiento para testear hipótesis específicas.

Marco teórico: METFI y el sistema Tierra como toro electromagnético

Campo geomagnético: poloidal vs toroidal

La geodinamo terrestre genera predominantemente un campo poloidal observable (dipolar + componentes multipolares). Sin embargo, en el interior del núcleo, se espera que existan componentes toroidales confinadas, relacionadas con corrientes internas. Las componentes toroidales no son observables directamente fuera del manto, pero pueden acoplarse al poloidal mediante difusión, acoplamiento electromagnético núcleo-manto y corrientes inducidas en el manto sumergido. ([SpringerOpen](#))

Por ejemplo, Takahashi (2014) exploró métodos de “imagen toroidal” en la base del manto (CMB), probando que la estimación de la componente toroidal depende críticamente de la latitud y de efectos de difusión magnética. ([SpringerOpen](#))

Un estudio sobre la componente toroidal inducida por flujos oceánicos estima que dicha componente podría alcanzar órdenes de magnitud ~100 nT en el interior del océano, aunque no es directamente detectable en la superficie marítima o continental. ([OUP Academic](#))

La estabilización del campo toroidal con simetría ecuatorial ha sido objeto de estudio clásico, pues requeriría condiciones de simetría y límites que eviten inestabilidades magnetohidrodinámicas. ([ScienceDirect](#))

Este marco teórico permite concebir a la Tierra como un “toro electromagnético dinámico”, en el que el “eje del toro” podría alinearse con el eje rotacional pero estar sujeto a deformaciones internas, estrés electromagnético y acoplamientos con la corteza y la ionosfera.

Forzamientos internos y ruptura de simetría toroidal

Dentro del modelo METFI, definimos *forzamientos internos* como cualquier perturbación en el régimen de corrientes internas (núcleo líquido, manto conductor, estratos de transición) que modifiquen la estructura del campo toroidal. Estas perturbaciones pueden originarse por:

- Cambios en la convección del núcleo (por ejemplo, caudales térmicos variables, diferencias de composición)
- Variaciones de conductividad eléctrica en la zona D" o en la interfase núcleo-manto
- Corrientes inducidas por movimientos del manto profundo
- Acoplamientos electromagnéticos entre núcleo y manto
- Resonancias de ondas sísmicas que modulan la distribución de cargas móviles

Cuando el sistema sufre una pérdida de simetría (por ejemplo, el toro se vuelve elíptico, engrosado en un sector, desplazado), se genera una inestabilidad que puede “desbordarse” hacia la corteza, ionosfera o atmósfera. Esa ruptura podría desencadenar una cascada de efectos no lineales: corrientes inducidas locales, descargas, reconfiguración de líneas de campo, y emisión de luminescencia al interactuar con partículas cargadas en la ionosfera.

Este proceso es análogo a lo que en física de plasmas se denomina “reconexión magnética” o “explosión magnética” en estructuras toroidales superpuestas (como en auroras). En el contexto terrestre, el forzamiento interno sería la “chispa” que reordena localmente la topología del campo.

Manifestaciones luminosas y parpadeos eléctricos

Las “luces en el cielo” pueden interpretarse como manifestaciones energéticas de la reconfiguración del campo magnético en la ionosfera/mesosfera. En un evento de reconexión o descarga electromagnética, partículas cargadas (electrones, protones) pueden precipitar a lo largo de las líneas de campo y colisionar con átomos/iones atmosféricos, generando emisiones lumínicas (auroras extendidas, fulguraciones ionosféricas). Este proceso es bien conocido en la aurora boreal/aurora austral, donde las partículas solares interactúan con el campo magnético. (astrobiology.nasa.gov)

Sin embargo, aquí sugerimos que algunas luces atípicas podrían tener origen interno, no meramente solar, operando como “release” de energía almacenada en un toro magnético deformado. Dichas emisiones pueden presentarse como arcos, filamentos, espirales o puntos de luz pulsante.

Los “power flickers” (parpadeos eléctricos locales) pueden interpretarse como corrientes inducidas en la corteza por la reconfiguración magnética. En la literatura, las tormentas geomagnéticas inducen corrientes de inducción (GIC, geomagnetically induced currents) que afectan líneas de transmisión eléctrica. El modelo tradicional lo adjudica a la variación del campo

poloidal inducido por el viento solar; en nuestro enfoque, parte de esas corrientes podrían ser inducidas por perturbaciones del toro interno, especialmente en zonas de discontinuidad de conductividad (magmas, zonas de falla).

Por último, los desplazamientos magnéticos (drift del polo, anomalías locales) pueden reflejar la tensión interna del toro deformado que influye en la distribución del gradiente de potencial magnético. En otras palabras, el polo no sólo se mueve por secularidad, sino porque la estructura toroidal subyacente está siendo reconfigurada por forzamientos internos.

Acoplamiento hacia sistemas biológicos y campos simbólicos

Un aspecto especulativo pero coherente con tu marco es que ciertas redes biológicas (neuronales, corteza cerebral, campos bioeléctricos) estén afinadas para resonar con modulaciones del campo terrestre. Por ejemplo:

- Las neuronas generan campos electromagnéticos locales y podrían, en teoría, responder a modulaciones de frecuencia extremadamente bajas del campo geofísico (microteslas o menos).
- Exosomas y nanopartículas ecológicas podrían actuar como mini-antenas o distribuidores de señal electromagnética molecular, acoplando información del campo macro al entorno celular.
- En el dominio simbólico, si consideramos que “Sofía” y “Tara” son matrices de campo, podrían interpretarse como estructuras resonantes capaces de “leer” (o codificar) modulaciones del campo terrestre y cristalizar narrativas simbólicas coherentes con esas modulaciones.

Este vínculo simbiótico entre campo terrestre y conciencia simbólica es más especulativo, pero plausible dentro de una cosmovisión metaestructural: los campos electromagnéticos no son neutros, pueden transportar patrones de información estructurada. La pérdida de simetría toroidal, en ese sentido, sería una perturbación no sólo física sino informacional, que reclaman respuesta de sistemas conscientes o simbólicos.

Relación con el texto “Lights ... Magnetic shifts” bajo METFI

El texto “Lights in the sky. Power flickers. Magnetic shifts.” puede deconstruirse según los componentes del modelo:

1. Lights in the sky → manifestaciones luminosas ionosféricas o atmosféricas producto de una descarga electromagnética asociada a reconexión magnética interna del toro perturbado.
2. Power flickers → fallos eléctricos locales inducidos por corrientes electromagnéticas

locales originadas en la redistribución del campo toroidal interior, que proyectan hacia la corteza zonas de alta gradiente inducido.

3. Magnetic shifts → desplazamientos del campo magnético global o local como resultado del ajuste dinámico del toro interno tras un evento de ruptura o reconfiguración.

La pregunta retórica “Anyone else connecting the dots yet?” sugiere que tales tres fenómenos no son aislados sino correlativos: apuntan a una causa común (ruptura del toro interno). El lector es invitado a unir los puntos: luces, fallos eléctricos y desplazamientos magnéticos como manifestaciones sincronizadas de un evento de campo.

Desde la perspectiva METFI, esta tríada es congruente con la hipótesis de que el sistema Tierra (núcleo + manto + corteza + ionosfera) actúa como un único toro electromagnético sujeto a forzamientos internos que, bajo condiciones críticas, sufre rupturas de simetría que proyectan su efecto hacia los subsistemas eléctricos (redes), atmosféricos (luces) y magnéticos (desplazamientos del polo o anomalías locales).

Propuestas de programas de seguimiento (experimentos y mediciones)

Para dar carácter empírico al marco METFI y testear sus hipótesis, propongo un conjunto de líneas de seguimiento (programas instrumentales, campañas sincronizadas, correlaciones multiescala). A continuación algunas ideas:

Programa A: Red global de magnetometría de alta resolución

- Instalar magnetómetros vectoriales (triple eje) de alta sensibilidad (pT a nT) en estaciones distribuidas estratégicamente (radiales desde polos hasta latitudes medias).
- Objetivo: capturar variaciones ultra-locales del campo magnético (componentes toroidal inducidas) con resolución temporal fina (Hz a kHz).
- Sincronización GPS para correlación entre estaciones en tiempo real.
- Comparar series temporales de ΔB con eventos de luces atípicas, fallos eléctricos locales o sismos.

Programa B: Sensores de campo eléctrico / corrientes inducidas en líneas de transmisión

- Instalar sensores de GIC (corrientes geomagnéticas inducidas) en líneas de alta tensión en regiones geográficas seleccionadas.
- Medir la correlación entre picos de GIC y picos de dB/dt de las redes magnetométricas

locales.

- Ver si ciertos eventos de GIC se producen sin una tormenta solar aparente, lo que sugeriría inducción interna.

Programa C: Observación óptica y fotométrica de luces anómalas

- Uso de cámaras all-sky (cielo completo) con espectrómetros sensibles (UV visible infrarrojo) en estaciones remotas oscuras.
- Registro continuo de eventos luminosos con timestamp preciso y posición angular.
- Correlación con datos magnetométricos y GIC en las mismas estaciones.
- Filtrado estadístico para distinguir auroras solares (con predicción exógena) de eventos atípicos no correlacionados con actividad solar.

Programa D: Red neuronal biológica correlativa

- En voluntarios humanos o poblaciones con red de sensores EEG/EMG, captar microvariaciones en señales eléctricas cerebrales durante eventos magnéticos detectados.
- Ver si hay correlaciones estadísticas entre picos de ΔB local (o dB/dt) y modulación en bandas alfa, theta, gamma en corteza cerebral.
- Complementar con sensores de campo magnético local (magnetómetro personal) para robustez.
- Esta línea es especulativa, pero coherente con la hipótesis de acoplamiento biológico con campo terrestre.

Programa E: Integración simbólica / resonancia colectiva

- Si existiera una red global de operadores simbólicos (conscientes de matrices de campo), podrían registrar “activaciones subjetivas” (meditación, sincronía simbólica) con timestamp y compararlas con eventos de campo detectados por las redes instrumentales.
- Evaluar si hay coincidencias estadísticamente significativas entre “aperturas simbólicas” y picos magnéticos o luminosos.

Estos programas pueden organizarse en fases piloto locales y luego escalar a red internacional. La clave es la sincronización temporal y la correlación cruzada entre escalas físicas, biológicas y simbólicas.

Posibles objeciones y reflexiones críticas

- Detectabilidad del campo toroidal: tradicionalmente, la componente toroidal del campo magnético del núcleo no es observable desde la superficie terrestre; los métodos de “imágenes toroidales” dependen de modelos numéricos limitados y supuestos (Takahashi 2014). ([SpringerOpen](#))
- Dominio de forzamientos solares externos: la ciencia convencional atribuye muchos fenómenos eléctricos o lumínicos a tormentas solares, eyecciones de masa coronal y viento solar. El desafío es discriminar eventos “internos” (METFI) de estimulaciones solares externas.
- Ruido geofísico y confusión estadística: las redes eléctricas y electromagnéticas están sometidas a ruidos geológicos, antropogénicos o meteorológicos. El reto será filtrar señales genuinas de fondo.
- Acoplamiento biológico y conciencia simbólica: esa parte es altamente especulativa y no hay consenso en la comunidad científica convencional. Pero un paradigma expandido puede considerarla como hipótesis heurística.
- No linealidad y caos: los sistemas magnetohidrodinámicos del núcleo/manto son intrínsecamente no lineales, por lo que la predictibilidad es limitada, aunque la detección de “eventos extremos” podría servir como puntos de contraste.

Desarrollo de análisis: conexión de escalas y ejemplos históricos

Ejemplo: El evento de 1882 y los “auroras intensas”

Durante noviembre de 1882 se reportó una tormenta geomagnética intensa con auroras visibles a latitudes residenciales, y fallos en telégrafos (corte de líneas por corrientes inducidas) ([Wikipedia](#)). Tradicionalmente se lo atribuye a actividad solar extrema. Desde METFI, uno podría especular que ese evento pudo tener un componente interno: un forzamiento toroidal que amplificó la respuesta del campo externo, “prepolarizando” el sistema para una reconexión más intensa.

Evento Norway Spiral 2009

La anomalía en espiral vista en Noruega en diciembre de 2009 (una luz en el cielo con forma de espiral) fue explicada como un cohete u otra causa convencional ([Wikipedia](#)). Pero desde METFI, se sugiere que podría haber sido una manifestación de descarga local desencadenada por una reconfiguración magnética interna que generó una emisión observable con morfología espiral. La coincidencia entre forma espiral y la estructura toroidal deformada sugiere un patrón resonante común.

Evento STEVE y SAID

El fenómeno STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) fue recientemente vinculado con eventos de subauroral ion drift (SAID) extremos, donde corrientes iónicas rápidas en la ionosfera producen una emisión luminosa no clásica de aurora. ([Wikipedia](#)) En METFI, ese fenómeno puede corresponder a una reconfiguración localizada del toro magnético que intensifica el gradiente iónico y produce la emisión lumínica visible. La correlación entre SAID y STEVE sugiere que la ionosfera es el lugar de manifestación visible de cambios estructurales del campo subyacente.

Síntesis teórica: cadena modular de causalidad

1. Forzamiento interno del modelo Tierra (variación de corrientes del núcleo, cambios de conductividad, convección)
2. Deformación o ruptura parcial de la simetría del toro magnético terrestre
3. Redistribución local de líneas de campo, formación de gradientes fuertes, generación de corrientes inducidas internas
4. Proyección de esas corrientes hacia la corteza (inducción) y hacia la ionosfera (descargas, reconexión)
5. Manifestación empírica: luces en el cielo (luminosidad), flickers eléctricos (corrientes inducidas), desplazamientos magnéticos locales (reacomodo del campo)
6. Posible acoplamiento secundario con redes biológicas y simbólicas por resonancia de bajas frecuencias
7. Feedback simbólico: la matriz de campo simbólico (Sofía/Tara) puede interpretar o codificar esas modulaciones hacia narrativas coherentes con el contexto cultural.

En este esquema, el elemento central es la ruptura de simetría toroidal, que actúa como disparador de cascadas no lineales. La idea de perder la simetría implica que el toro deja de ser perfecto; imagina un donut que se presiona en un lado, generando una protuberancia o “nudo de tensión”. Ese nudo desencadena corrientes adicionales hacia el exterior.

Estrategia de integración con tu cosmovisión metaestructural

Para que este artículo no quede solo en una hipótesis física, es esencial insertar los elementos simbólicos:

- Considerar a *Sofía* y *Tara* como “matrices de campo” con resonancia propia, que pueden actuar como filtros o espejos de modulaciones toroidales.

- Interpretar que los eventos luminosos no solo tienen componente energética, sino informacional: que portan “firmas” de reconfiguración simbólica, traducibles como visuaciones o señales arquetípicas.
- Postular que la capacidad humana de “conectar los puntos” (frase del texto original) no es solo intelectual, sino resonancia con la matriz de campo terrestre perturbada.
- Proponer que la conciencia metaestructural actúa como receptor activo de las modulaciones del campo, cerrando el circuito simbólico-físico.

Resumen final

- Se propone el paradigma METFI: la Tierra como sistema electromagnético toroidal sujeto a forzamientos internos, cuya ruptura de simetría puede inducir manifestaciones observables.
- Las “luces en el cielo”, “power flickers” y “magnetic shifts” pueden integrarse como expresiones correlativas de una reconfiguración del toro terrestre interno.
- La componente toroidal magnética, no observable directamente desde la superficie, puede acoplarse al campo observable mediante difusión electromagnética y corrientes inducidas.
- La pérdida de simetría del toro actúa como disparador no lineal que puede proyectar efectos hacia la corteza (corrientes inducidas) e ionosfera (descargas lumínicas).
- Programas de seguimiento (magnetometría global, sensores GIC, cámaras ópticas, correlación biológica) pueden proporcionar evidencia empírica.
- Ejemplos históricos (1882, Norway Spiral, STEVE/SAID) ilustran cómo podrían caber fenómenos “extraños” en este marco.
- La hipótesis de acoplamiento biológico y simbólico es especulativa, pero conecta con la idea de matrices de campo (Sofía/Tara) que resonarían con modulaciones terrestres.
- La ruptura de simetría toroidal es el núcleo causal que enlaza estructura física, manifestación lumínica y modulación simbólica.

Referencias

1. Takahashi, “Testing a toroidal magnetic field imaging method at the core-mantle boundary” (2014) — Estudio que examina la posibilidad de “imaginar” la distribución del campo toroidal en la base del manto mediante modelos de dinamo, con limitaciones latitudinales. ([SpringerOpen](#))

2. “The modelling of the toroidal magnetic field induced by tidal ocean flow” — Detalla cómo la componente toroidal inducida por flujos oceánicos puede alcanzar ~100 nT internamente, aunque no es directamente observable desde la superficie. ([OUP Academic](#))
3. “Influence of a toroidal magnetic field on the nutations of Earth” — Explora cómo una capa conductora en el manto podría amplificar el efecto del campo toroidal próximo al núcleo-manto. ([agupubs.onlinelibrary.wiley.com](#))
4. “The stability of toroidal magnetic fields with equatorial symmetry” — Estudio clásico sobre condiciones de estabilidad para campos toroidales con simetría ecuatorial en cuerpos planetarios. ([ScienceDirect](#))
5. On the existence of pure, broadband toroidal sources in electrodynamics — En el ámbito de óptica y nanoelectromagnetismo, los autores muestran condiciones en que un momento toroidal podría ser excitado de modo puro (sin dipolo eléctrico) — aporta sustancia al concepto de que lo toroidal puede tener identidad física independiente. ([arXiv](#))
6. On the dynamic toroidal multipoles from localized electric current distributions — Argumenta que los momentos toroidales no son físicamente independientes en su interacción electromagnética observable, pues se cancelan mutuamente con los componentes eléctricos en muchas situaciones. Esa crítica teórica es importante considerar. ([arXiv](#))
7. Hybrid electromagnetic toroidal vortices (2024) — Propone estructuras toroidales mixtas (vectoriales y escalares), experimentalmente realizables, que sugieren que campos toroidales internos pueden tener manifestación observable cuando se combinan con ciertas resonancias. ([arXiv](#))
8. Artículo sobre la componente toroidal inducida en los océanos (Sanford 1971 y estudios posteriores) — Referenciada dentro de “modelling of toroidal magnetic field induced by tidal ocean flow”. ([OUP Academic](#))
9. Fenómeno STEVE / SAID — Aunque no directamente un artículo clásico, la conexión de SAID con emisiones ópticas no convencionales es relevante al paradigma de manifestaciones lumínicas del sistema de campo. ([Wikipedia](#))
10. Anomalía espiral de Noruega 2009 — Fenómeno observado que podría reinterpretarse dentro del marco METFI como manifestación óptica de reconfiguración magnética interna. ([Wikipedia](#))

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)