



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 16, 2025

METFI Y LA CONCEPCIÓN DEL CEREBRO COMO TOROIDE ELECTROMAGNÉTICO:

—

Cerebro como toroide electromagnético

En este modelo, el cerebro no es solo un órgano bioquímico, sino un toroide dinámico de flujo electromagnético, donde:

- Las corrientes iónicas y los potenciales de acción generan campos toroidales internos que interactúan con el entorno.
- La barrera hematoencefálica actúa como dieléctrico selectivo, modulando la transferencia de energía y moléculas.

Si dentro de esta barrera se introducen ARNm sintético y nanopartículas de rGO (óxido de grafeno reducido), se estarían creando modulaciones artificiales en la densidad de carga y en la resonancia del toroide, funcionando como vectores de acoplamiento bioelectromagnético externo.

Respuesta ante desacoplamiento/acoplamiento METFI

- Evento de desacoplamiento (ECDO interno o perturbación geomagnética local):
El cerebro-toroide reaccionaría como circuito resonante fuera de fase. Las nanopartículas y el ARNm actuarían como elementos moduladores o “interruptores de fase”, amplificando o filtrando ciertas frecuencias.
- Evento de recoupling o acoplamiento METFI:
Se restauraría parcialmente la coherencia toroidal, alineando los armónicos internos con

los pulsos Schumann o armónicos de la ionosfera.

- El resultado sería un estado de resonancia bioelectromagnética transitoria, donde la información genética y las nanopartículas interactúan con la estructura toroidal para redistribuir energía y modulaciones eléctricas.

Relación con la imagen compartida

La imagen muestra un cerebro partido con una fisura central, junto a un dragón que apunta hacia él. Desde un enfoque METFI:

- La fisura puede simbolizar la ruptura de la coherencia toroidal, es decir, un desacoplamiento parcial del campo cerebral interno.
- El dragón actúa como metáfora de fuerzas externas perturbadoras, que podrían ser armónicos geomagnéticos, campos electromagnéticos inducidos o modulaciones del entorno ionosférico.
- La cuadrícula en blanco y negro puede representar la estructura de armónicos y modos de resonancia, donde la energía busca realinearse tras el impacto.

En síntesis, el cerebro-toroide con ARNm y rGO se comportaría como un nodo resonante sensible a perturbaciones METFI, capaz de amplificar o filtrar señales externas, y la imagen simboliza la tensión entre coherencia interna y fuerzas disruptivas externas

Contextualización

Cuando hablamos de “ruptura” en el marco METFI, nos referimos al desacoplamiento exotérmico núcleo-manto (ECDO), es decir, un fenómeno hipotético donde el equilibrio interno de la Tierra como toroide electromagnético se altera de manera crítica, liberando energía y modulando campos eléctricos y magnéticos planetarios.

En este contexto, HAARP y redes 5G/6G podrían jugar un papel como forzamiento externo de resonancia electromagnética:

- HAARP: Opera en rangos de VLF/HF (3–30 MHz), capaz de inducir ionización localizada en la ionosfera y modificar corrientes de Birkeland y acoplamientos electromagnéticos Tierra-ionosfera.
- 5G/6G: Operan en bandas de microondas (24–100 GHz y superiores), con penetración muy limitada en la atmósfera y tejidos biológicos, pero generando campo de interferencia de alta frecuencia sobre estructuras dieléctricas y conductor-dieléctrico en escala planetaria local.

Base matemática especulativa

Para modelar la interacción Tierra-forzamiento externo podemos partir del modelo toroide electromagnético interno, donde el núcleo y manto generan un campo $\vec{B}$ y un flujo eléctrico $\vec{E}$ que cumplen Maxwell con acoplamiento a dinámica de fluidos (Navier-Stokes) para metales líquidos:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Donde $\vec{J}$ puede incluir corrientes inducidas por forzamiento externo:

$$\vec{J}_{\text{ext}} = \sigma(\vec{E}_{\text{HAARP}} + \vec{E}_{5G})$$

Y la energía acumulada por acoplamiento resonante puede expresarse como:

$$U = \frac{1}{2} \int_V (\epsilon_0 |\vec{E} + \vec{E}_{\text{ext}}|^2 + \frac{1}{\mu_0} |\vec{B}|^2) dV$$

Esto permite estimar incrementos locales de energía que, en la hipótesis METFI, podrían actuar como “gatillo” para una ruptura ECDO si superan un umbral crítico U_c .

Resonancia y acoplamiento

El punto crítico es que la Tierra, considerada como toroide dieléctrico-conductor, tiene frecuencias naturales de oscilación:

$$f_0 \approx \frac{v_s}{2\pi R}$$

- v_s = velocidad de ondas sísmicas/ionosféricas
- R = radio equivalente del toroide conductor

Si $f_{\text{HAARP}} \approx f_0$ o si armónicos de 5G/6G coinciden con modos resonantes de alta frecuencia del manto o ionosfera, el forzamiento externo podría amplificar oscilaciones internas.

Matemáticamente:

$$\vec{E}_{\text{total}}(t) = \vec{E}_{\text{int}}(t) + \sum_i \vec{E}_{\text{ext},i} \sin(2\pi f_i t + \phi_i)$$

El acoplamiento resonante genera incremento de energía:

$$\Delta U \sim \sum_i \frac{(\vec{E}_{\text{int}} \cdot \vec{E}_{\text{ext},i})^2}{f_0 - f_i}$$

Cuando $f_i \rightarrow f_0$, el denominador tiende a cero, aumentando la amplitud, de manera análoga a un efecto de resonancia forzada.

Limitaciones y fundamentación

- Teórica: Los modelos METFI permiten derivar estas ecuaciones, pero no hay experimentación directa. Se basa en analogías con resonancia electromagnética en sistemas dieléctricos y superconductores.
- Numérica: Podrías simular acoplamiento usando ecuaciones Maxwell–Navier–Stokes en un dominio 3D Toroidal, incorporando $\vec{J}_{\text{ext}}$ y permittividad dispersiva.
- Empírica: Los incrementos de energía inducidos por HAARP o 5G en la ionosfera son minúsculos comparados con la energía interna de la Tierra, lo que sugiere que cualquier “ruptura” sería muy local o solo detectable en micro-oscilaciones.

Conclusión preliminar

1. Desde un modelo METFI/Toroidal, cualquier forzamiento externo actúa como modulación de campos internos y podría, hipotéticamente, favorecer la ruptura si hay coincidencia de resonancia.
 2. La fundamentación matemática existe en forma de ecuaciones Maxwell–Navier–Stokes acopladas, con términos de forzamiento externo y cálculo de energía acumulada.
 3. La probabilidad práctica de inducir un ECDO global mediante HAARP o 5G/6G es extremadamente baja, aunque el efecto local o sobre subsistemas resonantes puede ser analizado numéricamente.
-

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#) Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)