



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 15, 2025

VIBRACIÓN INDUCIDA DE SUPERCONDUCTIVIDAD EN LA FRONTERA CONDUCTOR/AISLANTE, MANIPULACIÓN DE CONDICIONES DE CONTORNO QUE ALTERAN LA ENERGÍA DEL PUNTO CERO (ZPE), Y POLARIZACIÓN DEL VACÍO QUE REDUCE LA INERCIA, DENTRO DE LA HIPÓTESIS METFI

Abstract

Presento un encuadre conceptual que integra las ideas propuestas —vibración inducida de superconductividad en la frontera conductor/aislante, manipulación de condiciones de contorno que alteran la energía del punto cero (ZPE), y polarización del vacío que reduce la inercia— dentro de la hipótesis METFI (Sistema Tierra como Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno). El objetivo es mapear esos mecanismos microfísicos hipotéticos sobre la arquitectura toroidal-METFI, mostrar cómo podrían actuar como canales de acoplamiento entre escalas (núcleo↔manto↔crusta↔atmósfera), describir consecuencias observables en geofísica y electromagnetismo global, y señalar limitaciones y pruebas empíricas que harían falsable esta lectura. Todo lo siguiente se enmarca como especulación física fundamentada en principios generales (condiciones de contorno, modos cuánticos, acoplamiento por excitación periódica) y no como una receta de ingeniería.

Planteamiento general: cómo casar METFI con mecanismos cuántico-condensados

METFI concibe al Sistema Tierra como un toroide electromagnético autoorganizado, con fuentes internas (corrientes del núcleo y gradientes de conductividad) que mantienen modos resonantes globales. Si aceptamos que las propiedades macroscópicas del medio (conductividad,

permitividad, rigidez dieléctrica) determinan las condiciones de contorno para los modos electromagnéticos y cuánticos, entonces pequeñas variaciones en esas condiciones —ya sean mecánicas (vibración), eléctricas (polarización local), o topológicas (fronteras conductor/aislante cambiantes)— pueden reconfigurar la densidad modal del vacío y las propiedades emergentes (p. ej. resistencia efectiva, acoplamientos colectivos).

En términos conceptuales:

- Las fronteras conductor/aislante actúan como regiones donde los modos electrónicos y fonónicos están fuertemente mezclados.
- La excitación periódica (vibración) puede conducir a estados coherentes y a una reordenación del espectro de excitaciones (efecto Floquet a escala macro/micro).
- Cambios en la densidad de modos electromagnéticos ($\Delta\rho(\omega)$) implican cambios en la energía del vacío local: $\Delta E_{\text{vac}} \approx \frac{1}{2}\hbar \sum \Delta\omega$ — la clásica heurística Casimir/energía de punto cero aplicada a topologías terrestres.
- La polarización del vacío, entendida como reorientación coherente de dipolos virtuales a escala mesoscópica, puede reducir la respuesta inercial efectiva de una masa acoplada al campo.

Mecanismo 1 — Vibración inducida de superconductividad en fronteras conductor/aislante

Idea central: una frontera conductor/aislante sometida a excitación mecánica coherente puede entrar en un régimen donde los estados electrónicos se “dressing” por fonones coherentes y campos periódicos, favoreciendo emparejamientos y transportes de baja resistencia.

Cómo se incorpora a METFI:

- En el interior terrestre hay interfaces (p. ej. capas parcialmente fundidas, zonas de transición manto-núcleo, o discontinuidades salgadas/rocosas) que funcionan como fronteras efectivas conductor/aislante.
- Resonancias toroidales internas generan campos eléctricos y fuerzas mecánicas periódicas que pueden actuar como “driving” coherente sobre esas fronteras.
- Bajo excitación adecuada, la interacción electrón-fonón y la modulación paramétrica del potencial de borde podrían estabilizar estados de baja resistividad locales (análogos a superconductividad “inducida por vibración” o fases Floquet con transporte sin dispersión).

Consecuencias METFI:

- Formación temporaria de vías de baja resistencia que realinean corrientes internas — modificando la topología del toroide electromagnético.

- Cambios súbitos en la distribución de corrientes podrían afectar la geometría del campo global (p. ej. reconfiguración de nodos/antinodo toroidales).

Limitación: el término “superconductividad” aquí es usado en sentido funcional (transporte de muy baja resistencia) más que como declaración de superconductividad cuántica macroscópica convencional; la viabilidad depende de acoplamientos locales, temperatura efectiva y coherencia.

Mecanismo 2 – Condiciones de contorno y modificación de la energía del punto cero

Idea central: las condiciones de contorno (geometría, permitividad, conductividad) fijan el espectro de modos electromagnéticos; su alteración cambia la energía de punto cero local (efecto Casimir extendido).

Aplicación en METFI:

- Cambios en gradientes de conductividad (p. ej. presencia de líquidos conductores, bolsas de magma parcialmente fundido, salmueras profundas) redefinen la “cavidad” toroidal y por tanto la densidad modal.
- La variación temporal de estas condiciones (por vibración, migración de fluidos, o descargas) genera ΔE_{vac} distribuida espacialmente que puede traducirse en fuerzas efectivas sobre la materia: $F_{\text{eff}} \approx -\nabla \Delta E_{\text{vac}}$.
- En lenguaje operativo, la Tierra no es solo una estructura que soporta campos; las propias condiciones de contorno actúan como controladores del paisaje ZPE, y así se cierra un bucle causal entre materia, campo y vacío.

Consecuencia observable:

- Fenómenos de liberación o absorción energética “no explicada” por termodinámica clásica local, asociada a cambios rápidos en las fronteras eléctricas/geométricas.

Caveat: cuantificar ΔE_{vac} en escala geológica requiere modelos de regularización; la magnitud práctica puede ser pequeña salvo en situaciones de resonancia extrema o geometrías confinantes.

Mecanismo 3 – Polarización del vacío y reducción efectiva de inercia

Idea central: si el vacío local puede polarizarse (reorientación coherente de modos virtuales/dipolos), entonces la relación entre fuerza aplicada y aceleración (inercia efectiva) puede ser modificada localmente.

Cómo encaja con METFI:

- Campos toroidales intensos y coherentes pueden inducir una respuesta colectiva del vacío en regiones específicas (por ejemplo, en el seno de corrientes intensas en el límite núcleo-manto).
- La polarización resultante actúa como un sustrato que “ayuda” el movimiento de cargas y masas acopladas, reduciendo la resistencia dinámica al cambio de estado de movimiento.
- Matemáticamente, si la masa m acoplada desarrolla un término extra en su Lagrangiano debido a la interacción con el campo polarizado, la masa efectiva m^* puede disminuir: $m^* = m + \delta m(F_{\text{campo}})$ con $\delta m < 0$ en régimen de polarización favorecedora.

Implicación METFI:

- Segmentos de la corteza o masas fluidas que experimenten una reducción efectiva de inercia podrían responder de forma anómala a excitaciones sísmicas o a fuerzas electromagnéticas, amplificando reconfiguraciones del toroide.

Importante: la “reducción de inercia” no implica violación de conservación de momento global si se considera el intercambio con el campo/vacío → se trata de redistribución de energía/impulso entre materia y modos del vacío.

Desde mecanismos individuales a la noción de “puente” para propulsión tipo warp/wormhole (marco conceptual)

Los tres mecanismos, integrados, crean un esquema donde:

1. La excitación coherente (vibración/resonancia toroidal) modifica fronteras y densidad modal.
2. Eso altera la energía del vacío local (ΔE_{vac}) y la polarización del mismo.
3. Como respuesta, cambian la conductividad, la inercia efectiva y la topología de flujo de energía.

En términos muy generales y especulativos, estas modificaciones crean regiones donde las propiedades del espacio-medio (energía local, respuesta inercial, índices de fase para modos electromagnéticos) difieren de la norma, lo que conceptualmente se parece a los requisitos teóricos para manipular geodésicas o crear canales de acoplamiento de alta transmisividad (análogo heurístico a “warp”/“wormhole”). Pero es crucial subrayar: esto es un puente conceptual —no un plan técnico ni una demostración matemática de traslado macroscópico de materia por atajos topológicos del espacio-tiempo.

Predicciones falsables y señales buscables (enfoque empírico)

Propuestas de seguimiento observacional que podrían apoyar o refutar la integración METFI↔mecanismos cuánticos:

- Correlación temporal entre picos resonantes electromagnéticos globales (banda ultra-baja frecuencia) y abruptas disminuciones locales de resistividad medibles por magnetotelúrica.
- Anomalías transitorias en parámetros sísmicos (velocidad de onda P/S) coherentes espacialmente con cambios electromagnéticos que sugieran acoplamiento campo↔mecánica.
- Señales de liberación/absorción de energía que no se correspondan con procesos térmicos convencionales, pero que acompañen reconfiguraciones de frontera (p. ej. migración de fluidos conductores).
- Observación de transporte electrónico anómalo en muestras in situ o artificiales sometidas a excitación vibratoria coherente en condiciones de frontera conductor/aislante.

Limitaciones, riesgos epistemológicos y ética de la especulación

- Muchos de los saltos son heurísticos: trasladar fenómenos de laboratorio (Floquet superconductivity, efectos Casimir) a la escala planetaria exige cautela cuantitativa.
- La magnitud de efectos ZPE y polarización del vacío a escala geológica puede ser insignificante salvo en condiciones extremas de confinamiento/resonancia.
- Evitar interpretaciones teleológicas o de ingeniería planetaria: la hipótesis debe permanecer falsable y sujeta a medición rigurosa.
- Difundir ideas sobre “propulsión” o “manipulación del vacío” requiere responsabilidad para no inducir intentos prácticos peligrosos o mal dirigidos.

Resumen

- METFI proporciona un marco topológico/arquitectural (toroide electromagnético) donde fronteras y resonancias internas fijan condiciones de contorno para modos electromagnéticos y cuánticos.
- Vibración coherente en fronteras conductor/aislante podría, en principio, favorecer estados de transporte de baja resistencia (análogo a superconductividad inducida por vibración), reconfigurando corrientes internas.
- Variaciones en condiciones de contorno modifican la densidad modal y la energía de punto cero local (ΔE_{vac}), generando fuerzas efectivas que interactúan con la materia.
- La polarización coherente del vacío puede traducirse en cambios de masa efectiva (m^*), es decir, en una reducción aparente de inercia para regiones acopladas al campo.
- Integrados, estos mecanismos ofrecen una narrativa física que heurísticamente aproxima los requisitos conceptuales de manipulación del medio (análoga a ideas de “warp/wormhole”), pero permanecen altamente especulativos y demandan pruebas empíricas

rigurosas.

- Propuestas de seguimiento: correlaciones EM–sismológicas, mediciones de resistividad transitoria y experimentos controlados sobre fronteras sometidas a excitación coherente.

Lagrangiano efectivo (esquema)

Definimos un Lagrangiano efectivo que contiene los campos electromagnético, material y un campo colectivo que representa la «polarización del vacío» o modos del vacío acoplables:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{EM}} + \mathcal{L}_{\text{mat}} + \mathcal{L}_{\text{vac}} + \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{drive}}.$$

Componentes principales (notación: $c = 1$ salvo indicación):

1. Campo electromagnético:

$$\mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \quad \text{con } F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

2. Materia (electrones libres/condensado, masa m , campo fermiónico ψ):

$$\mathcal{L}_{\text{mat}} = \bar{\psi} (i \gamma^\mu D_\mu - m) \psi - V_{\text{int}}(\psi),$$

donde $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ y V_{int} incluye interacciones electrón-fonón y posibles pares.

3. Campo colectivo del vacío (modo escalar heurístico ϕ que representa la polarización colectiva del vacío o densidad modal):

$$\mathcal{L}_{\text{vac}} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi) (\partial^\mu \phi) - \frac{1}{2} \Omega_\phi^2 \phi^2 - U(\phi).$$

$U(\phi)$ puede contener términos no lineales que permiten saturación.

4. Acoplamientos (interacción materia–vacío, materia–EM y retroacción):

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -g \phi \bar{\psi} \psi - \frac{\alpha}{2} \phi F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - J^\mu A_\mu,$$

con g acoplamiento scalar-fermión y α acoplamiento campo-polarización (retroacción).

5. Conducción/Efectos de contorno y conducción efectiva se modelan mediante parámetros dependientes del espacio y tiempo (permitividad $\varepsilon(\mathbf{x}, t)$, conductividad $\sigma(\mathbf{x}, t)$) y un término de excitación externa:

$$\mathcal{L}_{\text{drive}} = - \int d^3x \mathbf{E} \cdot \mathbf{P}_{\text{ext}}(\mathbf{x}, t),$$

donde $\mathbf{P}_{\text{ext}}$ modela la excitación coherente (vibración/resonancia toroidal) o, en un enfoque simplificado, se incorpora como modulación paramétrica de $\varepsilon(\mathbf{x}, t)$ y/o de $\Omega_\phi(\mathbf{x}, t)$.

Modulación de condiciones de contorno – Floquet / parametric

drive

Modelamos la modulación periódica de fronteras (por ejemplo, variación de permitividad/conductividad) como:

$$\varepsilon(x, t) = \varepsilon_0(x) + \varepsilon_1(x)\cos(\Omega t),$$

o equivalente para $\sigma(x, t)$ o Ω_ϕ .

Bajo conducción periódica, el Hamiltoniano efectivo para excitaciones (electrónicas/ópticas) puede analizarse con teoría de Floquet. El Hamiltoniano de una banda $H(t) = H_0 + V \cos(\Omega t)$ conduce, en la aproximación de alta frecuencia o usando la expansión de Magnus, a un Hamiltoniano efectivo:

$$H_{\text{eff}} \approx H_0 + \frac{[V, -V]}{2\hbar\Omega} + \mathcal{O}(\Omega^{-2}).$$

Para acoplamientos más complejos, términos de segundo orden generan renormalizaciones efectivas de parámetros (masa, acoplamientos) y pueden inducir gaps (estados tipo Floquet superconducting/pairing).

Energía del vacío y su variación por contornos (Casimir-like)

La energía de punto cero para modos discretizados por condiciones de contorno viene dada formalmente por la suma de modos:

$$E_{\text{vac}} = \frac{\hbar}{2} \sum_n \omega_n,$$

que debe regularizarse (p. ej. mediante la función zeta). Un procedimiento común:

$$E_{\text{vac}}(s) = \frac{\hbar}{2} \mu^s \sum_n \omega_n^{1-s}, \quad E_{\text{vac}} = \lim_{s \rightarrow 0} E_{\text{vac}}(s).$$

La diferencia entre dos configuraciones de contorno (1 y 2) es finita:

$$\Delta E_{\text{vac}} = E_{\text{vac}}^{(2)} - E_{\text{vac}}^{(1)}.$$

En un medio con permitividad espacial $\varepsilon(x)$ y geometría toroidal, los modos $\omega_n[\varepsilon, \text{BC}]$ dependen fuertemente de la estructura; por tanto la migración de fluidos conductores o la vibración que cambia $\varepsilon(x, t)$ produce $\Delta E_{\text{vac}}(x, t)$.

La fuerza efectiva sobre la materia asociada a esa variación se obtiene como:

$$\mathbf{F}_{\text{vac}}(x, t) = -\nabla_x \Delta E_{\text{vac}}(x, t).$$

Esta expresión es la que convierte una modificación modal en una fuerza macroscópica que puede influir en dinámica geofísica.

Masa efectiva (inercia modificada) por acoplamiento al campo

polarizado

Partimos del término de interacción $-g\phi\bar{\psi}\psi$. La corrección al propagador fermiónico (self-energy $\Sigma(p)$) por intercambio de ϕ conduce a una corrección de masa en el límite de baja energía:

$$m^* = m + \delta m, \quad \delta m \simeq \frac{g^2}{m_\phi^2} \langle \phi^2 \rangle_{\text{eff}},$$

en una estimación tipo mean-field donde m_ϕ es la masa efectiva (o frecuencia) del modo ϕ y $\langle \phi^2 \rangle_{\text{eff}}$ su varianza estacionaria bajo drive. Si $\langle \phi \rangle$ adquiere signo que reduzca la inercia ($\delta m < 0$) entonces la masa efectiva disminuye.

Una forma alternativa, partiendo de la acción efectiva $S_{\text{eff}}[\psi]$ tras integrar ϕ , produce un término no local en tiempo que modifica la relación fuerza→aceleración. En la aproximación local:

$$\mathcal{L}_{\text{eff}}^{\text{kin}} \approx \frac{1}{2} m^*(t) \dot{\mathbf{x}}^2, \quad m^*(t) = m(1 + \eta(t)),$$

con $\eta(t)$ derivable de correladores de ϕ y proporcional a g^2 .

Conservación global: la transferencia de momento/energía se paga con el campo ϕ y con modos EM —no hay violación de conservación si se tiene en cuenta el conjunto.

Condición heurística para ‘superconductividad inducida por vibración’ en fronteras

Tomando una descripción BCS-like con acoplamiento efectivo λ_{eff} , el gap Δ en equilibrio satisface (a primer orden, temperatura $T \ll T_c$):

$$1 = \lambda_{\text{eff}} \int_0^{\omega_D} \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon^2 + \Delta^2}} \approx \lambda_{\text{eff}} \ln \left(\frac{2\omega_D}{\Delta} \right),$$

donde ω_D es un cutoff (análogo a Debye). La modulación periódica puede renormalizar λ_{eff} . Un término de drive con frecuencia Ω y amplitud A produce (en aproximación perturbativa y tiempo-promediada):

$$\lambda_{\text{eff}} \approx \lambda_0 + \frac{\beta A^2}{\hbar\Omega - 2\epsilon_F + i\gamma},$$

donde β encapsula la eficiencia del acoplamiento drive→pares, ϵ_F energía de Fermi local, y γ amortiguamiento. El denominador muestra la condición de resonancia paramétrica: cuando $\hbar\Omega \approx 2\epsilon_F$ o cuando aparecen sub-armónicos, la contribución puede ser grande y potenciar apareamiento.

Interpretación práctica: en zonas fronterizas conductor/aislante, si existe un drive toroidal con frecuencia y coherencia adecuadas, λ_{eff} puede aumentar y llevar a transporte de muy baja resistencia durante ventanas temporales.

Flujo causal y ecuaciones acopladas (esquema dinámico)

Podemos escribir un sistema acoplado reducido que capture la dinámica cualitativa:

1. Maxwell con polarización ϕ :

$$\nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{J} + \alpha \nabla(\phi) \times \mathbf{B} + \dots$$

2. Ecuación para ϕ (driven, disipativa):

$$\ddot{\phi} + \gamma_\phi \dot{\phi} + \Omega_\phi^2 \phi - c_\phi^2 \nabla^2 \phi = g \bar{\psi} \psi + S_{\text{drive}}(x, t),$$

donde S_{drive} modela vibración/resonancia toroidal y depende de la geometría y la amplitud.

3. Ecuación de movimiento efectiva para un volumen de materia (masa M) sujeto a fuerzas convencionales F_{conv} y a la fuerza por vacío:

$$M \ddot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}_{\text{conv}} + \mathbf{F}_{\text{vac}}(\nabla \Delta E_{\text{vac}}) + \mathbf{F}_{\text{EM}} + \dots$$

Estas ecuaciones implican retroacción: ϕ modifica EM $\rightarrow$ EM modifica corrientes $J \rightarrow J$ retroalimenta ϕ y ΔE_{vac} .

Criterios de escala y condiciones para efectos relevantes

Para que los términos mencionados sean no-negligibles a escala macroscópica (geofísica), se requiere una (al menos) de las siguientes condiciones:

1. Resonancia fuerte: la frecuencia del drive Ω coincide con modos locales (electrónicos, fonónicos o modos colectivos Ω_ϕ), de modo que la respuesta $\langle \phi^2 \rangle$ se amplifique (factor Q alto).
2. Confinamiento geométrico: existencia de cavidades efectivas (regiones con contraste alto de ε y geometría compacta) que aumenten la densidad modal y, por ende, ΔE_{vac} .
3. Acoplamientos no despreciables: parámetros g, α, β suficientemente grandes en las regiones consideradas (p. ej. zonas con alta densidad de portadores libres y acoplamiento electrónico-fonón pronunciado).
4. Baja disipación local: amortiguamiento γ_ϕ pequeño relativo a la ganancia por drive, para permitir acumulación de energía coherente.

Expresiones útiles para seguimiento cuantitativo (resumen operativo)

1. Diferencia de energía del vacío:

$$\Delta E_{\text{vac}} = \frac{\hbar}{2} \sum_n \left(\omega_n^{(2)} - \omega_n^{(1)} \right) \xrightarrow{\text{zeta reg.}} \text{valor finito computable}$$

2. Fuerza efectiva:

$$\mathbf{F}_{\text{vac}} = -\nabla \Delta E_{\text{vac}}.$$

3. Corrección de masa (orden de magnitud heurístico):

$$\delta m \sim \frac{g^2}{\Omega_\phi} \langle \phi^2 \rangle \implies m^* = m + \delta m.$$

4. Renormalización de acoplamiento de apareamiento por drive (heurística):

$$\lambda_{\text{eff}} \approx \lambda_0 + \frac{\beta A^2}{\hbar \Omega - 2\epsilon_F + i\gamma}.$$

5. Hamiltoniano efectivo de Floquet (orden $1/\Omega$):

$$H_{\text{eff}} \approx H_0 + \frac{1}{\hbar \Omega} [V_{-1}, V_{+1}] + \mathcal{O}(\Omega^{-2}),$$

donde $V_{\pm 1}$ son componentes Fourier del drive.

¿Qué calcular a continuación para hacer esto cuantitativo?

Para pasar de esquema a estimaciones numéricas se necesitan (por cada región objetivo):

- Geometría efectiva y perfiles $\epsilon(x), \sigma(x)$ (máscara toroidal local).
- Frecuencias de los modos relevantes (Ω_ϕ, ω_n) y factores Q .
- Parámetros de acoplamiento microscópicos $g, \alpha, \lambda_0, \beta$ (o sus análogos efectivos para el medio geológico).
- Amplitud y coherencia del drive A, Ω (características del modo toroidal que excita la frontera).
- Amortiguamientos γ_ϕ , pérdidas dieléctricas y conductivas locales.

Con esos datos puede estimarse ΔE_{vac} (por ejemplo numéricamente resolviendo espectros modales en la geometría dada y aplicando regularización zeta), $\langle \phi^2 \rangle$ (resolviendo la ecuación estocástica/forzada para ϕ), y finalmente δm y $\mathbf{F}_{\text{vac}}$.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)