

A
Immune state by anatomical location
Tumors (%)
100
80
60
40
20
0
21
57
62
35
36
28
2
8
4
15
33
25
Midline (n = 140)
Hemispheric (n = 99)
Posterior fossa (n = 14)
Multiple or ambiguous (n = 73)
χ²=17.59, df=6, Monte Carlo P=0.006
Cramér's V=0.16; n = 326
B
Immune state by molecular group
Tumors (%)
24
80
71
17
10
4
35
50
42
1
4
5
DMG H3 K27-alt (n = 175)
DHG H3 G34-mut (n = 31)
pHGG H3/IDH-wt (n = 127)
IHG (n = 10)
χ²=30.61, df=6, Monte Carlo P=1.0 × 10⁻⁴
Cramér's V=0.21; n = 343
C
Location within H3/IDH-wildtype pHGG
Tumors (%)
5
7
10
21
23
20
Midline (n = 22)
Hemispheric (n = 64)
χ²=1.58, df=2, Monte Carlo P=0.506
Cramér's V=0.14; n = 86
D
Sequential PERMANOVA
34-feature TPM matrix; n = 253
PERMANOVA partial R²
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
6.1%
P=2.0 × 10⁻⁴
1.0%
P=0.172
3.4%
P=4.0 × 10⁻⁴
3.7%
P=4.0 × 10⁻⁴
Molecular first
Location | molecular
Location first
Molecular | location
Immune state
Immune-high
Immune-intermediate
Immune-low