

A
Immune state by anatomical location
Tumors (%)
100
80
60
40
20
0
21
57
62
35
36
28
2
8
4
15
33
25
Midline (n=140)
Hemispheric (n=99)
Posterior fossa (n=14)
Multiple or ambiguous (n = 73)
χ2=17.59, df=6, P_MC=0.006
Cramér's V=0.16; n=326
B
Immune state by molecular group
Tumors (%)
24
80
71
17
10
4
35
50
42
1
4
5
DMG H3 K27-alt. (n=175)
DHG H3 G34-mut. (n=31)
pHGG H3/IDH-wt (n=127)
IHG (n=10)
χ2=30.61, df=6, P_MC=1.0 × 10−4
Cramér's V=0.21; n=343
C
Location within H3/IDH-wildtype pHGG
Tumors (%)
5
7
10
21
23
20
Midline (n=22)
Hemispheric (n=64)
χ2=1.58, df=2, P_MC=0.506
Cramér's V=0.14; n=86
D
Sequential PERMANOVA
34-feature TPM matrix; n = 253
PERMANOVA partial R2
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
6.1%
P=2.0 × 10−4
1.0%
P=0.172
3.4%
P=4.0 × 10−4
3.7%
P=4.0 × 10−4
Molecular first
Location | molecular
Location first
Molecular | location
Immune state
Immune-high
Immune-intermediate
Immune-low