

MORTALITÉ DES ENFANTS

Tableau 8.1 Quotients de mortalité des enfants de moins de cinq ans

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de cinq ans ayant précédé l'enquête, Données modèles DHS6

| Nombre d'années avant l'enquête | Mortalité néonatale (NN) | Mortalité postnéonatale (PNN) ¹ | Mortalité infantile (1q0) | Mortalité juvénile (4q1) | Mortalité infanto-juvénile (5q0) |
|---------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 0-4 | 38 | 51 | 89 | 68 | 150 |
| 5-9 | 46 | 81 | 127 | 75 | 192 |
| 10-14 | 44 | 101 | 145 | 85 | 218 |

¹ Calculé par différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale

Tableau 8.2 Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques socio-économiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des dix années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques socio-économiques, Données modèles DHS6

| Caractéristique socio-économique | Mortalité néonatale (NN) | Mortalité postnéonatale (PNN) ¹ | Mortalité infantile (1q0) | Mortalité juvénile (4q1) | Mortalité infanto-juvénile (5q0) |
|---|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Résidence | | | | | |
| Urbain | 50 | 66 | 116 | 63 | 171 |
| Rural | 38 | 66 | 104 | 75 | 171 |
| Région | | | | | |
| Région 1 | 31 | 61 | 92 | 72 | 157 |
| Région 2 | 46 | 69 | 116 | 69 | 176 |
| Région 3 | 66 | 54 | 120 | 56 | 169 |
| Région 4 | 36 | 79 | 116 | 84 | 190 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | | |
| Aucun | 41 | 69 | 110 | 74 | 176 |
| Primaire | 40 | 50 | 91 | 72 | 156 |
| Secondaire ou plus | 48 | 63 | 110 | 52 | 157 |
| Quintile de bien-être économique | | | | | |
| Le plus bas | 43 | 73 | 116 | 71 | 179 |
| Second | 39 | 73 | 112 | 84 | 187 |
| Moyen | 29 | 72 | 102 | 77 | 171 |
| Quatrième | 47 | 55 | 102 | 63 | 159 |
| Le plus élevé | 56 | 48 | 105 | 52 | 151 |

¹ Calculé par différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale

Tableau 8.3 Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques démographiques

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile pour la période des dix années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques démographiques, Données modèles DHS6

| Caractéristique socio-économique | Mortalité néonatale (NN) | Mortalité postnéonatale (PNN) ¹ | Mortalité infantile (1q0) | Mortalité juvénile (4q1) | Mortalité infanto-juvénile (5q0) |
|---|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Sexe de l'enfant | | | | | |
| Masculin | 47 | 67 | 114 | 74 | 180 |
| Féminin | 37 | 64 | 101 | 68 | 162 |
| Âge de la mère à la naissance | | | | | |
| <20 | 55 | 79 | 134 | 74 | 198 |
| 20-29 | 37 | 62 | 100 | 70 | 163 |
| 30-39 | 40 | 63 | 103 | 72 | 167 |
| 40-49 | (47) | (59) | (106) | * | * |
| Rang de naissance | | | | | |
| 1 | 53 | 66 | 119 | 59 | 172 |
| 2-3 | 35 | 65 | 100 | 64 | 158 |
| 4-6 | 33 | 61 | 94 | 77 | 164 |
| 7+ | 66 | 83 | 149 | 104 | 238 |
| Intervalle intergénésiq ue précédent² | | | | | |
| <2 ans | 65 | 91 | 156 | 107 | 246 |
| 2 ans | 41 | 78 | 119 | 82 | 191 |
| 3 ans | 35 | 51 | 86 | 47 | 128 |
| 4+ ans | 15 | 36 | 51 | 53 | 101 |
| Taille à la naissance³ | | | | | |
| Petit/très petit | 65 | 79 | 144 | na | na |
| Moyen ou gros | 26 | 41 | 67 | na | na |

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

¹ Calculé par différence entre les quotients de mortalité infantile et néonatale

² Non compris les naissances de rang 1

³ Quotients pour la période des cinq années avant l'enquête

Tableau 8.4 Mortalité périnatale

Effectif de mort-nés, de décès néonataux précoces et taux de mortalité périnatale pour la période des cinq années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

| Caractéristique socio-économique | Effectif de mort-nés ¹ | Effectif de décès néonataux précoces ² | Taux de mortalité périnatale ³ | Effectif de grossesses de 7 mois ou plus |
|--|-----------------------------------|---|---|--|
| Âge de la mère à la naissance de l'enfant | | | | |
| <20 | 6 | 40 | 41 | 1 110 |
| 20-29 | 14 | 73 | 29 | 2 950 |
| 30-39 | 9 | 57 | 42 | 1 583 |
| 40-49 | 5 | 6 | 42 | 264 |
| Intervalle intergénésiq | | | | |
| précédent en mois⁴ | | | | |
| Première grossesse | 9 | 60 | 54 | 1 266 |
| <15 | 5 | 22 | 42 | 635 |
| 15-26 | 10 | 49 | 43 | 1 364 |
| 27-38 | 6 | 18 | 23 | 1 040 |
| 39+ | 4 | 28 | 20 | 1 601 |
| Résidence | | | | |
| Urbain | 9 | 74 | 42 | 1 971 |
| Rural | 25 | 103 | 32 | 3 935 |
| Région | | | | |
| Région 1 | 16 | 38 | 25 | 2 178 |
| Région 2 | 5 | 40 | 35 | 1 315 |
| Région 3 | 1 | 55 | 51 | 1 101 |
| Région 4 | 11 | 43 | 41 | 1 313 |
| Niveau d'instruction de la mère | | | | |
| Aucun | 23 | 97 | 30 | 3 957 |
| Primaire | 7 | 30 | 44 | 848 |
| Secondaire ou plus | 4 | 49 | 48 | 1 102 |
| Quintile de bien-être économique | | | | |
| Le plus bas | 10 | 45 | 40 | 1 379 |
| Second | 8 | 31 | 30 | 1 297 |
| Moyen | 5 | 26 | 25 | 1 200 |
| Quatrième | 7 | 25 | 28 | 1 126 |
| Le plus élevé | 3 | 50 | 59 | 903 |
| Ensemble | 34 | 177 | 36 | 5 906 |

¹ Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.

² Les décès néonataux précoces sont des décès qui se sont produits à l'âge de 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.

³ Équivaut à la somme du nombre de mort-nés et de décès néonataux précoces divisée par le nombre de grossesses de 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000.

⁴ Les catégories correspondent à des intervalles intergénésiq de <24 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 48 mois ou plus.

Tableau 8.5 Comportement procréateur à hauts risques

Répartition (en %) des enfants nés dans les cinq années ayant précédé l'enquête par catégorie de haut risque de mortalité, ratio de risque et répartition (en %) des femmes actuellement en union par catégorie de risque si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, Données modèles DHS6

| Catégorie de risques | Naissances des 5 années avant l'enquête | | Pourcentage de femmes actuellement en union ¹ |
|---|---|------------------|--|
| | Pourcentage de naissances | Ratio de risques | |
| Dans aucune catégorie à haut risque | 27,2 | 1,00 | 16,6 ^a |
| Catégorie à risque inévitable | | | |
| Naissance de rang 1, âge entre 18 et 34 ans | 14,6 | 1,38 | 4,7 |
| Catégorie à haut risque unique | | | |
| Âge de la mère <18 ans | 8,4 | 1,64 | 0,7 |
| Âge de la mère >34 ans | 1,2 | 1,27 | 4,7 |
| Intervalle intergénésiq <24 mois | 5,3 | 1,35 | 8,4 |
| Rang de naissance >3 | 24,6 | 1,16 | 17,3 |
| Sous total | 39,5 | 1,29 | 31,2 |
| Catégorie à hauts risques multiples | | | |
| Âge <18 et intervalle intergénésiq <24 mois ² | 0,6 | (2,09) | 0,3 |
| Âge >34 et intervalle intergénésiq <24 mois | 0,2 | * | 0,1 |
| Âge >34 et rang de naissance >3 | 11,3 | 0,92 | 30,7 |
| Âge >34 et intervalle intergénésiq <24 mois et rang de naissance >3 | 1,6 | 1,46 | 5,0 |
| Intervalle intergénésiq <24 mois et rang de naissance >3 | 5,1 | 2,11 | 11,6 |
| Sous total | 18,7 | 1,35 | 47,5 |
| Dans une des catégories de hauts risques évitables | 58,2 | 1,31 | 78,7 |
| Total | 100,0 | na | 100,0 |
| Effectif de naissances/femmes | 5 872 | na | 5 273 |

Note : Le rapport de risque est le rapport de la proportion de naissances décédées, parmi les naissances appartenant à chaque catégorie à haut risque, à la proportion de naissances décédées parmi celles n'appartenant à *aucune catégorie à hauts risques*. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

¹ Les femmes sont classées dans les catégories à risques selon le statut qu'elles auraient à la naissance de l'enfant si l'enfant était conçu au moment de l'enquête : âge actuel inférieur à 17 ans et 3 mois ou supérieur à 34 ans et 2 mois, ou la dernière naissance a eu lieu dans les 15 derniers mois, ou la dernière naissance était de rang 3 ou plus.

² Y compris la catégorie : âge < 18 ans et rang de naissance > 3

^a Y compris les femmes stérilisées