

SANTÉ DE L'ENFANT

Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête selon l'estimation, par la mère, de la grosseur de l'enfant à la naissance, pourcentage des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête dont le poids à la naissance a été déclaré et, parmi ces naissances, pourcentage qui pèse moins de 2,5 kg selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Répartition (en %) de toutes les naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance					Pourcentage de toutes les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré ¹	Effectif de naissances	Parmi les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré ¹	
	Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen ou plus gros que la moyenne	Ne sait pas/ manquant	Total			Pourcentage pesant moins de 2,5 kg	Effectif de naissances
Âge de la mère à la naissance									
<20	6,4	15,0	74,6	4,1	100,0	46,4	1 104	8,6	512
20-34	5,1	12,3	79,4	3,2	100,0	48,7	3 931	7,9	1 916
35-49	6,1	11,1	80,0	2,9	100,0	49,9	838	4,5	418
Rang de naissance									
1	5,2	14,7	75,6	4,5	100,0	51,6	1 309	9,4	675
2-3	4,9	12,0	79,2	3,8	100,0	46,0	2 068	8,9	952
4-5	6,2	10,7	81,2	2,0	100,0	50,7	1 398	7,1	710
6+	5,9	13,7	77,6	2,8	100,0	46,4	1 097	3,2	509
Statut tabagique de la mère									
Fume cigarettes/tabac	4,9	13,5	78,1	3,4	100,0	45,4	269	5,6	122
Ne fume pas	5,5	12,6	78,6	3,3	100,0	48,6	5 600	7,6	2 724
Manquant	*	*	*	*	100,0	*	3	*	0
Résidence									
Urbain	5,0	12,3	78,2	4,5	100,0	52,8	1 962	11,1	1 035
Rural	5,7	12,8	78,8	2,7	100,0	46,3	3 910	5,5	1 811
Région									
Région 1	5,6	12,5	79,1	2,8	100,0	38,4	2 162	7,1	831
Région 2	3,7	12,6	80,4	3,3	100,0	52,4	1 309	4,8	686
Région 3	6,7	11,5	75,4	6,4	100,0	49,7	1 099	16,4	546
Région 4	5,9	14,0	78,5	1,6	100,0	60,1	1 302	4,2	783
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	5,4	12,8	78,6	3,1	100,0	46,0	3 934	6,6	1 808
Primaire	6,3	11,0	79,2	3,5	100,0	45,7	841	4,5	384
Secondaire ou plus	5,1	13,2	77,8	3,9	100,0	59,6	1 098	11,9	655
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	7,8	13,7	75,2	3,3	100,0	45,7	1 369	6,5	626
Second	4,1	13,6	78,4	3,8	100,0	45,2	1 289	5,8	582
Moyen	5,2	9,6	83,1	2,0	100,0	45,3	1 195	3,7	541
Quatrième	4,3	14,2	79,5	2,1	100,0	50,6	1 119	5,5	566
Le plus élevé	5,7	11,6	76,7	5,9	100,0	58,9	900	16,8	531
Ensemble	5,5	12,6	78,6	3,3	100,0	48,5	5 872	7,5	2 846

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée

¹ Basé soit sur un enregistrement écrit, soit sur la déclaration de la mère.

Tableau 10.2 Vaccinations par source d'information

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête selon la source d'information (carnet de vaccination ou déclaration de la mère) et pourcentage ayant été vacciné avant l'âge de 12 mois, Données modèles DHS6

Source d'information	BCG	DTC0q 1	DTC0q 2	DTC0q 3	Polio 0 ¹	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rou- geole	Tous les vaccins de base ²	Aucun vaccin	Effectif d'enfants
Vacciné à n'importe quel moment avant l'enquête												
Carnet de vaccination	70,2	69,8	67,1	60,9	68,5	69,6	66,8	60,8	53,9	51,8	0,2	722
Déclaration de la mère	26,1	24,5	21,6	15,3	22,9	24,5	21,2	15,1	24,4	13,3	2,2	303
Les deux sources	96,3	94,3	88,7	76,2	91,4	94,1	88,0	75,9	78,4	65,0	2,4	1 024
Vacciné avant l'âge de 12 mois³												
	95,2	93,8	87,2	72,6	90,8	93,5	86,6	72,4	68,1	55,1	3,1	1 024

¹ Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

² BCG, rougeole, les trois doses de DTC0q et les trois doses de polio, (non-compris la dose de polio donnée à la naissance)

³ Pour les enfants dont l'information est basée sur la déclaration de la mère, on suppose que la proportion de vaccins effectués au cours de la première année est la même que celle des enfants dont l'information provient d'un carnet de vaccination.

Tableau 10.3 Vaccinations selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou les déclarations de la mère) et pourcentage pour lesquels un carnet de vaccination a été présenté à l'enquêtrice, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	BCG	DTC0q 1	DTC0q 2	DTC0q 3	Polio 0 ¹	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous les vaccins de base ²	Aucun vaccin	Pourcentage avec un carnet de vaccination vu	Effectif d'enfants
Sexe													
Masculin	96,4	95,4	91,3	79,5	94,2	94,8	90,8	79,5	78,8	68,5	2,1	70,7	474
Féminin	96,2	93,4	86,5	73,3	89,0	93,5	85,6	72,8	78,0	62,1	2,7	70,3	551
Rang de naissance													
1	96,5	95,9	91,0	80,0	89,9	93,7	88,8	79,2	78,8	68,1	2,7	72,4	227
2-3	95,5	92,6	85,9	71,1	90,2	93,1	86,3	71,4	81,0	62,4	1,6	63,2	354
4-5	96,2	94,9	90,4	78,3	94,6	94,4	89,3	77,8	74,2	65,4	3,4	77,3	257
6+	97,7	95,0	88,7	78,1	91,1	96,0	88,6	77,9	78,5	65,8	2,3	72,5	187
Résidence													
Urbain	95,5	93,8	89,9	75,1	91,6	92,6	89,1	75,0	77,4	62,8	3,2	64,2	362
Rural	96,7	94,7	88,0	76,8	91,3	94,9	87,4	76,4	78,9	66,3	2,0	73,9	662
Région													
Région 1	95,4	93,1	84,0	73,3	88,5	93,0	83,0	72,5	74,9	61,4	3,0	69,6	383
Région 2	98,4	97,8	94,9	85,4	95,4	97,5	94,9	84,6	86,0	75,3	0,9	74,2	196
Région 3	93,6	91,3	85,6	66,7	86,7	89,9	84,1	66,6	74,6	53,5	4,3	56,6	206
Région 4	98,3	96,1	93,8	81,4	96,8	96,7	93,7	82,2	80,9	72,5	1,0	80,7	240
Niveau d'instruction de la mère													
Aucun	95,6	93,6	87,6	75,6	90,3	93,6	86,9	75,2	78,0	65,2	3,3	72,3	654
Primaire	98,3	97,6	90,4	73,4	91,0	95,7	88,3	71,4	75,2	55,3	0,3	71,9	150
Secondaire ou plus	97,1	94,3	91,0	79,8	95,0	94,3	91,0	81,1	81,6	71,1	1,2	64,2	221
Quintile de bien-être économique													
Le plus bas	97,9	95,0	90,7	80,5	92,4	96,1	90,7	81,5	85,3	74,9	1,8	71,3	245
Second	93,9	92,3	86,2	76,1	88,7	92,3	85,7	75,7	77,8	64,4	3,1	76,7	208
Moyen	98,2	96,5	89,4	77,8	93,8	95,5	88,0	75,9	76,2	61,3	1,0	72,6	214
Quatrième	94,9	93,7	85,8	69,9	87,8	92,0	84,4	68,4	73,2	58,3	2,8	67,3	209
Le plus élevé	96,2	94,0	91,9	75,8	95,1	94,0	91,9	77,6	78,3	64,5	3,8	61,9	149
Ensemble	96,3	94,3	88,7	76,2	91,4	94,1	88,0	75,9	78,4	65,0	2,4	70,5	1 024

¹ Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

² BCG, rougeole, les trois doses de DTC0q et les trois doses de polio, (non-compris la dose de polio donnée à la naissance)

Tableau 10.4 Vaccinations au cours de la première année

Pourcentage d'enfants âgés de 12-59 mois au moment de l'enquête qui ont reçu certains vaccins avant l'âge de 12 mois et pourcentage de ceux pour lesquels un carnet de vaccination a été présenté à l'enquêtrice, selon l'âge actuel de l'enfant, Données modèles DHS6

Âge en mois	BCG	DTC0q 1	DTC0q 2	DTC0q 3	Polio 0 ¹	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Rougeole	Tous les vaccins de base ²	Aucun vaccin	Pourcentage avec un carnet de vaccination vu	Effectif d'enfants
12-23	95,2	93,8	87,2	72,6	90,8	93,5	86,6	72,4	68,1	55,1	3,1	70,5	1 024
24-35	92,1	86,5	81,9	70,8	86,1	88,5	82,2	71,2	69,4	59,4	6,8	60,9	976
36-47	90,8	86,8	79,4	65,2	83,0	88,4	79,1	65,8	66,4	52,7	7,3	49,3	1 076
48-59	90,0	83,6	76,5	61,5	82,6	85,0	76,7	61,6	60,3	45,9	8,6	41,9	961
Total	92,1	87,9	81,7	67,9	85,7	89,1	81,5	68,2	67,0	53,9	6,3	55,7	4 037

Note : L'information provient du carnet de vaccination ou, s'il n'y a pas d'enregistrement écrit, elle provient de la déclaration de la mère. Pour les enfants dont l'information est basée sur la déclaration de la mère, on suppose que la proportion de vaccinations reçues durant la première année est la même que celle observée pour les enfants pour lesquels on dispose d'un carnet de vaccination.

¹ Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

² BCG, rougeole, les trois doses de DTC0q et les trois doses de polio, (non compris la dose de polio donnée à la naissance)

Tableau 10.5 Prévalence et traitement des symptômes d'Infections Respiratoires Aiguës (IRA)

Parmi les enfants de moins de cinq, pourcentage de ceux qui ont présenté des symptômes d'Infection Respiratoire Aiguë (IRA) au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ; parmi ces enfants, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé et pourcentage qui ont reçu des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de cinq ans :		Parmi les enfants de moins de cinq ans avec des symptômes d'IRA :		
	Pourcentage avec des symptômes d'IRA ¹	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé ²	Pourcentage ayant pris des antibiotiques	Effectif d'enfants
Âge en mois					
<6	2,9	606	*	*	18
6-11	8,7	585	76,7	36,2	51
12-23	6,8	1 024	70,2	60,9	70
24-35	4,1	976	71,7	53,7	40
36-47	3,1	1 076	(76,3)	(39,5)	34
48-59	2,1	961	(74,3)	(26,7)	20
Sexe					
Masculin	4,4	2 596	72,0	49,2	114
Féminin	4,5	2 632	73,8	42,2	119
Statut tabagique de la mère					
Fume cigarettes/tabac	5,1	226	*	*	11
Ne fume pas	4,4	4 999	74,5	47,1	222
Manquant	*	3	*	*	0
Combustible pour cuisiner					
Charbon	3,2	1 108	(75,7)	(59,8)	35
Bois/Paille ³	4,8	4 114	72,3	42,9	197
Autre combustible ⁴	*	1	*	*	0
Pas de repas préparé dans le ménage	*	2	*	*	0
Manquant	*	3	*	*	1
Résidence					
Urbain	3,6	1 720	75,8	56,8	61
Rural	4,9	3 508	71,9	41,6	172
Région					
Région 1	6,6	1 965	64,6	39,1	130
Région 2	2,5	1 169	(86,5)	(45,7)	30
Région 3	4,0	948	(77,1)	(54,1)	38
Région 4	3,1	1 145	(87,5)	(60,2)	36
Niveau d'instruction de la mère					
Aucun	4,7	3 516	72,1	42,7	165
Primaire	4,7	744	(71,7)	(50,6)	35
Secondaire ou plus	3,4	968	(78,5)	(55,0)	33
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	4,5	1 223	69,8	42,2	55
Second	4,6	1 136	78,2	44,0	52
Moyen	5,7	1 078	66,6	32,9	62
Quatrième	4,1	1 029	(73,0)	(64,4)	42
Le plus élevé	2,9	761	*	*	22
Ensemble	4,5	5 228	72,9	45,6	233

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA (toux accompagnée d'une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou à des difficultés respiratoires associés à des problèmes de congestion dans la poitrine) sont considérés comme des indicateurs de la pneumonie.

² Non compris les pharmacies, les boutiques et les guérisseurs traditionnels

³ Y compris l'herbe, les branches et les résidus agricoles.

⁴ Y compris GPL et kérosène

Tableau 10.6 Prévalence et traitement de la fièvre

Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé, pourcentage qui ont pris des antipaludiques et pourcentage qui ont pris des antibiotiques comme traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de cinq ans :		Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la fièvre :			
	Pourcentage ayant eu de la fièvre	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé ¹	Pourcentage ayant pris des antipaludiques	Pourcentage ayant pris des antibiotiques	Effectif d'enfants
Âge en mois						
<6	19,3	606	68,8	25,4	32,5	117
6-11	31,4	585	65,0	43,2	35,6	183
12-23	33,3	1 024	71,0	49,6	42,2	341
24-35	28,2	976	62,9	46,9	30,0	275
36-47	22,7	1 076	62,4	50,0	29,7	244
48-59	20,5	961	59,1	47,5	30,7	197
Sexe						
Masculin	25,5	2 596	66,6	48,1	35,1	662
Féminin	26,5	2 632	63,6	43,8	33,1	696
Résidence						
Urbain	27,9	1 720	60,9	44,7	38,5	480
Rural	25,0	3 508	67,4	46,5	31,7	877
Région						
Région 1	28,1	1 965	64,4	45,8	29,1	553
Région 2	25,7	1 169	61,1	38,7	35,0	300
Région 3	25,3	948	57,6	39,0	41,7	239
Région 4	23,2	1 145	77,8	60,4	36,5	265
Niveau d'instruction de la mère						
Aucun	25,9	3 516	63,5	43,9	30,0	911
Primaire	26,4	744	65,9	46,6	35,8	197
Secondaire ou plus	25,8	968	70,0	52,3	47,7	250
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	24,8	1 223	63,3	45,8	27,9	303
Second	23,8	1 136	70,0	42,7	29,4	271
Moyen	28,7	1 078	68,3	46,0	31,6	309
Quatrième	28,4	1 029	61,0	46,0	39,3	292
Le plus élevé	24,0	761	61,7	50,3	47,0	182
Ensemble	26,0	5 228	65,1	45,9	34,1	1 358

¹ Non compris les pharmacies, les boutiques, les marchés et les guérisseurs traditionnels

Tableau 10.7 Prévalence de la diarrhée

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui ont eu de la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête :		Effectif d'enfants
	Toute diarrhée	Diarrhée avec sang	
Âge en mois			
<6	6,8	0,2	606
6-11	15,3	3,2	585
12-23	16,3	3,6	1 024
24-35	12,7	2,4	976
36-47	9,4	2,6	1 076
48-59	8,9	2,0	961
Sexe			
Masculin	11,1	2,2	2 596
Féminin	12,1	2,7	2 632
Provenance de l'eau de consommation¹			
Source améliorée	10,8	2,3	3 207
Non améliorée	13,0	2,7	2 016
Autre/manquant	*	*	5
Type d'installation sanitaire²			
Améliorée, non partagée	10,7	3,1	488
Partagée ³	11,8	2,5	1 977
Non améliorée	11,7	2,3	2 731
Manquant	(13,0)	(2,1)	33
Résidence			
Urbain	12,7	2,0	1 720
Rural	11,1	2,7	3 508
Région			
Région 1	14,4	3,8	1 965
Région 2	7,6	1,9	1 169
Région 3	12,9	0,8	948
Région 4	9,8	2,1	1 145
Niveau d'instruction de la mère			
Aucun	12,0	2,5	3 516
Primaire	11,7	2,2	744
Secondaire ou plus	10,2	2,5	968
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	11,3	2,7	1 223
Second	11,4	2,8	1 136
Moyen	12,9	2,8	1 078
Quatrième	10,1	2,3	1 029
Le plus élevé	12,7	1,3	761
Ensemble	11,6	2,5	5 228

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Se reporter au Tableau 2.1 pour la définition des catégories

² Se reporter au Tableau 2.2 pour la définition des catégories

³ Type d'installations sanitaires seraient considérées comme « améliorées » si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus.

Tableau 10.8 Traitement de la diarrhée

Parmi les enfants de moins de cinq ans ayant eu de la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé, pourcentage à qui on a donné une Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO), pourcentage à qui on a donné davantage de liquides, pourcentage à qui on a donné une TRO ou davantage de liquides et pourcentage d'enfants à qui on a administré d'autres traitements, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants avec diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé ¹	Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO)				Autres traitements								Effectif d'enfants avec la diarrhée	
		Liquide de sachets SRO ou liquide SRO préconditionné	Solution Maison Recommandée (SMR))	Soit SRO ou SMR	Liquides augmentés	TRO ou liquides augmentés	Anti-biotique	Médicaments anti-motilité	Suppléments de zinc	Solution intraveineuse	Remède maison/ autre	Manquant	Aucun traitement		
Âge en mois															
<6	(53,0)	(54,6)	(6,1)	(54,6)	(11,4)	(56,3)	(43,6)	(0,0)	(2,5)	(0,0)	(23,5)	(0,0)	(14,9)	41	
6-11	70,4	88,4	8,0	89,8	33,6	95,4	42,5	4,3	3,3	0,0	41,6	0,0	0,5	90	
12-23	74,7	89,2	14,8	91,2	30,5	93,5	44,4	4,6	4,7	0,0	33,1	0,0	2,2	167	
24-35	62,3	86,5	10,4	87,2	44,3	95,3	50,9	0,6	1,1	0,0	28,4	0,0	0,5	124	
36-47	61,1	86,2	6,8	87,5	31,5	90,4	46,4	0,0	1,5	0,0	29,1	1,0	4,1	101	
48-59	57,5	81,9	15,8	84,5	15,5	84,8	38,7	0,4	1,9	0,0	27,8	7,0	4,2	85	
Sexe															
Masculin	64,9	85,6	11,8	87,1	33,3	90,8	40,2	2,5	3,8	0,0	33,0	1,9	3,7	288	
Féminin	65,9	83,8	10,5	85,3	28,1	89,1	49,2	1,7	1,7	0,0	29,8	0,5	2,5	319	
Type de diarrhée															
Pas de présence de sang	62,7	85,1	9,4	86,3	29,4	89,6	44,2	2,3	2,8	0,0	30,0	0,3	3,5	471	
Présence de sang	76,6	85,4	16,7	87,9	36,6	93,5	48,5	1,2	2,1	0,0	37,1	1,1	1,5	128	
Manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9	
Résidence															
Urbain	63,6	85,1	14,4	85,5	24,7	87,1	58,5	3,5	2,5	0,0	29,3	1,4	1,1	219	
Rural	66,4	84,4	9,3	86,5	33,9	91,5	37,2	1,3	2,8	0,0	32,5	1,0	4,2	389	
Région															
Région 1	63,8	81,3	10,0	82,9	44,5	89,4	37,6	1,9	3,8	0,0	40,0	0,9	3,6	283	
Région 2	68,7	93,6	6,5	93,6	23,7	95,5	40,7	2,8	3,6	0,0	27,3	1,2	0,3	89	
Région 3	58,9	86,9	14,6	86,9	20,6	89,2	63,9	3,0	0,0	0,0	20,1	2,4	0,9	122	
Région 4	73,9	83,4	13,7	87,5	11,6	87,5	46,2	0,8	2,2	0,0	25,0	0,5	6,3	113	
Niveau d'instruction de la mère															
Aucun	65,5	84,2	9,3	86,0	31,6	89,6	41,2	1,8	2,5	0,0	32,0	1,7	3,0	422	
Primaire	72,1	88,6	17,3	88,6	29,8	91,1	44,3	5,3	1,9	0,0	39,1	0,0	5,0	87	
Secondaire ou plus	59,1	82,9	13,4	84,5	26,5	90,4	61,2	0,4	4,2	0,0	21,8	0,0	1,6	99	
Quintile de bien-être économique															
Le plus bas	63,4	85,7	5,9	89,3	29,8	93,0	33,2	1,7	2,0	0,0	24,4	0,7	5,8	138	
Second	62,3	88,2	8,9	88,3	32,4	93,0	43,6	1,2	4,8	0,0	32,9	0,4	3,5	129	
Moyen	62,5	78,6	15,0	79,2	32,4	83,1	33,8	1,7	1,2	0,0	35,6	4,0	3,1	140	
Quatrième	73,2	81,1	15,2	83,1	27,8	86,3	55,3	5,5	3,5	0,0	45,8	0,0	0,5	104	
Le plus élevé	68,2	91,0	11,4	91,9	29,4	95,0	68,3	0,4	2,2	0,0	17,4	0,0	1,2	97	
Ensemble	65,4	84,6	11,1	86,1	30,5	89,9	44,9	2,0	2,7	0,0	31,3	1,2	3,1	608	

Note : La TRO comprend le liquide préparé à partir des sachets de Sels de Réhydratation Orale (SRO), le liquide préconditionné de SRO, et les Solutions Maison Recommandées (SMR). Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Non compris les pharmacies, les boutiques et les guérisseurs traditionnels.

Tableau 10.9 Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition (en %) des enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, pourcentage d'enfants à qui on a donné davantage de liquides et qui ont continué à s'alimenter pendant l'épisode diarrhéique, et pourcentage d'enfants qui ont continué à s'alimenter et qui ont été traités au moyen d'une TRO et/ou à qui on a donné davantage de liquides durant les épisodes diarrhéiques, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Quantité de liquides donnée							Quantité de nourriture donnée							Pourcentage à qui on a donné davantage de liquides et qui ont continué à s'alimenter ¹	Pourcentage qui ont continué à s'alimenter et qui ont reçu de la TRO et/ou une davantage de liquides ¹	Effectif d'enfants avec diarrhée	
	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne sait pas/manquant	Total	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	N'apas commencé a manger	Ne sait pas/manquant				Total
Âge en mois																		
<6	(11,4)	(25,2)	(14,4)	(39,8)	(9,2)	(0,0)	100,0	(0,0)	(37,6)	(27,0)	(20,4)	(5,2)	(9,7)	(0,0)	100,0	(8,4)	(44,1)	41
6-11	33,6	18,5	24,3	23,1	0,6	0,0	100,0	6,0	13,8	34,0	31,4	5,4	9,3	0,0	100,0	17,8	53,0	90
12-23	30,5	22,1	25,6	19,1	2,7	0,0	100,0	8,3	27,8	29,4	25,5	7,0	2,0	0,0	100,0	20,5	59,3	167
24-35	44,3	27,7	14,7	13,2	0,0	0,0	100,0	13,5	34,7	28,6	20,6	2,7	0,0	0,0	100,0	34,0	74,1	124
36-47	31,5	19,6	27,9	20,0	0,0	1,0	100,0	7,1	24,5	38,0	26,6	2,7	0,0	1,0	100,0	21,9	62,1	101
48-59	15,5	26,9	29,0	23,9	1,2	3,5	100,0	6,5	23,1	30,8	26,5	7,9	1,2	3,9	100,0	10,6	56,1	85
Sexe																		
Masculin	33,3	21,6	21,0	19,7	3,0	1,4	100,0	10,2	20,3	34,8	24,7	6,0	2,7	1,4	100,0	25,4	61,2	288
Féminin	28,1	24,6	25,4	21,6	0,3	0,0	100,0	6,1	32,3	28,3	25,9	4,5	2,8	0,1	100,0	16,8	59,7	319
Type de diarrhée																		
Pas de présence de sang	29,4	24,6	23,6	20,5	1,9	0,0	100,0	9,4	29,3	31,2	23,0	3,8	3,2	0,1	100,0	21,3	63,5	471
Présence de sang	36,6	18,7	23,4	20,6	0,8	0,0	100,0	3,6	18,5	33,9	32,4	10,8	0,9	0,0	100,0	20,8	52,6	128
Manquant	*	*	*	*	*	*	100,0	*	*	*	*	*	*	*	100,0	*	*	9
Résidence																		
Urbain	24,7	17,4	23,3	30,3	2,9	1,4	100,0	8,5	24,7	29,8	27,2	6,8	1,6	1,4	100,0	18,4	56,9	219
Rural	33,9	26,4	23,3	15,3	0,9	0,3	100,0	7,8	27,7	32,3	24,3	4,3	3,4	0,4	100,0	22,3	62,3	389
Région																		
Région 1	44,5	18,6	22,4	13,8	0,6	0,0	100,0	9,2	21,3	37,3	26,3	1,9	3,8	0,1	100,0	29,9	62,3	283
Région 2	23,7	23,5	23,1	27,3	1,3	1,2	100,0	11,1	23,7	31,0	25,2	4,9	2,8	1,2	100,0	19,7	64,7	89
Région 3	20,6	16,5	20,7	36,4	3,3	2,4	100,0	10,0	32,9	19,6	31,3	2,0	1,8	2,4	100,0	15,5	58,3	122
Région 4	11,6	41,6	28,4	15,8	2,7	0,0	100,0	0,4	35,4	29,6	16,5	17,0	1,1	0,0	100,0	4,9	54,3	113
Niveau d'instruction de la mère																		
Aucun	31,6	24,2	21,4	20,0	1,8	1,0	100,0	9,4	26,2	32,3	25,0	4,0	2,1	1,0	100,0	22,9	62,9	422
Primaire	29,8	23,2	25,8	20,6	0,6	0,0	100,0	6,0	29,1	27,8	27,8	4,7	4,6	0,0	100,0	19,0	54,0	87
Secondaire ou plus	26,5	18,8	29,1	23,9	1,6	0,0	100,0	3,7	26,3	30,9	24,7	10,5	4,0	0,0	100,0	14,1	55,1	99
Quintile de bien-être économique																		
Le plus bas	29,8	26,6	28,2	14,4	1,1	0,0	100,0	7,4	27,0	36,8	21,6	5,6	1,2	0,3	100,0	19,9	65,8	138
Second	32,4	30,4	22,2	13,7	1,3	0,0	100,0	5,6	31,4	34,1	20,2	4,2	4,5	0,0	100,0	22,9	65,8	129
Moyen	32,4	17,9	24,8	22,1	0,0	2,9	100,0	9,1	22,7	32,4	28,1	3,2	1,6	2,9	100,0	20,5	57,0	140
Quatrième	27,8	19,6	20,3	29,9	2,3	0,0	100,0	8,7	22,9	28,3	30,0	5,7	4,5	0,0	100,0	21,0	51,4	104
Le plus élevé	29,4	20,3	18,9	27,3	4,2	0,0	100,0	9,9	29,2	22,1	28,5	8,2	2,3	0,0	100,0	19,9	59,9	97

Total	30,5	23,2	23,3	20,7	1,6	0,7	100,0	8,0	26,6	31,4	25,3	5,2	2,7	0,7	100,0	20,9	60,4	608
-------	------	------	------	------	-----	-----	-------	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-------	------	------	-----

Note : Il est recommandé, pendant les épisodes diarrhéiques, de donner davantage de liquides à l'enfant et de ne pas réduire les rations alimentaires. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les pratiques d'alimentation continue incluent les enfants qui ont reçu plus, comme d'habitude, ou un peu moins de nourriture pendant l'épisode de diarrhée.

Tableau 10.10 Connaissance des sachets de SRO ou des liquides SRO préconditionnés

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui connaissent les sachets de SRO ou des liquides SRO préconditionnés	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
15-19	97,9	431
20-24	98,7	885
25-34	97,8	1 804
35-49	98,5	1 056
Résidence		
Urbain	98,4	1 468
Rural	98,1	2 709
Région		
Région 1	98,8	1 542
Région 2	96,7	896
Région 3	97,2	816
Région 4	99,4	922
Niveau d'instruction		
Aucun	98,3	2 714
Primaire	97,1	583
Secondaire ou plus	98,6	880
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	97,8	917
Second	99,0	888
Moyen	97,5	864
Quatrième	98,1	832
Le plus élevé	98,5	675
Ensemble	98,2	4 177

SRO = sels de réhydratation par voie orale

Tableau 10.11 Évacuation des selles des enfants

Répartition (en %) des enfants les plus jeunes de moins de 5 ans vivant avec leur mère par moyen d'évacuation des dernières matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de manière appropriée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Moyen d'évacuation des selles des enfants								Total	Pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique ¹	Effectif d'enfants
	L'enfant a utilisé les toilettes ou les latrines	Jetées/rincées dans toilettes ou latrines	Enterrées	Jetées/rincées dans égouts ou caniveaux	Jetées aux ordures	Laissées à l'air libre	Autre	manquant			
Âge en mois											
<6	1,9	52,1	0,9	17,7	13,2	5,8	6,8	1,5	100,0	54,9	590
6-11	2,0	65,4	1,1	11,2	11,7	5,2	2,5	1,1	100,0	68,5	568
12-23	2,7	74,0	0,3	8,1	5,0	6,5	2,8	0,6	100,0	76,9	947
24-35	4,4	74,4	0,8	2,7	6,9	7,5	1,7	1,6	100,0	79,6	730
36-47	5,9	77,0	1,0	3,2	6,3	4,1	1,2	1,3	100,0	83,9	517
48-59	12,2	71,1	0,0	2,7	3,9	7,3	1,6	1,2	100,0	83,3	340
Type de toilettes²											
Toilettes améliorées, non partagées	5,8	76,7	0,4	8,6	6,6	0,7	0,3	0,7	100,0	83,0	355
Toilettes partagées ²	5,2	80,0	0,2	5,7	5,2	1,4	1,3	1,0	100,0	85,4	1 418
Toilettes non améliorées ou partagées	2,8	60,1	1,1	9,4	10,0	10,7	4,5	1,4	100,0	63,9	1 895
Manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	100,0	*	26
Résidence											
Urbain	5,3	76,1	0,0	9,7	2,7	1,1	3,9	1,2	100,0	81,4	1 229
Rural	3,5	66,1	1,0	6,9	10,3	8,6	2,3	1,1	100,0	70,6	2 465
Région											
Région 1	4,1	76,2	1,4	5,2	8,9	1,9	1,5	0,9	100,0	81,6	1 413
Région 2	3,7	62,9	0,5	7,2	8,3	12,2	3,6	1,6	100,0	67,1	796
Région 3	5,9	68,3	0,0	15,5	2,5	1,2	5,1	1,6	100,0	74,1	675
Région 4	3,2	64,9	0,2	6,7	9,8	11,7	2,6	0,8	100,0	68,4	810
Niveau d'instruction de la mère											
Aucun	3,6	68,4	0,9	7,7	8,7	6,6	3,0	1,2	100,0	72,9	2 469
Primaire	5,0	67,8	0,4	10,2	5,2	6,9	3,7	0,8	100,0	73,2	506
Secondaire ou plus	5,4	73,8	0,2	6,8	6,4	4,1	1,9	1,4	100,0	79,5	719
Quintile de bien-être économique											
Le plus bas	2,8	56,0	0,9	7,8	14,0	14,1	2,9	1,5	100,0	59,7	815
Second	3,7	65,5	1,2	6,8	10,9	7,6	2,5	1,8	100,0	70,4	807
Moyen	3,6	72,6	0,9	7,6	7,2	4,0	3,5	0,6	100,0	77,1	777
Quatrième	4,3	78,1	0,2	8,8	2,4	2,6	2,9	0,7	100,0	82,6	733
Le plus élevé	7,1	78,8	0,0	8,4	2,1	0,0	2,4	1,2	100,0	85,9	561
Ensemble	4,1	69,4	0,7	7,9	7,8	6,1	2,8	1,2	100,0	74,2	3 694

Note : un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ On considère que les matières fécales des enfants sont évacuées de manière appropriée si l'enfant utilise les toilettes ou les latrines, si les matières fécales sont jetées ou rincées dans des toilettes ou des latrines ou si elles sont enterrées

² Se référer au Tableau 2.2 pour la définition des catégories

³ Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par 2 ménages ou plus