

PLANIFICATION FAMILIALE

Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives

Pourcentage de tous les enquêtés de 15-49 ans, d'enquêtés actuellement en union et d'enquêtés de 15-49 ans qui ne sont pas en union mais qui sont sexuellement actifs qui ont entendu parler d'une méthode contraceptive, selon la méthode, Données modèles DHS6

Méthode	Femme			Homme		
	Ensemble des femmes	Femmes actuellement en union	Femme non en union et sexuellement actives ¹	Ensemble des hommes	Hommes actuellement en union	Hommes non en union et sexuellement actifs ¹
N'importe quelle méthode	96,0	95,6	99,2	96,6	97,6	98,5
Une méthode moderne	95,4	94,9	99,1	96,1	96,8	98,5
Stérilisation féminine	58,7	59,0	69,9	56,0	56,8	67,2
Stérilisation masculine	31,6	31,3	40,7	40,8	39,6	52,9
Pilule	92,4	91,7	98,1	86,5	88,0	92,6
DIU	70,0	68,6	85,9	54,2	54,0	69,0
Injectables	91,6	90,9	98,2	87,1	88,0	93,0
Implants	89,4	88,0	96,7	81,6	80,6	89,5
Condom masculine	92,0	90,8	98,2	95,2	95,7	97,8
Condom féminin	71,6	68,2	87,1	68,1	66,2	81,8
Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA)	45,8	49,7	47,8	22,8	25,9	26,1
Pilule du lendemain	33,0	31,3	46,3	21,8	22,6	28,0
Une méthode traditionnelle	69,6	71,2	81,0	68,9	73,5	78,5
Méthode de rythme	44,3	40,8	64,0	39,5	40,3	49,1
Retrait	54,1	53,1	72,9	60,8	63,7	73,1
Autre méthode moderne	40,0	44,7	38,4	21,6	28,2	22,6
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêté(e)s 15-49 ans	8,1	8,1	9,4	7,4	7,5	8,4
Effectif d'enquêtés	8 348	5 273	1 113	3 299	1 696	587
Nombre moyen de méthodes connues par les hommes de 15-59 ans	na	na	na	7,3	7,4	8,4
Effectif d'hommes enquêtés	na	na	na	3 621	2 000	590

na = Non applicable

¹ A eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête.

Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives par caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive et pourcentage qui ont entendu parler d'au moins une méthode moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	A entendu parler d'au moins une méthode	A entendu parler d'au moins une méthode moderne ¹	Effectif de femmes	A entendu parler d'au moins une méthode	A entendu parler d'au moins une méthode moderne ¹	Effectif d'hommes
Âge						
15-19	94,9	93,6	339	*	*	5
20-24	95,4	94,4	782	98,8	98,8	101
25-29	96,4	96,0	1 133	98,8	97,3	270
30-34	96,0	95,6	964	98,3	97,8	319
35-39	95,7	94,9	937	97,1	97,0	426
40-44	96,3	95,8	551	97,9	96,4	307
45-49	93,3	91,7	566	95,5	94,3	267
Résidence						
Urbain	98,0	97,5	1 886	99,1	99,1	626
Rural	94,3	93,4	3 386	96,7	95,4	1 069
Région						
Région 1	93,2	92,3	1 984	97,1	96,8	604
Région 2	98,1	97,2	1 087	98,9	97,0	363
Région 3	98,6	97,9	1 072	98,8	98,8	369
Région 4	94,8	94,2	1 130	95,8	94,4	360
Niveau d'instruction						
Aucun	94,5	93,5	3 688	96,0	94,5	907
Primaire	96,5	96,5	693	100,0	100,0	182
Secondaire ou plus	99,5	99,5	891	99,2	99,2	607
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	93,3	92,5	1 115	96,0	95,7	356
Second	93,3	92,4	1 138	96,2	95,3	360
Moyen	96,2	95,1	1 101	98,1	97,2	355
Quatrième	97,4	97,2	986	98,6	96,6	296
Le plus élevé	98,7	98,0	933	99,3	99,3	329
Ensemble 15-49	95,6	94,9	5 273	97,6	96,8	1 696
50-59	na	na	na	95,7	92,6	304
Ensemble 15-59	na	na	na	97,3	96,2	2 000

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

¹ Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, Diaphragme, Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA), et pilule du lendemain

Tableau 7.3.3 Utilisation actuelle de la contraception selon l'âge

Répartition (en %) de toutes les femmes de 15-49 ans, des femmes actuellement en union et des femmes qui ne sont pas en union et sexuellement actives, par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon l'âge, Données modèles DHS6

Âge	Une méthode	Une méthode moderne	Méthode moderne										Méthode traditionnelle			N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes	
			Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	Dia-phragme	MAMA	Autre	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait				Autre
ENSEMBLE DES FEMMES																			
15-19	21,5	20,6	0,0	0,0	4,8	0,3	9,7	4,3	0,8	0,0	0,6	0,1	0,9	0,1	0,4	0,4	78,5	100,0	1 958
20-24	31,4	30,3	0,0	0,0	7,7	0,3	14,0	5,0	1,2	0,0	1,1	1,0	1,1	0,0	0,8	0,4	68,6	100,0	1 428
25-29	22,9	22,4	0,0	0,0	5,8	0,4	9,6	3,5	1,8	0,0	0,8	0,5	0,6	0,0	0,1	0,4	77,1	100,0	1 419
30-34	25,5	23,9	0,3	0,2	6,7	0,1	11,6	3,4	1,0	0,0	0,7	0,0	1,6	0,1	0,6	0,9	74,5	100,0	1 100
35-39	25,1	23,0	0,5	0,0	5,2	0,2	10,6	4,8	1,1	0,0	0,5	0,1	2,1	0,0	0,0	2,1	74,9	100,0	1 099
40-44	20,6	18,8	0,7	0,0	3,4	0,2	9,8	3,7	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	0,4	1,3	79,4	100,0	660
45-49	12,7	10,0	0,9	0,0	1,9	0,1	4,6	1,2	0,5	0,0	0,8	0,0	2,6	1,0	0,0	1,6	87,3	100,0	684
Ensemble	23,7	22,3	0,2	0,0	5,4	0,2	10,4	3,9	1,0	0,0	0,7	0,3	1,4	0,1	0,4	0,9	76,3	100,0	8 348
FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION																			
15-19	6,7	6,7	0,0	0,0	0,8	0,0	2,9	1,5	0,2	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3	100,0	339
20-24	14,6	13,9	0,0	0,0	2,6	0,1	6,7	2,5	0,7	0,0	1,3	0,0	0,7	0,0	0,4	0,2	85,4	100,0	782
25-29	15,9	15,3	0,0	0,0	3,8	0,3	7,3	2,6	0,5	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,2	0,4	84,1	100,0	1 133
30-34	21,3	20,3	0,3	0,2	5,7	0,1	9,5	3,6	0,2	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	78,7	100,0	964
35-39	23,6	21,2	0,5	0,0	5,5	0,0	10,6	3,6	0,2	0,0	0,6	0,2	2,4	0,0	0,0	2,4	76,4	100,0	937
40-44	20,0	18,0	0,8	0,0	3,6	0,0	8,8	3,7	0,0	0,0	1,1	0,0	2,0	0,1	0,5	1,4	80,0	100,0	551
45-49	12,6	9,6	1,1	0,0	1,8	0,1	4,6	1,1	0,0	0,0	0,9	0,0	3,0	1,2	0,0	1,8	87,4	100,0	566
Ensemble	17,5	16,2	0,3	0,0	3,9	0,1	7,8	2,8	0,3	0,0	0,9	0,0	1,4	0,1	0,2	1,1	82,5	100,0	5 273
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES ¹																			
15-19	53,8	51,7	0,0	0,0	12,8	0,5	25,1	10,7	2,2	0,1	0,0	0,3	2,1	0,4	0,2	1,4	46,2	100,0	453
20-24	67,2	64,7	0,0	0,0	20,4	0,6	27,7	9,0	3,7	0,0	0,0	3,3	2,5	0,0	2,3	0,2	32,8	100,0	327
25-29	69,4	68,5	0,0	0,0	20,7	0,9	24,7	11,3	7,2	0,0	0,0	3,7	0,9	0,3	0,0	0,5	30,6	100,0	155
30-34	78,7	68,0	0,0	0,0	23,2	0,0	38,9	3,4	2,5	0,0	0,0	0,0	10,6	1,3	9,3	0,0	21,3	100,0	72
35-39	(62,3)	(62,3)	(0,0)	(0,0)	(6,4)	(2,7)	(23,2)	(14,0)	(16,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(37,7)	100,0	47
40-44	(40,5)	(38,2)	(0,0)	(0,0)	(2,3)	(0,0)	(27,3)	(8,0)	(0,6)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(2,3)	(0,0)	(0,0)	(2,3)	(59,5)	100,0	35
45-49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100,0	24
Ensemble	61,4	58,8	0,0	0,0	16,2	0,6	26,4	9,8	4,2	0,1	0,0	1,6	2,6	0,3	1,4	0,9	38,6	100,0	1 113

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

¹ Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 30 jours qui ont précédé l'enquête.

Tableau 7.4.1 Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Méthode moderne											Méthode traditionnelle			N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes
	Une méthode	Une méthode moderne	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	MAMA	Autre	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait	Autre		
Nombre d'enfants vivants																	
0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,1	0,2	2,0	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	395
1-2	16,1	15,4	0,1	0,0	4,0	0,1	7,1	2,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,2	0,5	83,9	1 882
3-4	18,6	16,9	0,2	0,0	4,3	0,2	8,7	2,5	0,0	1,0	0,0	1,7	0,4	0,3	1,1	81,4	1 767
5+	22,3	20,1	1,1	0,1	4,1	0,1	9,4	3,8	0,0	1,2	0,1	2,3	0,0	0,0	2,3	77,7	1 229
Résidence																	
Urbain	25,7	23,3	0,3	0,0	5,4	0,2	11,1	4,7	0,6	1,0	0,0	2,4	0,4	0,4	1,7	74,3	1 886
Rural	13,0	12,2	0,4	0,1	3,0	0,1	6,0	1,8	0,1	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,7	87,0	3 386
Région																	
Région 1	12,7	11,5	0,4	0,1	1,3	0,2	6,0	1,2	0,1	2,2	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	87,3	1 984
Région 2	17,9	16,8	0,8	0,0	4,1	0,1	8,0	3,6	0,2	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	1,0	82,1	1 087
Région 3	25,7	22,9	0,0	0,0	4,6	0,1	11,2	5,9	0,8	0,3	0,0	2,9	0,6	0,7	1,6	74,3	1 072
Région 4	18,0	17,4	0,2	0,0	7,4	0,1	7,4	2,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	82,0	1 130
Niveau d'instruction																	
Aucun	15,2	13,8	0,4	0,0	3,5	0,1	6,8	1,9	0,1	0,9	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	84,8	3 688
Primaire	18,3	18,0	0,3	0,0	3,7	0,2	10,4	2,5	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	81,7	693
Secondaire ou plus	26,6	24,5	0,2	0,0	5,7	0,3	9,8	6,7	1,3	0,6	0,0	2,1	0,8	0,9	0,4	73,4	891
Quintile de bien-être économique																	
Le plus bas	13,3	12,0	0,3	0,0	2,8	0,0	5,9	1,7	0,2	1,1	0,1	1,3	0,0	0,0	1,3	86,7	1 115
Second	13,1	12,7	0,5	0,0	3,6	0,0	6,1	1,8	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	86,9	1 138
Moyen	14,3	13,4	0,2	0,2	3,0	0,2	6,8	2,2	0,2	0,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	85,7	1 101
Quatrième	22,7	20,8	0,6	0,0	5,9	0,1	9,8	3,1	0,1	1,2	0,1	1,9	0,0	0,0	1,9	77,3	986
Le plus élevé	26,4	23,8	0,2	0,0	4,4	0,3	11,1	6,0	1,1	0,7	0,0	2,6	0,7	0,9	1,0	73,6	933
Ensemble	17,5	16,2	0,3	0,0	3,9	0,1	7,8	2,8	0,3	0,9	0,0	1,4	0,1	0,2	1,1	82,5	5 273

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

Tableau 7.6 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes modernes de contraception âgées de 15-49 ans, par source d'approvisionnement la plus récente, selon la méthode, Données modèles DHS6

Source d'approvisionnement	Stérilisation féminine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	Autre	Ensemble
Secteur public	*	48,7	(84,5)	75,6	75,0	39,2	*	66,9
Hôpital du gouvernement	*	7,0	(47,7)	11,2	14,5	16,7	*	12,0
Centre de santé du gouvernement	*	27,0	(16,5)	35,8	28,2	3,3	*	30,1
Clinique de PF	*	9,5	(17,7)	21,0	27,7	16,0	*	18,8
Clinique mobile	*	2,8	(1,1)	5,7	3,3	2,5	*	4,2
Agent de santé	*	2,0	(1,6)	1,4	1,3	0,7	*	1,5
Autre public	*	0,4	(0,0)	0,4	0,0	0,0	*	0,3
Secteur médical privé	*	47,4	(15,5)	21,7	22,1	53,7	*	29,6
Hôpital/Clinique privé	*	7,7	(15,5)	11,8	14,3	0,0	*	10,6
Pharmacie	*	37,4	(0,0)	5,3	1,6	52,3	*	14,9
Médecin privé	*	1,2	(0,0)	0,8	0,2	0,0	*	0,7
Clinique mobile	*	0,4	(0,0)	1,1	4,5	0,0	*	1,5
Agent de santé	*	0,1	(0,0)	0,3	1,4	1,4	*	0,5
Autre privé	*	0,7	(0,0)	2,4	0,1	0,0	*	1,4
Autre source	*	1,4	(0,0)	0,6	0,1	7,1	*	1,0
Boutique	*	1,0	(0,0)	0,0	0,0	0,6	*	0,3
Église/mosquée	*	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	*	0,0
Ami/parents	*	0,4	(0,0)	0,6	0,1	6,4	*	0,7
Autre	*	1,1	(0,0)	1,5	0,8	0,0	*	1,2
Hors du calendrier	*	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	*	0,0
Ne sait pas	*	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	*	0,2
Manquant	*	1,3	(0,0)	0,7	2,0	0,0	*	1,1
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	19	452	20	868	328	85	3	1 775

Note : L'ensemble inclut d'autres méthodes modernes mais pas la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA). Les autres méthodes incluent la stérilisation masculine, le condom féminin et le diaphragme. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 7.7 Utilisation d'une marque de pilules et de condoms d'un programme de marketing social

Pourcentage d'utilisatrices de pilules et de condoms de 15-49 ans utilisant une marque spécifique d'un programme de marketing social, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristiques sociodémographiques	Parmi les utilisatrices de la pilule	
	Pourcentage utilisant marque : Marque 1 ou Marque 2	Effectif de femmes utilisatrices de la pilule
Âge		
15-19	98,2	61
20-24	96,6	77
25-29	98,6	55
30-34	(95,4)	40
35-39	(96,6)	31
40-44	*	7
45-49	*	8
Résidence		
Urbain	98,7	173
Rural	95,1	106
Région		
Région 1	100,0	54
Région 2	93,2	43
Région 3	(100,0)	92
Région 4	95,1	90
Niveau d'instruction		
Aucun	93,8	94
Primaire	(100,0)	38
Secondaire ou plus	99,0	147
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	(91,9)	33
Second	(93,1)	27
Moyen	98,7	52
Quatrième	99,5	76
Le plus élevé	98,0	92
Ensemble	97,4	280

Note : Les utilisatrices de la pilule qui n'en connaissent pas la marque ne sont pas prises en compte dans ce tableau. Les données sur l'utilisation du condom ne sont pas présentées parce qu'elles reposent sur un effectif trop faible. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 7.8 Choix informé de la méthode

Parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes, âgées de 15-49 ans, dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou des problèmes liés à cette méthode ; pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires et pourcentage ayant été informé de l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser, selon la méthode et la source initiale de la méthode, Données modèles DHS6

Méthode/source	Parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes dont la dernière période d'utilisation a commencé au cours des cinq années ayant précédé l'enquête :			Effectif de femmes
	Pourcentage ayant été informé des effets secondaires ou des problèmes de la méthode utilisée	Pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires	Pourcentage ayant été informé par un agent de santé ou de planification familiale d'autres méthodes qui peuvent être utilisées	
Méthode				
Stérilisation féminine	*	*	*	13
Pilule	67,3	66,2	78,1	426
DIU	(66,4)	(66,4)	(78,5)	19
Injectables	75,6	75,0	83,8	827
Implants	86,1	87,2	89,0	317
Source initiale de la méthode ¹				
<i>Secteur public</i>	79,9	78,6	87,2	1 125
Hôpital du gouvernement	74,7	73,1	81,1	202
Centre de santé du gouvernement	78,3	75,0	87,1	500
Clinique de PF	84,6	85,1	89,3	325
Clinique mobile	87,5	90,0	93,6	74
Agent de santé	(70,9)	(76,3)	(95,0)	20
Autre public	*	*	*	4
<i>Secteur médical privé</i>	67,5	69,7	76,4	431
Hôpital/Clinique privé	82,0	81,5	85,8	176
Pharmacie	51,4	59,0	66,2	177
Médecin privé	*	*	*	13
Clinique mobile	*	*	*	28
Agent de santé	*	*	*	12
Autre privé	*	*	*	24
<i>Autre source</i>	*	*	*	8
Boutique	*	*	*	4
Ami/parent	*	*	*	4
Autre	*	*	*	18
Ne sait pas	*	*	*	3
Manquant	*	*	*	17
Ensemble	75,4	75,0	83,2	1 603

Note : Le tableau n'inclut que les utilisatrices de méthodes figurant sur la liste. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Source au moment où a commencé l'épisode d'utilisation de la méthode actuelle.

Tableau 7.9 Taux de discontinuation de la contraception sur 12 mois

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont commencé un épisode contraceptif dans les cinq années avant l'enquête, pourcentage d'épisodes de discontinuation au cours des 12 mois, par raison de discontinuation et par méthode spécifique, Données modèles DHS6

Méthode	Échec de la méthode	Souhaitait tomber enceinte	Autres raisons liées à la fécondité ²	Effets secondaires/raisons liées à la santé	Souhaitait une méthode plus efficace	Autres raisons liées à la méthode ³	Autres raisons	N'importe quelle raison ⁴	A changé de méthode ⁵	Nombre d'épisodes d'utilisation ⁶
Pilule	3,1	5,6	0,0	9,4	3,0	2,8	3,0	26,9	6,0	678
Injectables	1,0	4,3	0,5	14,5	2,3	0,6	1,8	24,9	5,2	1 157
Implants	0,0	1,4	0,0	5,4	0,0	1,0	0,8	8,5	0,3	381
Autre ¹	(3,5)	(1,1)	(3,6)	(0,4)	(0,4)	(0,0)	(18,1)	(27,1)	(2,6)	202
Toutes méthodes	1,6	4,4	0,5	10,4	2,2	1,6	3,4	24,2	5,7	2 697

Note : Les valeurs sont basées sur des calculs de table de survie en utilisant les informations sur les épisodes d'utilisation qui ont commencé 3-62 mois avant l'enquête. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ Inclut la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, le DIU, le condom masculin, le condom féminin, le diaphragme, la MAMA, la méthode du rythme et le retrait.

² Inclut rapports sexuels peu fréquents/mari absent, difficulté de tomber enceinte/ménopause et dissolution de l'union/séparation.

³ Inclut manque d'accès/éloignement, trop cher et utilisation peu pratique

⁴ Les raisons de discontinuation sont mutuellement exclusives et leur somme correspond au total figurant dans cette colonne

⁵ Les épisodes d'utilisation compris dans cette colonne sont un sous-ensemble des épisodes de discontinuation compris dans le taux de discontinuation. On considère qu'une femme a changé de méthode si elle a utilisé une méthode différente au cours du mois suivant la discontinuation ou a déclaré, comme raison de discontinuation qu'elle « voulait une méthode plus efficace » et qu'elle a commencé à utiliser une autre méthode dans les deux mois après la discontinuation.

⁶ Le nombre d'épisodes d'utilisation comprend les épisodes d'utilisation qui ont été discontinués pendant la période d'observation ainsi que les épisodes d'utilisation qui n'ont pas été discontinués pendant la période d'observation

Tableau 7.10 Raisons de la discontinuation

Répartition (en %) des discontinuations des méthodes contraceptives au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par raison principale de discontinuation déclarée, selon la méthode spécifique, Données modèles DHS6

Raison	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	MAMA	Autre	Toutes les méthodes
Est tombée enceinte pendant l'utilisation	9,1	*	4,9	0,0	4,5	6,1	18,5	6,6
Voulait tomber enceinte	29,6	*	27,3	25,0	28,1	14,1	23,2	26,8
Mari/partenaire désapprouvait	3,5	*	1,4	5,1	7,7	40,8	3,0	5,2
Voulait une méthode plus efficace	19,9	*	7,5	0,5	21,7	2,5	21,3	12,7
Problèmes de santé/effets secondaires	24,2	*	48,5	60,0	5,0	3,6	13,6	33,5
Problème d'accès/trop loin	5,2	*	1,2	0,0	2,2	0,0	0,8	2,4
Coûte trop cher	0,1	*	1,2	3,0	4,0	0,0	0,0	1,1
Pas pratique à utiliser	2,1	*	1,3	4,4	14,8	0,0	2,6	3,1
Cela dépend de Dieu/ fataliste	0,0	*	0,2	0,0	0,0	15,2	0,0	0,9
Difficulté à tomber enceinte/ Ménopause	0,1	*	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2
Rapports sexuels peu fréquents/mari absent	1,3	*	3,0	0,0	1,0	9,3	10,9	2,7
Autre	0,1	*	1,1	0,0	0,0	0,0	2,6	0,6
Manquant	4,7	*	2,4	1,4	11,1	8,4	3,4	4,2
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de discontinuations	404	28	482	91	123	68	69	1 265

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.
MAMA = Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

Tableau 7.11 Connaissance de la période féconde

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par connaissance de la période féconde au cours du cycle menstruel, Données modèles DHS6

Connaissance de la période féconde	Toutes les femmes
Juste avant le début des règles	6,2
Durant les règles	2,4
Juste après la fin des règles	12,1
Au milieu du cycle/entre deux périodes de règles	28,2
Autre	0,5
Pas de moment spécifique	21,7
Ne sait pas	28,6
Manquant	0,3
Ensemble	100,0
Effectif de femmes	8 348

Tableau 7.12.1 Besoins et demande en matière de planification familiale des femmes actuellement en union

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage de celles dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale ¹			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle) ²			Demande totale en planification familiale ¹			Pourcentage de demande satisfaite ²	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³	Effectif de femmes
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
Âge												
15-19	30,5	1,1	31,6	6,7	0,0	6,7	37,1	1,1	38,3	17,4	17,4	339
20-24	24,0	1,9	25,9	13,6	1,0	14,6	37,6	2,9	40,5	36,0	34,4	782
25-29	23,4	3,0	26,4	14,4	1,5	15,9	37,8	4,5	42,3	37,5	36,3	1 133
30-34	14,1	8,9	23,0	15,3	6,0	21,3	29,4	14,9	44,3	48,1	45,9	964
35-39	14,2	12,4	26,6	10,7	12,9	23,6	24,9	25,3	50,2	47,1	42,2	937
40-44	4,1	18,9	23,0	4,7	15,3	20,0	8,8	34,2	42,9	46,5	41,9	551
45-49	3,5	15,9	19,4	1,9	10,7	12,6	5,3	26,6	31,9	39,4	30,1	566
Résidence												
Urbain	16,6	8,9	25,5	16,6	9,1	25,7	33,1	18,1	51,2	50,2	45,5	1 886
Rural	16,4	8,3	24,6	7,8	5,2	13,0	24,1	13,5	37,6	34,5	32,5	3 386
Région												
Région 1	15,5	8,6	24,1	8,1	4,6	12,7	23,6	13,2	36,8	34,5	31,4	1 984
Région 2	17,0	6,7	23,7	10,0	7,9	17,9	27,0	14,6	41,6	43,0	40,5	1 087
Région 3	16,1	10,1	26,2	17,2	8,5	25,7	33,3	18,6	51,9	49,5	44,0	1 072
Région 4	17,7	8,7	26,4	10,9	7,1	18,0	28,6	15,8	44,4	40,5	39,1	1 130
Niveau d'instruction												
Aucun	15,1	8,9	24,0	8,9	6,3	15,2	24,0	15,2	39,1	38,8	35,3	3 688
Primaire	19,4	8,1	27,5	11,8	6,5	18,3	31,2	14,6	45,8	40,0	39,4	693
Secondaire ou plus	19,8	7,3	27,1	18,6	8,1	26,6	38,4	15,3	53,7	49,6	45,6	891
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	17,6	7,8	25,4	7,6	5,7	13,3	25,3	13,5	38,7	34,4	31,0	1 115
Second	14,1	8,7	22,8	7,2	5,8	13,1	21,3	14,5	35,9	36,4	35,5	1 138
Moyen	17,1	8,4	25,5	9,2	5,1	14,3	26,4	13,5	39,8	36,0	33,7	1 101
Quatrième	19,0	7,4	26,4	14,9	7,8	22,7	33,9	15,2	49,1	46,2	42,4	986
Le plus élevé	14,3	10,6	24,8	17,2	9,1	26,4	31,5	19,7	51,2	51,5	46,5	933
Ensemble	16,4	8,5	25,0	10,9	6,6	17,5	27,4	15,1	42,5	41,3	38,1	5 273

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits décrite dans Bradley et al. 2012.

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

³ Les méthodes modernes comprennent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin et la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée.

Tableau 7.12.2 Besoins et demande en matière de planification familiale de l'ensemble des femmes et des femmes non en union sexuellement actives

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes non en union sexuellement actives de 15-49 ans ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage de celles dont les besoins sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfait, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale ¹			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale ¹¹			Pourcen- tage de demande satisfaite ²	Pourcen- tage de demande satisfaite par des méthodes modernes ³	Effectif de femmes
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
ENSEMBLE DES FEMMES												
Âge												
15-19	16,6	0,4	16,9	21,4	0,2	21,5	37,9	0,5	38,5	56,0	53,5	1 958
20-24	17,9	1,1	19,1	30,5	0,9	31,4	48,4	2,1	50,5	62,3	60,1	1 428
25-29	21,2	2,5	23,8	21,7	1,3	22,9	42,9	3,8	46,7	49,1	47,9	1 419
30-34	12,7	7,8	20,6	18,7	6,9	25,5	31,4	14,7	46,1	55,4	51,9	1 100
35-39	12,4	10,9	23,3	11,4	13,7	25,1	23,8	24,5	48,4	51,9	47,6	1 099
40-44	3,8	16,5	20,3	5,2	15,3	20,6	9,1	31,8	40,9	50,3	46,0	660
45-49	3,2	13,7	16,9	2,0	10,7	12,7	5,2	24,4	29,6	42,8	33,9	684
Résidence												
Urbain	13,1	4,7	17,8	26,4	6,4	32,8	39,5	11,1	50,6	64,9	60,7	3 766
Rural	15,6	6,4	21,9	11,9	4,2	16,1	27,4	10,6	38,0	42,4	40,5	4 582
Région												
Région 1	14,7	6,3	21,0	14,7	3,5	18,2	29,4	9,7	39,2	46,5	44,1	2 863
Région 2	15,3	4,7	19,9	16,6	6,1	22,7	31,9	10,8	42,6	53,3	50,4	1 610
Région 3	12,2	4,8	17,0	27,2	6,5	33,7	39,4	11,4	50,8	66,5	61,5	2 300
Région 4	16,4	6,5	22,9	14,3	5,5	19,8	30,7	12,0	42,7	46,4	45,1	1 574
Niveau d'instruction												
Aucun	14,3	7,7	21,9	10,3	6,4	16,7	24,6	14,1	38,6	43,2	39,9	4 397
Primaire	17,6	5,1	22,8	13,8	4,1	17,9	31,4	9,3	40,7	44,1	41,8	1 146
Secondaire ou plus	13,4	2,6	15,9	33,2	3,8	36,9	46,5	6,3	52,9	69,8	66,7	2 805
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	15,9	5,9	21,9	11,1	4,6	15,7	27,0	10,5	37,6	41,8	38,6	1 490
Second	14,4	7,0	21,5	11,1	4,8	15,9	25,5	11,8	37,4	42,5	41,6	1 503
Moyen	15,7	6,0	21,8	15,3	4,0	19,3	31,0	10,1	41,1	47,0	45,1	1 568
Quatrième	16,0	4,4	20,4	24,0	5,2	29,3	40,1	9,6	49,7	58,9	54,8	1 784
Le plus élevé	10,9	5,0	15,9	26,9	6,9	33,8	37,8	11,9	49,7	68,0	63,9	2 003
Ensemble	14,4	5,6	20,0	18,4	5,2	23,7	32,9	10,8	43,7	54,1	51,0	8 348
FEMMES NON EN UNION SEXUELLEMENT ACTIVES ⁴												
Âge												
15-19	39,4	0,5	39,8	53,2	0,6	53,8	92,5	1,1	93,6	57,4	55,2	453
20-24	17,8	0,2	18,0	66,5	0,7	67,2	84,3	0,9	85,2	78,9	75,9	327
25-29	16,4	0,9	17,3	68,8	0,6	69,4	85,2	1,5	86,7	80,0	79,0	155
30-34	6,0	0,6	6,6	60,1	18,6	78,7	66,1	19,2	85,3	92,3	79,8	72
35-39	(8,3)	(4,2)	(12,5)	(29,0)	(33,3)	(62,3)	(37,2)	(37,5)	(74,7)	(83,3)	(83,3)	47
40-44	(8,7)	(12,9)	(21,6)	(21,7)	(18,8)	(40,5)	(30,4)	(31,7)	(62,1)	(65,2)	(61,5)	35
45-49	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	24
Résidence												
Urbain	21,1	0,9	21,9	62,4	5,6	68,1	83,5	6,5	90,0	75,6	72,3	729
Rural	31,8	2,3	34,0	46,0	2,7	48,6	77,7	4,9	82,6	58,8	56,7	384
Région												
Région 1	31,1	2,5	33,6	53,4	1,0	54,4	84,4	3,6	88,0	61,8	60,9	299
Région 2	23,8	1,5	25,3	54,4	3,6	57,9	78,2	5,1	83,3	69,6	65,0	189
Région 3	18,1	0,4	18,5	64,1	7,3	71,4	82,1	7,7	89,9	79,4	75,0	489
Région 4	36,2	1,8	38,0	41,1	4,2	45,4	77,3	6,1	83,4	54,4	54,4	136
Niveau d'instruction												
Aucun	25,8	3,4	29,1	34,3	16,5	50,8	60,1	19,9	80,0	63,6	61,0	220
Primaire	41,4	1,7	43,1	43,7	1,0	44,7	85,1	2,7	87,8	50,9	44,6	144
Secondaire ou plus	21,2	0,7	21,9	65,9	1,8	67,7	87,1	2,5	89,6	75,5	73,1	749
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	30,9	1,7	32,7	44,7	1,9	46,6	75,6	3,6	79,3	58,8	55,8	105
Second	34,2	4,7	38,8	38,8	2,8	41,6	73,0	7,4	80,4	51,7	49,9	122
Moyen	28,5	1,1	29,6	54,6	3,2	57,8	83,1	4,3	87,4	66,1	64,3	155
Quatrième	25,9	1,2	27,1	61,7	2,4	64,2	87,6	3,6	91,2	70,3	65,8	331
Le plus élevé	17,9	0,5	18,4	62,1	8,2	70,3	80,0	8,7	88,7	79,3	77,0	400
Ensemble	24,7	1,4	26,1	56,8	4,6	61,4	81,5	6,0	87,5	70,2	67,2	1 113

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits décrite dans Bradley et al. 2012. Les valeurs entre

parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits

² Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale

³ Les méthodes modernes comprennent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin et la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée

⁴ Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 30 jours ayant précédé l'enquête

Tableau 7.13 Utilisation future de la contraception

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union qui n'utilisent pas actuellement de méthode par intention d'utiliser une méthode dans l'avenir, selon le nombre d'enfants vivants, Données modèles DHS6

Intention d'utiliser dans l'avenir	Nombre d'enfants vivants ¹					Ensemble
	0	1	2	3	4+	
A l'intention d'utiliser	37.7	52.9	52.7	50.6	45.7	48.8
Pas sûre	12.5	11.5	10.8	13.0	9.8	11.1
N'a pas l'intention d'utiliser	46.4	34.7	35.7	34.7	42.7	38.7
Manquant	3.4	0.9	0.7	1.7	1.7	1.5
Ensemble	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Effectif de femmes	256	706	899	825	1,661	4,348

¹ Y compris la grossesse actuelle.

Tableau 7.14 Exposition aux messages sur la planification familiale

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui, au cours des derniers mois ayant précédé l'enquête, ont, soit entendu à la radio, soit vu à la télévision, dans un journal ou un magazine, un message sur la planification familiale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Femme					Homme				
	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Aucun des trois médias	Effectif de femmes	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Aucun des trois médias	Effectif d'hommes
Âge										
15-19	56,8	10,5	3,8	42,5	1 958	47,2	12,3	7,5	51,1	771
20-24	59,4	17,0	5,6	39,6	1 428	61,6	15,1	13,5	36,7	523
25-29	55,3	12,1	4,6	44,2	1 419	58,1	12,7	10,8	41,5	502
30-34	58,2	12,1	3,2	41,6	1 100	60,1	9,3	8,9	38,9	397
35-39	55,6	9,7	3,1	43,9	1 099	63,0	9,8	8,5	36,5	485
40-44	55,0	13,7	2,8	44,7	660	57,9	8,5	9,3	41,9	332
45-49	56,2	8,8	4,6	43,8	684	58,1	8,1	9,7	40,9	290
Résidence										
Urbain	67,8	24,9	7,9	31,0	3 766	57,3	20,6	16,7	40,7	1 631
Rural	47,8	1,6	0,9	52,2	4 582	56,8	2,2	2,7	43,1	1 668
Région										
Région 1	52,6	4,1	1,7	47,3	2 863	60,4	4,9	5,0	39,3	1 058
Région 2	38,7	4,4	2,2	61,2	1 610	57,3	3,9	3,5	42,7	607
Région 3	74,4	34,0	9,7	23,9	2 300	53,2	25,9	19,8	43,9	1 023
Région 4	57,4	2,5	2,0	42,5	1 574	57,6	5,4	6,8	42,4	611
Niveau d'instruction										
Aucun	45,7	3,4	0,6	54,1	4 397	49,2	2,5	0,7	50,7	1 232
Primaire	56,7	7,0	2,1	42,8	1 146	55,1	8,7	1,2	44,0	396
Secondaire ou plus	74,3	27,8	10,3	24,5	2 805	63,3	18,4	18,2	35,0	1 672
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	40,4	0,8	0,4	59,6	1 490	48,9	0,3	0,4	51,1	549
Second	44,8	1,2	0,8	55,1	1 503	57,2	2,2	2,2	42,8	564
Moyen	53,4	3,0	1,0	46,6	1 568	62,5	2,7	3,1	37,5	583
Quatrième	64,4	7,6	2,5	35,1	1 784	59,1	10,0	8,6	39,9	679
Le plus élevé	74,0	39,9	13,0	24,2	2 003	56,8	29,9	24,5	40,2	925
Ensemble 15-49	56,8	12,1	4,1	42,6	8 348	57,1	11,3	9,6	41,9	3 299
50-59	na	na	na	na	na	61,1	10,6	10,1	38,7	322
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	57,4	11,3	9,7	41,6	3 621

na = Non applicable

Tableau 7.15 Contact des non utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale

Parmi les femmes de 15-49 ans qui n'utilisent pas de méthode contraceptive, pourcentage de celles qui, au cours des 12 derniers mois, a reçu la visite d'un agent de terrain qui leur a parlé de planification familiale, pourcentage qui a visité un établissement de santé et a parlé de planification familiale, pourcentage qui a visité un établissement de santé mais qui n'ont pas parlé de planification familiale et pourcentage qui n'ont ni discuté de planification familiale avec un agent de santé, ni dans un établissement de santé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont reçu la visite d'un agent de terrain qui a parlé de planification familiale	Pourcentage de femmes qui ont visité un établissement de santé au cours des 12 derniers mois et qui :		Pourcentage de femmes qui n'ont parlé de planification familiale, ni avec un agent de terrain, ni dans un établissement de santé	Effectif de femmes
		Ont parlé de planification familiale	N'ont pas parlé de planification familiale		
Âge					
15-19	19,3	17,6	12,7	72,5	1 537
20-24	24,8	35,7	18,7	57,2	979
25-29	27,4	39,2	21,9	53,2	1 094
30-34	28,8	38,8	17,1	52,6	819
35-39	26,5	32,4	15,2	58,4	823
40-44	23,8	22,3	17,3	66,6	525
45-49	20,8	17,9	18,0	68,9	597
Résidence					
Urbain	18,9	24,4	16,5	68,6	2 529
Rural	27,7	32,2	17,3	57,1	3 844
Région					
Région 1	31,6	34,0	15,5	52,8	2 342
Région 2	22,2	21,8	21,9	67,0	1 244
Région 3	13,1	20,1	17,1	75,6	1 524
Région 4	25,8	38,3	14,7	55,9	1 262
Niveau d'instruction					
Aucun	25,0	31,2	17,6	60,0	3 663
Primaire	25,7	29,5	18,5	59,9	941
Secondaire ou plus	21,7	24,6	14,7	65,9	1 770
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	25,3	30,6	16,6	60,7	1 256
Second	27,6	32,6	16,0	57,1	1 264
Moyen	31,1	33,0	17,6	54,3	1 265
Quatrième	23,7	31,4	16,0	60,2	1 262
Le plus élevé	13,8	18,6	18,5	75,2	1 326
Ensemble	24,2	29,1	17,0	61,6	6 373