PRÉVALENCE DU VIH

Tableau 14.1 Couverture du test du VIH par milieu de résidence et région

Répartition en (%) des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans éligibles pour le test du VIH par couverture du test, selon le milieu de résidence et la région (non pondéré), Données modèles DHS6

				Couvertu	re du test				_	
	DBS	Testé¹		ent de sang sé et :	prélèveme	moment du ent de sang t :	Autre/ma	anquant ²	_	
Résidence et région	Interviewé	Non interviewé	Interviewé	Non interviewé	Interviewé	Non interviewé	Interviewé	Non interviewé	Ensemble	Effectif
				FEN	MME 15-49					
Résidence										
Urbain	91,7	1,3	3,5	1,9	0,2	0,3	0,9	0,2	100,0	1 723
Rural	94,1	1,1	2,8	0,7	0,5	0,2	0,3	0,2	100,0	2 501
Région										
Région 1	95,9	0,8	1,5	0,6	0,2	0,1	0,7	0,1	100,0	1 624
Région 2	91,4	1,5	4,9	1,1	0,4	0,4	0,3	0,2	100,0	1 091
Région 3	89,9	1,5	4,2	2,7	0,1	0,5	0,8	0,3	100,0	741
Région 4	92,8	1,3	3,0	0,9	0,9	0,1	0,4	0,5	100,0	768
Ensemble	93,1	1,2	3,1	1,2	0,4	0,3	0,5	0,2	100,0	4 224
				НОІ	MME 15-59					
Résidence										
Urbain	85,5	0,9	7,7	1,9	0,7	1,3	1,3	0,7	100,0	1 602
Rural	92,7	0,8	3,9	1,3	0,6	0,3	0,3	0,0	100,0	2 149
Région										
Région 1	92,3	0,6	3,3	1,5	0,4	0,6	0,9	0,5	100,0	1 405
Région 2	90,1	0,9	7,0	0,9	0,4	0,5	0,1	0,1	100,0	927
Région 3	82,6	1,5	8,8	2,8	1,1	1,7	1,4	0,1	100,0	726
Région 4	90,8	0,9	4,8	1,2	0,9	0,4	0,7	0,4	100,0	693
Ensemble 15-49	89,5	0,9	5,6	1,5	0,7	0,7	0,7	0,3	100,0	3 623
Ensemble 15-59	89,6	0,9	5,5	1,5	0,6	0,7	0,7	0,3	100,0	3 751
			ENSE	BLE (FEMM	E 15-49 ET H	OMME 15-59	9)			
Résidence										
Urbain	88,7	1,1	5,6	1,9	0,4	0,8	1,1	0,5	100,0	3 325
Rural	93,5	1,0	3,3	0,9	0,6	0,3	0,3	0,2	100,0	4 650
Région										
Région 1	94,3	0,7	2,3	1,0	0,3	0,3	0,8	0,3	100,0	3 029
Région 2	90,8	1,2	5,8	1,0	0,4	0,4	0,2	0,1	100,0	2 018
Région 3	86,3	1,5	6,5	2,7	0,6	1,1	1,1	0,2	100,0	1 467
Région 4	91,9	1,1	3,8	1,0	0,9	0,3	0,5	0,5	100,0	1 461
Ensemble	91,5	1,0	4,3	1,3	0,5	0,5	0,6	0,3	100,0	7 975

¹ Y compris les prélèvements de sang séchés (Dried Blood Samples, ou « DBS ») testés au laboratoire et pour lesquels on dispose d'un résultat final, qu'il soit positif, négatif, ou indéterminé. Indéterminé signifie que le prélèvement est passé par tous les tests de l'algorithme mais que le résultat n'a pas été concluent.

qu'il soit positif, riégatif, ou indéterminé. Indéterminé signifie que le prélèvement est passe par tous les tests de l'aigontrime mais que le résultat n'a pas été concluant.

2 Y compris : 1) autres résultats de la collecte de sang (c.a.d. problèmes techniques sur le terrain), 2) échantillons perdus, 3) code barre qui ne correspondent pas et 4) autres résultats de laboratoire comme du sang non testé pour des raisons techniques, pas assez de sang pour compléter l'algorithme, etc.

Tableau 14.2 Couverture du test du VIH selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans éligibles pour le test du VIH par couverture du test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques (non pondéré), Données modèles DHS6

				Couvertu	re du test					
	DBS	Testé ¹		ent de sang sé et :	Absent au prélèveme	moment du ent de sang t:	Autre/ma	anguant ²		
Caractéristique sociodémographique	Interviewé	Non interviewé	Interviewé	Non	Interviewé	Non	Interviewé	Non interviewé	Total	Effectif
cooloadinograpinquo	intorviewe	ii itoi viowo	morviowo	FEMME		III.OI VIOWO	micriowe	intorviowo	rotai	Liiodiii
Âge										
15-19	93,5	0,9	2,8	0,9	0,5	0,3	0,5	0,5	100,0	975
20-24	92,0	1,0	3,4	2,3	0,3	0,3	0,6	0,1	100,0	699
25-29	93,9	1,2	3,4	0,6	0,3	0,0	0,4	0,1	100,0	677
30-34	93,7	1,7	2,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,0	100,0	591
35-39	92,7	1,5	3,6	0,9	0,3	0,2	0,5	0,3	100,0	588
40-44	90,0	1,8	3,3	2,7	0,6	0,3	0,9	0,3	100,0	331
45-49	95,3	0,3	2,8	0,8	0,3	0,0	0,6	0,0	100,0	363
Niveau d'instruction										
Aucun	93,1	1,4	3,1	1,1	0.4	0,2	0,5	0,2	100,0	2 349
Primaire	93,3	1,1	2,1	1,6	0,7	0,4	0,5	0,4	100,0	568
Secondaire ou plus	93,1	0,8	3,6	1,0	0,2	0,3	0,7	0,2	100,0	1 307
Quintile de bien-être économique										
	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	400.0	000
Le plus bas	93,3	0,9	3,6	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5	100,0	868
Second	94,0	1,4	3,4	0,4	0,4	0,0	0,5	0,0	100,0	812
Moyen	94,5	1,0	2,0	0,8	0,6	0,3	0,3	0,3	100,0	861
Quatrième	92,9	1,0	2,9	1,9	0,4	0,2	0,6	0,1	100,0	969
Le plus élevé	90,6	1,7	3,8	2,2	0,1	0,4	0,8	0,3	100,0	714
Ensemble	93,1	1,2	3,1	1,2	0,4	0,3	0,5	0,2	100,0	4 224
				HOMME	15-59					
Âge										
15-19	89,3	1,4	6,7	0.4	0,8	0,4	8,0	0,3	100,0	779
20-24	90,1	1,3	5,6	1,1	0,2	0,7	0,4	0,6	100,0	536
25-29	88,6	0,0	5,4	2,1	1,2	1,4	1,0	0,4	100,0	516
30-34	89,7	1,0	5, 4 5,7	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0	389
35-39	90,8			1,3	1,0					487
		0,4	4,9			0,4	1,0	0,2	100,0	
40-44	90,2	0,5	3,6	2,2	0,8	1,4	1,1	0,3	100,0	366
45-49	90,0	0,9	6,2	1,9	0,0	0,3	0,6	0,0	100,0	321
50-59	88,2	1,1	5,3	3,1	0,3	1,1	0,6	0,3	100,0	357
Niveau d'instruction										
Aucun	90,5	0,6	4,9	1,6	0,7	0,7	0,5	0,4	100,0	1 585
Primaire	88,5	1,4	6,8	0,7	0,7	0,5	1,4	0,2	100,0	444
Secondaire ou plus	89,0	1,0	5,8	1,7	0,6	0,9	0,8	0,2	100,0	1 722
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	91,2	0,9	5,4	0,9	0,7	0,7	0,3	0,0	100,0	760
Second	93,5	0,8	3,1	1,4	0,3	0,4	0,4	0,0	100,0	707
Moyen	92,6	0,7	3,8	1,2	0,3	0,4	0,5	0,4	100,0	731
Quatrième	86,4	0,5	6,9	1,6	0,9	1,0	1,7	1,0	100,0	810
Le plus élevé	84,8	1,5	8,2	2,4	1,1	1,2	0,7	0,1	100,0	743
Ensemble	89,6	0.9	5,5	1,5	0,6	0,7	0,7	0,3	100,0	3 751

¹ Y compris les prélèvements de sang séchés (Dried Blood Samples, ou « DBS ») testés au laboratoire et pour lesquels on dispose d'un résultat final, qu'il soit positif, négatif, ou indéterminé. Indéterminé signifie que le prélèvement est passé par tous les tests de l'algorithme mais que le résultat n'a pas été concluant.

² Y compris : 1) autres résultats de la collecte de sang (c.a.d. problèmes techniques sur le terrain), 2) échantillons perdus, 3) code barre qui ne correspondent pas et 4) autres résultats de laboratoire comme du sang non testé pour des raisons techniques, pas assez de sang pour compléter l'algorithme, etc.

Tableau 14.3 Prévalence du VIH par âge

Parmi les femmes de 15-49 ans et les hommes de 15-59 ans (population de fait) qui ont été interviewés et testés, pourcentage séropositif selon l'âge, Données modèles DHS6

	Femi	Femme		me	Ensemble		
Âge	Pourcentage VIH-positif	Effectif	Pourcentage VIH-positif	Effectif	Pourcentage VIH-positif	Effectif	
15-19	0,9	844	0,5	712	0,7	1 556	
20-24	1,2	680	1,2	489	1,2	1 169	
25-29	2,1	661	2,2	485	2,1	1 147	
30-34	4,1	549	4,8	390	4,4	939	
35-39	2,2	546	1,3	487	1,8	1 033	
40-44	1,3	303	1,3	346	1,3	649	
45-49	0,9	338	1,7	289	1,3	627	
50-59	na	na	1,0	326	na	na	
Ensemble 15-49	1,8	3 921	1,7	3 198	1,8	7 119	
Ensemble 15-59	na	na	1,6	3 524	na	na	

na = Non applicable

Tableau 14.4 Prévalence du VIH selon certaines caractéristiques socio-économiques

Pourcentage de VIH-positifs parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans testés selon certaines caractéristiques socio-économiques, Données modèles DHS6

	Femi	me	Hom	me	Ensemble		
Caractéristique socioéconomiques	Pourcentage VIH positif	Effectif	Pourcentage VIH positif	Effectif	Pourcentage VIH positif	Effectif	
•	p						
Ethnie Ethnie 1	2,5	832	1,6	670	2,1	1 502	
	2,5 1,6	1 236	1,1	926	2,1 1,4	2 162	
Ethnie 2							
Ethnie 3	1,7	233	3,2	190	2,4	423	
Ethnie 4	2,3	1 366	1,3	1 055	1,9	2 421	
Ethnie 5	0,0	244	1,6	187	0,7	431	
Autre	*	17	*	13	(0,0)	30	
Manquant	•	6	•	5	,	11	
Religion							
Religion 1	3,4	827	2,0	606	2,8	1 433	
Religion 2	1,6	3 079	1,3	2 428	1,5	5 507	
Religion 3	*	15	*	9	*	24	
Religion 4	*	1	*	0	*	1	
Aucune	*	1	*	1	*	2	
Emploi (12 derniers mois)							
Ne travaillait pas	1,9	1 063	0,8	592	1,5	1 655	
Travaillait	2,0	2 869	1,6	2 454	1,8	5 323	
Manquant	*	2	*	0	*	2	
Résidence							
Urbain	3,7	1 580	2,0	1 265	2,9	2 845	
Rural	0,8	2 354	1,1	1 781	0,9	4 135	
Région							
Région 1	1,6	1 558	0,8	1 156	1,3	2 714	
Région 2	1,5	997	1,1	761	1,3	1 758	
Région 3	3,8	666	3,6	561	3,7	1 227	
Région 4	1,8	713	1,2	568	1,6	1 281	
Niveau d'instruction							
Aucun	0,9	2 187	1,3	1 227	1,1	3 414	
Primaire	1,7	530	0,5	375	1,2	905	
Secondaire ou plus	4,0	1 217	1,8	1 444	2,8	2 661	
Quintile de bien-être							
économique							
Le plus bas	0,9	810	1,4	628	1,1	1 438	
Second	0,5	763	0,3	592	0,4	1 355	
Moyen	0,9	814	1,2	602	1,0	1 416	
Quatrième	2,3	900	1,7	631	2,1	1 531	
Le plus élevé	6,0	647	2,5	593	4,4	1 240	
Ensemble 15-49	2,0	3 934	1,4	3 046	1,7	6 980	
50-59	na	na	1,0	315	1,0	315	
Ensemble15-59	na	na	1,4	3 361	1,4	3 361	

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est bases sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. na = Non applicable

Tableau 14.5 Prévalence du VIH selon certaines caractéristiques démographiques

Pourcentage de VIH-positifs parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans testés, selon certaines caractéristiques démographiques, Données modèles DHS6

	Femi	me	Hom	me	Ensemble		
Caractéristique démographique	Pourcentage VIH positif	Effectif	Pourcentage VIH positif	Effectif	Pourcentage VIH positif	Effectif	
État matrimonial							
Célibataire	1,4	1 088	1,2	1 304	1,3	2 392	
A déjà eu des rapports sexuels	1,6	748	1,1	852	1.2	1 600	
N'a jamais eu de rapports	1,0	740	1,1	002	1,3	1 600	
sexuels	0,9	340	1,3	452	1,1	792	
En union	2,1	2 609	1,8	1 650	1,9	4 259	
Divorcé ou séparé	5,5	127	0,0	85	3,3	212	
Veuf	1,8	110	*	7	1,7	117	
Type d'union							
En union polygame	1,6	933	1,8	330	1,7	1 263	
En union non polygame Non en union actuellement	2,4 1,8	1 637 1 325	1,7 1,1	1 320 1 396	2,1 1,4	2 957 2 721	
NSP/manquant	(0,0)	39	*	0	(0,0)	39	
Nombre de fois que l'enquêté a dormi ailleurs qu'à la maison au cours des 12 derniers mois	, , ,			-	, , ,		
Aucune	1,6	2 356	1,4	1 501	1,5	3 857	
1-2 3-4	2,6 2,2	768 447	1,7 1,0	466 409	2,3 1,6	1 234 856	
3-4 5+	2,2 2,5	361	1,6	409 668	1,6	1 029	
Manquant	*	2	*	2	*	4	
Temps passé ailleurs au cours des 12 derniers mois Ailleurs pendant plus d'un mois Ailleurs pendant moins d'1 mois Pas ailleurs Manquant	2,8 2,2 1,6	632 941 2 356 5	1,1 1,9 1,4	814 729 1 501 2	1,9 2,1 1,5 *	1 446 1 670 3 857 7	
Actuellement enceinte							
Enceinte	2,5	363	na	na	na	na	
Non enceinte ou pas sûre	1,9	3 571	na	na	na	na	
Soins prénatals pour la dernière naissance des 3 dernières années Soins prénatals dans un établissement du secteur							
public Soins prénatals dans un établissement de santé autre	1,4	1 462	na	na	na	na	
que le secteur public Pas de soins prénatals/pas de naissances dans les 3 dernières	(0,0)	46	na	na	na	na	
années	2,4	2 416	na	na	na	na	
Manquant	_, · *	10	na	na	na	na	
Circoncision							
Circoncis	na	na	1,5	3 026	na	na	
Non circoncis	na	na	*	14	na	na	
NSP/Manquant	na	na	*	6	na	na	
Ensemble 15-49	2,0	3 934	1,4	3 046	1,7	6 980	
50-59	na	na	1,0	315	na	na	
Ensemble 15-59	na	na	1,4	3 361	na	na	

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est bases sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée na = Non applicable

Tableau 14.6 Prévalence du VIH selon certaines caractéristiques du comportement sexuel

Pourcentage de VIH-positifs parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans testés pour le VIH et qui ont déjà eu des rapports sexuels, selon certaines caractéristiques du comportement sexuel, Données modèles DHS6

	Femi	me	Hom	me	Ensemble		
Caractéristique du comportement sexuel	Pourcentage VIH-positif	Effectif	Pourcentage VIH-positif	Effectif	Pourcentage VIH-positif	Effectif	
Âge aux premiers rapports							
sexuels							
<16	2,1	1 634	2,1	673	2,1	2 307	
16-17	1,5	956	1,7	743	1,6	1 699	
18-19	3.4	473	0,8	626	1,9	1 099	
20+	2,2	184	1,2	516	1,4	700	
Manquant	1,7	344	(0,0)	36	1,6	380	
Partenaires sexuels multiples et partenaires concomitants au cours des 12 derniers mois							
	4.0	504	4.0	400	4.0	000	
0	1,9	524	1,8	166	1,9	690	
1	2,1	2 830	1,1	1 658	1,8	4 488	
2+	2,2	225	2,1	768	2,1	993	
A eu des partenaires							
concomitants1	2,1	144	2,3	476	2,3	620	
Aucun des partenaires n'était							
concomitant	2,5	81	1,7	292	1,9	373	
Manquant	*	12	*	2	*	14	
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels des 12 derniers mois A utilisé un condom N'a pas utilisé de condom Pas de rapports sexuels dans les 12 derniers mois NSP/Manquant	1,1 2,2 1,9 *	92 2 958 536 5	1,8 1,4 1,8 *	220 2 201 168 5	1,6 1,8 1,8 *	312 5 159 704 10	
Nombre de partenaires							
sexuels sur la durée de vie							
1	1,1	1 125	0,0	311	0,8	1 436	
2	1,7	1 053	0,5	366	1,4	1 419	
3-4	2,8	998	1,2	603	2,2	1 601	
5-9	4,8	311	2,7	519	3,5	830	
10+	*	23	1,2	414	1,1	437	
Manquant	2,5	81	2,6	381	2,6	462	
Rapports sexuels payants dans les 12 derniers mois				400			
Oui	na	na	0,9	109	na	na	
A utilisé un condom	na	na	(0,0)	47	na	na	
N'a pas utilisé de condom Non (pas de rapports sexuels payants /pas de rapports sexuels dans les 12 derniers	na	na	1,6	62	na	na	
mois)	na	na	1,5	2 485	na	na	
Ensemble 15-49	2,1	3 591	1,5	2 594	1,8	6 185	
50-59	na	na	1,0	313	na	na	
Ensemble 15-59	na	na	1,4	2 907	na	na	

Note: Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est bases sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. na = Non applicable

[&]quot;Un enquêté est considéré comme ayant eu des partenaires concomitants si, il ou elle, a eu des rapports sexuels avec 2 personnes ou plus au cours de périodes qui se chevauchent durant les 12 derniers mois. (Les enquêtés avec des partenaires concomitants comprennent les hommes polygames qui ont eu des rapports sexuels avec au moins deux de leurs épouses au cours de périodes qui se chevauchent).

Tableau 14.7 Prévalence du VIH parmi les jeunes selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de VIH-positifs parmi les femmes et les hommes de 15-24 ans ayant été testés pour le VIH, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

	Femi	me	Hom	me	Ensemble		
Caractéristique	Pourcentage		Pourcentage		Pourcentage		
sociodémographique	VIH positif	Effectif	VIH positif	Effectif	VIH positif	Effectif	
Âge							
15-19	1,2	912	0,9	696	1,1	1 608	
15-17	0,8	524	1,4	441	1,0	965	
18-19	1,8	388	0.0	255	1,1	643	
20-24	1,4	643	1,0	483	1,2	1 126	
20-22	1,4	441	0,6	335	1,0	776	
23-24	1,5	202	2,0	148	1,7	350	
	1,0		_,-		.,.		
Célibataire A déjà eu des rapports							
sexuels	1,4	958	0,9	1 055	1,1	2 013	
N'a jamais eu de rapports	1,4	930	0,9	1 000	1,1	2013	
sexuels	1,6	619	0.5	616	1,1	1 235	
En union	0,9	339	0,5 1,4	439	1,1	778	
Divorcé ou séparé		574	1,4	113	1,3	687	
Veuf	1,2	23	1,0	113	(0,0)	34	
		23		11	(0,0)	34	
Actuellement enceinte							
Enceinte	1,3	151	na	na	na	na	
Non enceinte ou pas sûre	1,3	1 404	na	na	na	na	
Résidence							
Urbain	2,0	737	1,2	595	1,7	1 332	
Rural	0,6	818	0,7	584	0,6	1 402	
Région							
Région 1	1,2	597	0,7	460	0,9	1 057	
Région 2	1,3	391	0,4	267	0,9	658	
Région 3	1,6	317	1,9	261	1,7	578	
Région 4	1,2	250	1,0	191	1,1	441	
Niveau d'instruction							
Aucun	0,7	418	0.0	215	0,5	633	
Primaire	1,1	280	0,0	158	0,7	438	
Secondaire ou plus	1,6	857	1,4	806	1,5	1 663	
Quintile de bien-être	•		,		,		
économique							
Le plus bas	0,4	284	1,0	208	0.6	492	
Second	0,8	252	0,0	184	0,5	436	
Moyen	1,0	291	1,0	209	1,0	500	
Quatrième	1,0	421	1,4	277	1,1	698	
Le plus élevé	3,3	307	1,0	301	2,1	608	
•							
Ensemble	1,3	1 555	0,9	1 179	1,1	2 734	

Note: Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est bases sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. na = Non applicable

Tableau 14.8 Prévalence du VIH parmi les jeunes selon certaines caractéristiques du comportement sexuel

Pourcentage de VIH-positifs parmi les femmes et les hommes de 15-24 ans testés pour le VIH et qui ont déjà eu des rapports sexuels, selon certaines caractéristiques du comportement sexuel, Données modèles DHS6

	Femi	me	Homr	ne	Ensemble		
Caractéristique du comportement sexuel	Pourcentage VIH positif	Effectif	Pourcentage VIH positif	Effectif	Pourcentage VIH positif	Effectif	
Partenaires sexuels multiples et partenaires concomitants au cours des 12 derniers mois							
0	1,4	148	0,0	53	1,0	201	
1	1,4	969	0,0	500	1,0	1 469	
2+	1,1	89	2,7	185	2,2	274	
A eu des partenaires concomitants ¹ Aucun des partenaires n'était	0,0	55	1,1	94	0,7	149	
concomitant A eu des partenaires concomitants ¹	(2,9)	34	4,4	91	4,0	125	
Manquant	*	8	*	2	*	10	
Utilisation du condom aux derniers rapports sexuels des 12 derniers mois							
A utilisé un condom	(0,0)	39	0,9	106	0,7	145	
N'a pas utilisé de condom Pas de rapports sexuels dans les 12	1,5	1 017	0,7	579	1,2	1 596	
derniers mois	1,3	156	0,0	55	0,9	211	
NSP/Manquant	*	2	*	0	*	2	
Ensemble	1,4	1 214	0,7	740	1,1	1 954	

Note: Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est bases sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. na = Non applicable

¹ Un enquêté est considéré comme ayant eu des partenaires concomitants si, il ou elle, a eu des rapports sexuels avec 2 personnes ou plus au cours de périodes qui se chevauchent durant les 12 derniers mois. (Les enquêtés avec des partenaires concomitants comprennent les hommes polygames qui ont eu des rapports sexuels avec au moins deux de leurs épouses au cours de périodes qui se chevauchent).

Tableau 14.9 Prévalence du VIH selon d'autres caractéristiques

Pourcentage de VIH-positifs parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans qui ont été testés pour le VIH et qui ont déjà eu des rapports sexuels, selon qu'ils ont eu, ou non une IST au cours des 12 derniers mois et selon qu'ils ont été testés, ou non, précédemment pour le VIH, Données modèles DHS6

	Fem	me	Hom	me	Ensemble	
Caractéristique	Pourcentage VIH-positif	Effectif	Pourcentage VIH-positif	Effectif	Pourcentage VIH-positif	Effectif
Infection sexuellement transmissible dans les 12 derniers mois						
A eu IST ou des symptômes d'IST	3,0	813	1,9	360	2,6	1 173
Pas d'IST, pas de symptôme	1,9	2 735	1,4	2 213	1,7	4 948
NSP/Manquant	(0,0)	43	*	21	0,0	64
Test du VIH précédent						
Déjà testé	2,4	1 936	1,2	515	2,2	2 451
A reçu les résultats	2,6	1 434	1,0	406	2,3	1 840
N'a pas reçu les résultats	1,8	502	1,8	109	1,8	611
Jamais testé	1,7	1 623	1,5	2 079	1,6	3 702
Manquant	(0,0)	32	*	0	(0,0)	32
Ensemble 15-49	2,1	3 591	1,5	2 594	1,8	6 185

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est bases sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. na = Non applicable

Tableau 14.10 Test du VIH antérieur à l'enquête et statut sérologique actuel

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans qui ont été testés positifs et qui ont été testés négatifs selon le test du VIH antérieur à l'enquête, Données modèles DHS6

	Fen	Femme		mme	Ensemble		
Test du VIH antérieur à l'enquête	VIH-positif	VIH-négatif	VIH-positif	VIH-négatif	VIH-positif	VIH-négatif	
Déjà testé pour le VIH							
A reçu les résultats du dernier test	47,4	35,9	(11,4)	13,8	34,4	26,2	
N'a pas reçu le résultat du dernier test	12,8	13,7	(4,5)	4,2	9,8	9,6	
Pas de test antérieur	39,7	49,5	(84,1)	82,0	55,7	63,7	
Manquant	0,0	0,8	(0,0)	0,0	0,0	0,5	
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Effectif	78	3 856	44	3 002	122	6 858	

Note: Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Tableau 14.11 Prévalence du VIH selon la circoncision

Parmi les hommes de 15-49 ans qui ont été testés pour le VIH, pourcentage VIH-positifs par statut vis-à-vis de la circoncision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Données modèles DHS6

	Circor	ncis
Caractéristique	Pourcentage VIH-	=""
sociodémographique	positif	Effectif
Âge		
15-19	0,9	686
20-24	1,0	480
25-29	1,8	455
30-34	2,6	348
35-39	1,1	441
40-44 45-49	1,8 1,7	328 288
	1,7	200
Religion		
Religion 1	2,0	601
Religion 2	1,3	2 413
Religion 3	*	9
Aucune	r	1
Ethnie		
Ethnie 1	1,7	663
Ethnie 2	1,1	916
Ethnie 3	3,2	190
Ethnie 4	1,3	1 053
Ethnie 5	1,6	186
Autre	*	13 5
Manquant		5
Résidence		
Urbain	2,0	1 261
Rural	1,1	1 765
Région		
Région 1	0,8	1 147
Région 2	1,1	752
Région 3	3,6	561
Région 4	1,2	566
Niveau d'instruction		
Aucun	1,3	1 217
Primaire	0,5	370
Secondaire ou plus	1,8	1 439
Quintile de bien-		
être économique		
Le plus bas ·	1,5	618
Second	0,3	588
Moyen	1,2	598
Quatrième	1,7	631
Le plus élevé	2,5	591
Ensemble 15-49	1,5	3 026
50-59	1,0	313
Ensemble 15-59	1,4	3 339
	,	

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est bases sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

.

Tableau 14.12 Prévalence du VIH parmi les couples

Répartition (en %) des couples vivant dans le même ménage, dont les deux conjoints ont été testés pour le VIH, par statut sérologique, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Les deux VIH-positifs	Homme VIH- positif, femme VIH- négative	Femme VIH- positive, homme VIH- négatif	Les deux VIH-négatifs	L'un ou l'autre indéterminé	Total	Effectif
Âge de la femme							
15-19	0,0	2,2	0,7	97,0	0,0	100,0	135
20-29	0,3	2,0	1,4	96,3	0,0	100,0	654
30-39	0,1	0,7	2,4	96,8	0,0	100,0	680
40-49	0,0	0,7	0,7	98,5	0,0	100,0	271
Âge de l'homme	*	*	*	*	*	400.0	4
15-19 20-29	0.4	1,8	1,8	96,1	0,0	100,0 100,0	4 280
30-39	0,4	0,9	1,9	96,9	0,0	100,0	641
40-49	0,0	1,8	1,6	96,6	0,0	100,0	555
50-59	0,0	0,8	0,8	98,5	0,0	100,0	260
Écart d'âge entre les partenaires							
Femme plus âgée	1,0	0,0	3,1	95,9	0,0	100,0	97
Même âge/homme plus âgé de 0-4 ans	0,0	1,1	0,9	98,0	0,0	100,0	455
Homme plus âgé de 5-9 ans	0,4	1,5	2,0	96,2	0,0	100,0	547
Homme plus âgé de 10-14 ans	0,0	0,8	2,1	97,1	0,0	100,0	378
Homme plus âgé de 15 ans+	0,0	2,7	0,8	96,6	0,0	100,0	263
Type d'union	0,2	1.2	1.7	06.9	0.0	100.0	1 150
Non polygame Polygame	0,2 0,2	1,3 1,4	1,7 1,4	96,8 97,0	0,0 0,0	100,0 100,0	1 150 567
NSP/Manquant	*	*	*	97,0	*	100,0	23
Partenaires multiples dans les 12 derniers mois¹							
Les deux, aucun	0,2	1,1	1,8	96,9	0,0	100,0	1 057
Homme oui, femme non	0,2	1,6	1,5	96,7	0,0	100,0	610
Femme oui, homme non	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(100,0)	(0,0)	100,0	38
Les deux oui	(0,0)	(3,4)	(0,0)	(96,6)	(0,0)	100,0	29
L'un ou l'autre manquant	*	*	*	*	*	100,0	6
Partenaires concomitants dans les 12 derniers							
mois ²	0,2	1,1	1,6	97,2	0,0	100,0	1 280
Les deux, aucun Homme oui, femme non	0,2	1,1	1,9	97,2 95,9	0,0	100,0	418
Femme oui, homme non	*	*	*	*	*	100,0	23
Les deux oui	*	*	*	*	*	100,0	19
Résidence							
Urbain	0,4	2,4	4,3	92,9	0,0	100,0	506
Rural	0,1	0,9	0,5	98,5	0,0	100,0	1 234
Région							
Région 1	0,1	0,8	0,8	98,3	0,0	100,0	747
Région 2	0,0	1,1	0,7	98,2	0,0	100,0	446
Région 3 Région 4	0,9 0,0	4,1 0,9	5,9 1,8	89,1 97,2	0,0 0,0	100,0 100,0	220 327
<u> </u>	0,0	0,9	1,0	91,2	0,0	100,0	321
Niveau d'instruction de la femme	0.4	4.0	0.6	00.4	0.0	100.0	4 222
Aucun Primaire	0,1 0,0	1,2 1,8	0,6 1,3	98,1 96,9	0,0 0,0	100,0 100,0	1 232 228
Secondaire ou plus	0,0	1,4	6,4	91,4	0,0	100,0	280
Niveau d'instruction de l'homme	-,	,	-,	,	,-	- / -	
Aucun	0,0	1,2	0,5	98,4	0,0	100,0	1 043
Primaire	0,0	0,5	1,1	98,4	0,0	100,0	190
Secondaire ou plus	0,6	2,0	4,1	93,3	0,0	100,0	507
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	0,0	0,7	0,2	99,0	0,0	100,0	416
Second	0,2	0,2	0,2	99,3	0,0	100,0	423
Moyen Quatrième	0,0 0,3	1,8 1,0	0,8 2,6	97,5 96,1	0,0 0,0	100,0 100,0	395 306
Le plus élevé	0,3 0,5	1,0 4,5	∠,6 7,5	96, 1 87,5	0,0	100,0	200
'							
Ensemble	0,2	1,3	1,6	96,9	0,0	100,0	1 740

Note: Le tableau est basé sur les couples pour lesquels on dispose d'un résultat valable au test du VIH (positif ou négatif) pour les deux conjoints. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basé sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée

supprimée.

1 Un enquêté est considéré comme ayant eu des partenaires multiples au cours des 12 derniers mois si, il ou elle, a eu des rapports sexuels avec deux personnes ou plus au cours de cette période. (Les enquêtés avec des partenaires multiples comprennent les hommes polygames qui ont eu des rapports sexuels avec, au moins, deux de leurs épouses.)

2 Un enquêté est considéré comme ayant eu des partenaires concomitants si, il ou elle, a eu des rapports sexuels avec 2 personnes ou plus au cours de

² Un enquêté est considéré comme ayant eu des partenaires concomitants si, il ou elle, a eu des rapports sexuels avec 2 personnes ou plus au cours de périodes qui se chevauchent durant les 12 derniers mois. (Les enquêtés avec des partenaires concomitants comprennent les hommes polygames qui ont eu des rapports sexuels avec au moins deux de leurs épouses au cours de périodes qui se chevauchent).