

PALUDISME

Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire (traitée ou non traitée) et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII); et une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA); nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage; et pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire, une MII ou une MIILDA pour 2 personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, selon certaines caractéristiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémogra- phique	Pourcentage de ménages avec au moins une moustiquaire			Nombre moyen de moustiquaires par ménage			Effectif de ménages	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour 2 personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage 1			Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit avant l'interview dans le ménage
	Une moustiqua- ire quelcon- que	Une moustiquai- re imprégnée d'insecti- cide (MII)2	Une moustiquai- re imprégnée d'insec- ticide à longue durée d'action (MIILDA)	Une mousti- quaire quelcon- que	Une moustiquai- re imprégnée d'insecti- cide (MII)2	Une moustiquai- re imprégnée d'insec- ticide à longue durée d'action (MIILDA)		Une mousti- quaire quelcon- que	Une moustiquai- re imprégnée d'insecti- cide (MII)2	Une moustiquai- re imprégnée d'insec- ticide à longue durée d'action (MIILDA)	
Résidence											
Urbain	55,8	55,0	54,9	1,0	1,0	0,9	2 555	14,9	14,5	14,5	2 551
Rural	67,9	67,3	67,3	1,2	1,2	1,2	3 735	15,1	14,9	14,9	3 725
Région											
Région 1	65,7	65,6	65,5	1,2	1,2	1,2	2 106	12,2	12,2	12,1	2 103
Région 2	77,6	76,0	76,0	1,5	1,4	1,4	1 331	20,9	20,1	20,1	1 324
Région 3	45,7	44,9	44,8	0,8	0,7	0,7	1 501	14,1	13,6	13,6	1 497
Région 4	63,6	63,1	63,0	1,1	1,1	1,1	1 352	14,9	14,7	14,7	1 352
Quintile de bien- être économique											
Le plus bas	62,6	61,6	61,6	1,1	1,1	1,1	1 359	17,1	16,9	16,9	1 356
Second	66,9	66,6	66,6	1,2	1,2	1,2	1 252	14,6	14,5	14,4	1 249
Moyen	69,1	68,6	68,6	1,3	1,3	1,3	1 214	13,5	13,2	13,2	1 209
Quatrième	63,1	62,7	62,4	1,2	1,1	1,1	1 216	14,2	14,0	14,0	1 216
Le plus élevé	53,5	52,4	52,3	1,0	0,9	0,9	1 249	15,5	14,9	14,9	1 245
Ensemble	63,0	62,3	62,3	1,1	1,1	1,1	6 290	15,0	14,7	14,7	6 276

¹ Population de fait des ménages

² Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire prétraitée obtenue il y a moins de 12 mois ou (3) une moustiquaire qui a été imprégnée avec un insecticide au cours des 12 derniers mois.

Tableau 12.2 Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide résiduel contre les moustiques

Pourcentage de ménages dont les murs intérieurs du logement ont été pulvérisés avec un insecticide contre les moustiques dans les 12 derniers mois (PID), pourcentage de ménages avec au moins une MII et une PID dans les 12 derniers mois et pourcentage de ménages avec au moins une MII pour 2 personnes et/ou une PID au cours des 12 derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de ménages avec PID ¹ dans les 12 derniers mois	Pourcentage de ménages avec au moins une MII ² et/ou une PID dans les 12 derniers mois	Pourcentage de ménages avec au moins une MII ² pour 2 personnes et/ou une PID dans les 12 derniers mois	Effectif de ménages
Résidence				
Urbain	7,2	58,2	20,3	2 555
Rural	6,1	68,6	20,1	3 735
Région				
Région 1	5,7	67,7	17,6	2 106
Région 2	8,7	76,4	27,3	1 331
Région 3	10,1	49,7	21,4	1 501
Région 4	1,7	63,5	16,0	1 352
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	5,1	62,3	20,8	1 359
Second	6,7	68,2	20,6	1 252
Moyen	4,9	70,1	17,4	1 214
Quatrième	7,0	65,0	20,4	1 216
Le plus élevé	9,0	56,5	21,6	1 249
Ensemble	6,5	64,4	20,2	6 290

¹ La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide (PID) est limitée à la pulvérisation effectuée par quelqu'un d'une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.

² Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire prétraitee obtenue il y a moins de 12 mois ou (3) une moustiquaire qui a été imprégnée avec un insecticide au cours des 12 derniers mois

Tableau 12.3 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par nombre de MII que possède le ménage et pourcentage ayant accès à une MII, selon le nombre de personnes qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview, Données modèles DHS6

Nombre de MII	Nombre de personnes qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8+	
0	50,0	47,9	41,2	36,4	40,1	35,1	32,0	34,2	35,9
1	43,7	44,5	40,4	40,2	29,5	27,0	20,2	16,0	24,6
2	5,8	5,8	15,2	17,5	20,4	22,5	26,1	17,9	19,5
3	0,6	1,8	3,2	5,9	9,6	14,9	21,3	27,6	18,2
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	1,6	0,8
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	0,6
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,5
7+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	296	708	1 955	3 705	5 205	5 195	5 024	14 522	36 610
Pourcentage de la population de fait ayant accès à une MII ¹	50,0	52,1	45,3	43,5	38,1	39,4	39,3	30,0	36,5

¹ Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par 2 personnes au maximum

Tableau 12.4 Utilisation des moustiquaires par la population des ménages

Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit avant l'interview, a dormi sous une moustiquaire (traitée ou non), pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII), sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA), et pourcentage ayant dormi sous une MII ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide contre les moustiques (PID) dans les 12 derniers mois; et parmi la population de fait des ménages avec au moins une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Population des ménages					Population des ménages avec au moins une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) ² dans les 12 derniers mois	Effectif	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit dernière	Effectif
Âge (en années)							
<5	47,7	47,3	47,2	50,8	6 004	71,9	3 945
5-14	31,6	31,3	31,2	36,0	10 580	48,1	6 879
15-34	36,5	36,1	36,1	41,1	11 002	58,4	6 801
35-39	52,7	51,9	51,8	55,1	4 933	81,0	3 162
50+	50,7	50,1	50,0	52,9	4 078	76,0	2 687
NSP/Manquant	*	*	*	*	13	*	5
Sexe							
Masculin	38,5	38,1	38,0	42,7	17 640	59,4	11 306
Féminin	42,7	42,2	42,2	46,0	18 970	65,8	12 174
Résidence							
Urbain	32,2	31,7	31,6	37,4	14 615	55,4	8 359
Rural	46,3	45,9	45,8	49,0	21 995	66,7	15 121
Région							
Région 1	42,4	42,3	42,3	45,7	13 282	63,6	8 838
Région 2	55,1	53,9	53,9	58,0	7 545	68,5	5 934
Région 3	23,1	22,6	22,5	31,1	8 201	48,0	3 858
Région 4	42,3	42,0	41,9	43,0	7 581	65,6	4 849
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	43,7	43,1	43,1	45,5	7 318	69,5	4 537
Second	45,3	45,0	45,0	48,7	7 322	65,4	5 031
Moyen	46,1	45,8	45,8	49,5	7 350	65,1	5 175
Quatrième	40,2	39,7	39,5	44,3	7 304	62,1	4 669
Le plus élevé	28,0	27,5	27,4	34,0	7 316	49,4	4 067
Ensemble	40,7	40,2	40,2	44,4	36 610	62,7	23 479

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire prétraitée obtenue il y a moins de 12 mois ou (3) une moustiquaire qui a été imprégnée avec un insecticide au cours des 12 derniers mois

² La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide (PID) est limitée à la pulvérisation effectuée par quelqu'un d'une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.

Tableau 12.5 Utilisation des MII existantes

Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) qui ont été utilisées par une personne la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de MII ¹ existantes utilisées la nuit dernière	Effectif de MII ¹
Résidence		
Urbain	84,6	2 431
Rural	94,8	4 602
Région		
Région 1	95,8	2 555
Région 2	94,0	1 893
Région 3	76,0	1 096
Région 4	91,4	1 488
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	94,4	1 453
Second	94,9	1 504
Moyen	94,4	1 540
Quatrième	90,0	1 385
Le plus élevé	80,1	1 151
Ensemble	91,3	7 033

¹ Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire prétraitée obtenue il y a moins de 12 mois ou (3) une moustiquaire qui a été imprégnée avec un insecticide au cours des 12 derniers mois

Tableau 12.6 Utilisation des moustiquaires par les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non), pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII), et pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA) la nuit avant l'interview, et pourcentage ayant dormi sous une MII ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) contre les moustiques dans les 12 derniers mois; et parmi les enfants de moins de 5 ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages					Enfants de moins de 5 ans dans les ménages avec au moins une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit avant l'interview	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA la nuit avant l'interview	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview ou dans un logement dont les murs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) ² contre les moustiques dans les 12 derniers mois	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview	Effectif d'enfants
Âge (en mois)							
<12	49,3	49,0	48,9	53,6	1 248	73,8	828
12-23	50,9	50,6	50,6	53,4	1 088	76,6	718
24-35	49,1	48,6	48,6	51,3	1 121	75,3	724
36-47	47,5	46,8	46,7	50,8	1 308	69,9	876
48-59	42,3	41,8	41,8	45,3	1 238	64,8	798
Sexe							
Masculin	47,2	46,8	46,7	50,7	2 984	71,0	1 967
Féminin	48,2	47,7	47,7	50,9	3 019	72,9	1 979
Résidence							
Urbain	39,2	38,5	38,4	42,6	1 915	67,3	1 095
Rural	51,7	51,4	51,3	54,6	4 089	73,7	2 850
Région							
Région 1	48,6	48,5	48,4	51,2	2 344	72,1	1 576
Région 2	61,5	60,5	60,5	65,3	1 353	74,1	1 104
Région 3	26,7	26,0	26,0	32,9	1 005	58,2	448
Région 4	48,1	47,8	47,7	49,0	1 302	76,3	817
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	49,1	48,7	48,7	50,9	1 441	77,1	911
Second	50,6	50,2	50,2	53,4	1 320	73,6	900
Moyen	52,9	52,7	52,7	56,0	1 265	73,6	906
Quatrième	46,4	46,0	45,7	51,3	1 156	69,2	768
Le plus élevé	34,6	33,4	33,4	37,8	822	59,8	460
Ensemble	47,7	47,3	47,2	50,8	6 004	71,9	3 945

Note : Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.

¹ Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ou (2) une moustiquaire prétraitée obtenue il y a moins de 12 mois ou (3) une moustiquaire qui a été imprégnée avec un insecticide au cours des 12 derniers mois.

² La pulvérisation intradomestique d'insecticide (PID) est limitée à la pulvérisation effectuée par quelqu'un d'une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.

Tableau 12.7 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes

Pourcentage de femmes enceintes qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non), pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII), et pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA) la nuit avant l'interview, et pourcentage ayant dormi sous une MII ou dans un logement dont les murs intérieurs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) contre les moustiques dans les 12 derniers mois; et parmi les femmes enceintes des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes enceintes de 15-49 ans dans tous les ménages					Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans les ménages avec au moins une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) la nuit avant l'interview	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA la nuit avant l'interview	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview ou dans un logement dont les murs ont été pulvérisés d'insecticide (PID) ² contre les moustiques dans les 12 derniers mois	Effectif de femmes enceintes	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview	Effectif de femmes enceintes
Résidence							
Urbain	41,0	40,2	40,2	43,2	247	65,4	152
Rural	56,1	55,7	55,5	57,5	483	82,2	328
Région							
Région 1	53,1	52,7	52,3	55,1	302	79,2	201
Région 2	66,0	65,2	65,2	67,4	138	82,1	110
Région 3	25,6	25,6	25,6	29,9	134	47,7	72
Région 4	55,3	54,4	54,4	54,5	157	87,7	97
Niveau d'instruction							
Aucun	56,0	55,3	55,0	57,5	455	83,0	303
Primaire	52,0	52,0	52,0	53,5	101	74,5	71
Secondaire ou plus	37,3	37,0	37,0	39,6	175	60,8	106
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	56,1	55,8	55,8	56,3	181	85,0	119
Second	60,1	60,1	60,1	64,6	158	82,1	116
Moyen	53,8	53,8	53,8	55,5	148	81,6	98
Quatrième	49,9	48,5	47,6	51,1	138	78,2	86
Le plus élevé	26,1	24,8	24,8	26,9	106	42,1	62
Ensemble	51,0	50,5	50,3	52,7	731	76,8	480

Note : Le tableau est basé sur les femmes ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage.

¹ Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est (1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire, (MIILDA) ou (2) une moustiquaire prétraitée obtenue il y a moins de 12 mois, ou (3) une moustiquaire qui a été imprégnée avec un insecticide au cours des 12 derniers mois.

² La pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide (PID) est limitée à la pulvérisation effectuée par quelqu'un d'une organisation gouvernementale, privée ou non gouvernementale.

Tableau 12.8 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance, ont reçu de la SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale et pourcentage qui en ont pris au moins 2 doses et qui en ont reçu au moins une durant une visite prénatale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu de la SP/Fansidar durant une visite prénatale	Pourcentage ayant pris au moins 2 doses de SP/Fansidar dont au moins une dose a été reçue durant une visite prénatale	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 2 années ayant précédé l'enquête
Résidence			
Urbain	67,0	46,9	796
Rural	60,3	44,4	1 523
Région			
Région 1	62,6	50,3	918
Région 2	65,6	48,6	467
Région 3	66,0	43,6	449
Région 4	56,5	34,3	485
Niveau d'instruction			
Aucun	59,2	43,5	1 446
Primaire	64,8	45,6	362
Secondaire ou plus	70,5	50,3	511
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	62,5	41,7	524
Second	57,5	41,3	494
Moyen	60,8	47,6	502
Quatrième	62,3	46,2	444
Le plus élevé	72,7	51,8	354
Ensemble	62,6	45,3	2 319

Tableau 12.9 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview; et parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé, pourcentage qui ont pris une combinaison à base d'artémisinine (CTA), pourcentage l'ayant prise le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre, pourcentage ayant pris des antipaludiques et pourcentage les ayant pris le jour même ou le jour suivant le début de la fièvre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre :						
	Pourcentage ayant eu de la fièvre dans les 2 semaines précédant l'interview	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés ¹	Pourcentage pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé	Pourcentage ayant pris une CTA	Pourcentage ayant pris une CTA le jour même ou le jour suivant	Pourcentage ayant pris des antipaludiques	Pourcentage ayant pris des antipaludiques le jour même ou le jour suivant	Effectif d'enfants
Âge (en mois)									
<12	25,2	1 191	72,4	35,3	24,4	20,5	36,3	29,4	300
12-23	33,3	1 024	77,6	42,9	39,1	28,9	49,6	37,1	341
24-35	28,2	976	66,3	35,9	37,6	26,0	46,9	35,3	275
36-47	22,7	1 076	71,0	39,5	39,2	31,0	50,0	38,9	244
48-59	20,5	961	67,1	37,8	34,9	22,1	47,5	32,8	197
Sexe									
Masculin	25,5	2 596	72,9	39,8	37,5	27,4	48,1	36,5	662
Féminin	26,5	2 632	70,1	37,2	32,6	24,4	43,8	33,0	696
Résidence									
Urbain	27,9	1 720	73,7	30,2	32,3	20,9	44,7	30,6	480
Rural	25,0	3 508	70,3	42,9	36,4	28,6	46,5	37,0	877
Région									
Région 1	28,1	1 965	66,7	40,3	32,3	29,1	45,8	39,8	553
Région 2	25,7	1 169	67,4	39,0	33,7	22,8	38,7	26,5	300
Région 3	25,3	948	67,6	24,2	26,9	12,3	39,0	21,9	239
Région 4	23,2	1 145	89,4	46,8	49,2	34,8	60,4	45,3	265
Niveau d'instruction de la mère									
Aucun	25,9	3 516	69,2	38,0	34,3	25,3	43,9	32,8	911
Primaire	26,4	744	70,3	33,7	34,1	22,0	46,6	37,4	197
Secondaire ou plus	25,8	968	80,6	43,8	38,2	30,8	52,3	39,8	250
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	24,8	1 223	66,9	38,9	36,8	26,2	45,8	32,3	303
Second	23,8	1 136	72,1	40,5	33,8	25,9	42,7	34,3	271
Moyen	28,7	1 078	74,3	44,6	34,3	28,1	46,0	37,3	309
Quatrième	28,4	1 029	72,2	38,1	32,0	24,5	46,0	34,1	292
Le plus élevé	24,0	761	72,2	24,7	39,2	23,5	50,3	36,0	182
Ensemble	26,0	5 228	71,5	38,4	35,0	25,8	45,9	34,7	1 358

¹ Non compris les marchés et les guérisseurs traditionnels

Tableau 12.10 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant de la fièvre

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et, parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chacune des sources :	
	Parmi les enfants avec de la fièvre	Parmi les enfants avec de la fièvre pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés
Secteur public	62,1	84,2
Hôpital gouvernemental	10,7	14,5
Centre de santé du gouvernement	40,6	55,2
Poste de santé du gouvernement	9,0	12,2
Clinique mobile	0,5	0,7
Travailleur social	1,2	1,6
Agent de santé communautaire	2,1	2,9
Autre	0,2	0,3
Secteur médical privé	11,1	15,1
Hôpital/Clinique privé	2,9	3,9
Pharmacie	6,7	9,0
Médecin privé	0,2	0,3
Clinique mobile	0,7	1,0
Travailleur social	0,6	0,8
Autre privé médical	0,0	0,1
Autre secteur privé	3,7	5,0
Boutique	0,6	0,8
Praticien traditionnel	1,1	1,5
Marché	0,5	0,6
Autre	1,6	2,1
Effectif d'enfants	1 358	1 001

Tableau 12.11 Type d'antipaludiques utilisés

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview qui ont pris n'importe quel antipaludique, pourcentage ayant pris des antipaludiques spécifiques, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants ayant pris :						Effectif d'enfants avec de la fièvre ayant pris n'importe quel antipaludique
	N'importe quelle CTA	Quinine	SP/Fansidar	Chloroquine	Artésunate	Autre antipaludique	
Âge (en mois)							
<12	67,4	1,2	8,2	11,1	12,2	9,6	109
12-23	79,0	1,1	5,4	11,1	4,7	1,1	169
24-35	80,1	0,5	7,7	9,0	6,2	1,4	129
36-47	78,3	1,0	3,1	12,3	6,0	0,9	122
48-59	73,4	4,7	3,6	11,0	6,6	1,3	94
Sexe							
Masculin	78,0	2,0	5,8	11,0	4,6	2,0	318
Féminin	74,4	1,0	5,6	10,8	9,1	3,3	305
Résidence							
Urbain	72,4	1,1	9,4	13,9	5,9	4,1	215
Rural	78,2	1,7	3,7	9,3	7,4	1,8	408
Région							
Région 1	70,6	2,0	6,9	12,7	8,8	2,8	253
Région 2	87,1	1,8	6,2	0,0	3,7	1,8	116
Région 3	69,0	0,5	9,2	21,6	5,6	6,4	93
Région 4	81,4	1,0	1,3	9,7	6,7	0,7	160
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	78,0	1,7	6,0	8,8	6,1	1,6	400
Primaire	73,2	1,8	2,6	22,5	11,9	2,4	92
Secondaire ou plus	73,0	0,7	6,9	9,0	5,5	5,9	131
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	80,4	2,0	5,9	6,6	5,0	2,5	139
Second	79,3	1,9	4,6	9,1	4,7	2,0	116
Moyen	74,7	1,7	4,8	13,0	6,4	1,5	142
Quatrième	69,5	0,7	5,0	10,3	14,8	2,5	134
Le plus élevé	78,0	1,1	9,1	17,2	1,4	5,7	92
Ensemble	76,2	1,5	5,7	10,9	6,9	2,6	623

CTA = Combinaison thérapeutique à base d'artémisinine

Tableau 12.12 Niveau d'hémoglobine <8,0 g/dl chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois dont le niveau d'hémoglobine est inférieur à 8,0 g/dl, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Hémoglobine < 8,0 g/dl	Effectif d'enfants
Âge (en mois)		
6-8	13,8	151
9-11	21,4	135
12-17	20,7	300
18-23	15,6	198
24-35	19,3	521
36-47	14,3	661
48-59	11,2	604
Sexe		
Masculin	15,8	1 279
Féminin	15,8	1 290
Interview de la mère		
Interviewée	15,7	2 035
Non interviewée mais présente dans le ménage	14,2	63
Non interviewée et pas présente dans le ménage ¹	16,4	472
Résidence		
Urbain	11,3	821
Rural	17,9	1 748
Région		
Région 1	18,3	1 057
Région 2	9,2	556
Région 3	9,0	416
Région 4	22,8	540
Niveau d'instruction de la mère²		
Aucun	17,2	1 452
Primaire	14,5	259
Secondaire ou plus	10,5	386
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	17,0	589
Second	19,5	594
Moyen	16,4	558
Quatrième	13,6	511
Le plus élevé	8,8	318
Ensemble	15,8	2 569

Note : Le tableau est basé sur les enfants ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage. La prévalence de l'anémie est basée sur les niveaux d'hémoglobine. L'hémoglobine est mesurée en grammes par décilitre (g/dl)

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée

² Pour les femmes qui ne sont pas interviewées, les informations sont tirées du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.

Tableau 12.13 Couverture des tests d'anémie et du paludisme auprès des enfants (non pondéré)

Pourcentage d'enfants éligibles de 6-59 mois pour lesquels on a effectué un test d'hémoglobine et de paludisme, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage testé pour :			Effectif d'enfants
	Anémie	Paludisme avec TDR	Paludisme par microscopie	
Âge en mois				
6-8	86,0	92,7	94,9	178
9-11	89,8	95,5	94,9	157
12-17	91,4	94,5	95,4	326
18-23	93,0	96,0	97,0	201
24-35	92,1	95,3	95,8	621
36-47	93,7	94,0	95,3	698
48-59	93,1	95,3	96,4	685
Sexe				
Masculin	92,4	94,9	95,6	1 425
Féminin	92,0	94,7	95,9	1 441
Interview de la mère				
Interviewée	93,7	95,2	96,1	2 223
Non interviewée mais présente dans le ménage	71,4	92,3	93,4	91
Non interviewée et pas présente dans le ménage ¹	89,9	93,5	94,7	552
Résidence				
Urbain	92,7	95,4	96,4	872
Rural	92,0	94,5	95,4	1 994
Région				
Région 1	95,6	95,4	96,2	1 205
Région 2	90,5	93,8	94,7	756
Région 3	90,6	96,4	97,6	329
Région 4	88,4	93,9	95,1	576
Niveau d'instruction de la mère²				
Aucun	94,0	94,8	95,7	1 569
Primaire	94,9	96,3	97,4	272
Secondaire ou plus	91,0	96,9	97,5	357
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	90,9	94,4	95,8	738
Second	93,5	93,6	94,4	674
Moyen	91,9	95,3	96,1	615
Quatrième	93,4	96,5	97,7	564
Le plus élevé	90,9	94,2	94,2	275
Ensemble	92,2	94,8	95,7	2 866

TDR = Test de Diagnostic Rapide

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée

² Non compris les enfants dont la mère n'est pas interviewée.

Tableau 12.14 Prévalence du paludisme chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois classés positifs selon le test de diagnostic rapide (TDR) et selon la microscopie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Prévalence du paludisme selon le TDR		Prévalence du paludisme selon la microscopie	
	TDR positif	Effectif d'enfants	Microscopie positive	Effectif d'enfants
Âge en mois				
6-8	29,9	164	13,3	166
9-11	32,0	144	17,2	142
12-17	34,7	312	20,8	314
18-23	38,4	205	22,8	206
24-35	34,1	538	20,9	540
36-47	36,9	653	20,1	662
48-59	28,9	621	17,4	627
Sexe				
Masculin	32,7	1 327	19,8	1 333
Féminin	34,5	1 309	18,9	1 325
Interview de la mère				
Interviewée	34,0	2 065	19,8	2 080
Non interviewée mais présente dans le ménage	27,8	91	15,2	92
Non interviewée et pas présente dans le ménage ¹	32,9	480	18,3	485
Résidence				
Urbain	22,4	865	8,6	871
Rural	39,0	1 771	24,6	1 787
Région				
Région 1	37,8	1 053	23,1	1 060
Région 2	34,5	572	21,6	577
Région 3	20,1	459	4,5	463
Région 4	35,9	552	22,1	557
Niveau d'instruction de la mère²				
Aucun	35,2	1 410	21,5	1 422
Primaire	34,0	261	19,0	264
Secondaire ou plus	28,5	364	15,0	364
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	42,5	603	25,9	610
Second	43,5	589	27,7	595
Moyen	36,8	576	22,8	580
Quatrième	20,1	527	9,7	532
Le plus élevé	16,0	341	2,1	340
Ensemble	33,6	2 636	19,3	2 658

¹ Y compris les enfants dont la mère est décédée

² Non compris les enfants dont la mère n'est pas interviewée.

Tableau 12.15 Espèces plasmodiales

Parmi les enfants de 6-59 mois présentant une infection paludéenne, pourcentage infecté par des espèces spécifiques de *Plasmodium* et pourcentage avec des infections mixtes selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Espèces de <i>Plasmodium</i>					Effectif d'enfants avec des parasites du paludisme
	<i>P. falciparum</i> ¹	<i>P. malariae</i> ²	<i>P. ovale</i> ³	<i>P. falciparum</i> + <i>P. ovale</i>	<i>P. falciparum</i> + <i>P. malariae</i>	
Âge en mois						
6-8	(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	22
9-11	(94,0)	(6,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	24
12-17	100,0	5,3	0,8	0,8	5,3	65
18-23	96,8	3,2	0,0	0,0	0,0	47
24-35	99,8	3,6	1,1	1,1	3,4	111
36-47	98,7	1,5	3,3	2,8	0,7	131
48-59	96,7	1,9	5,1	3,7	0,0	108
Sexe						
Masculin	98,8	2,6	2,0	2,0	1,4	259
Féminin	97,9	3,1	2,5	1,7	1,9	249
Interview de la mère						
Interviewée	98,0	3,1	2,8	2,3	1,6	407
Non interviewée mais présente dans le ménage	*	*	*	*	*	14
Non interviewée et pas présente dans le ménage ¹	99,6	2,1	0,3	0,3	1,7	87
Résidence						
Urbain	98,7	3,9	6,8	6,8	2,6	74
Rural	98,3	2,7	1,5	1,0	1,4	434
Région						
Région 1	99,0	1,9	1,4	1,4	0,9	243
Région 2	97,7	3,7	3,7	2,0	3,2	122
Région 3	(98,0)	(4,0)	(17,2)	(17,2)	(2,0)	21
Région 4	97,8	3,6	0,0	0,0	1,3	122
Niveau d'instruction de la mère⁵						
Aucun	99,0	2,6	1,8	1,8	1,6	302
Primaire	91,3	7,9	5,4	1,1	3,4	50
Secondaire ou plus	98,6	1,4	5,8	5,8	0,0	54
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	98,0	3,9	0,0	0,0	1,8	154
Second	98,2	2,3	1,3	0,0	1,8	164
Moyen	99,7	1,8	3,3	3,3	1,4	132
Quatrième	96,3	4,5	9,8	9,8	0,8	51
Le plus élevé	*	*	*	*	*	7
Ensemble	98,3	2,8	2,3	1,9	1,6	508

Note : les colonnes du tableau ne sont pas mutuellement exclusives ; les pourcentages n'égalent pas 100 %. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Y compris les cas avec des parasites identifiés comme *P. falciparum* ou *P. falciparum* combiné avec d'autres espèces.

² Y compris les cas avec des parasites identifiés comme *P. malariae* ou *P. malariae* combiné avec d'autres espèces.

³ Y compris les cas avec des parasites identifiés comme *P. ovale* ou *P. ovale* combiné avec d'autres espèces.

⁴ Y compris les enfants dont la mère est décédée.

⁵ Non compris les enfants dont la mère n'est pas interviewée.