

# NUTRITION DES ENFANTS ET DES ADULTES

Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-âge <sup>1</sup>			Poids-pour-taille				Poids-pour-âge				Effectif d'enfants
	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	
<b>Âge en mois</b>												
<6	7,6	13,7	-0,5	2,7	8,6	16,0	0,4	3,7	8,1	8,8	-0,2	184
6-8	7,4	21,2	-0,5	5,8	13,9	9,4	-0,2	4,9	17,7	2,9	-0,6	133
9-11	11,7	28,5	-1,1	5,2	18,8	9,1	-0,5	4,9	25,9	1,8	-1,0	118
12-17	14,3	34,0	-1,2	6,0	13,4	6,7	-0,3	9,5	18,6	2,6	-0,8	261
18-23	16,6	48,9	-1,5	4,2	16,9	8,6	-0,2	4,9	18,3	3,9	-0,9	184
24-35	22,4	44,7	-1,5	4,3	7,7	6,7	0,1	5,0	15,4	2,7	-0,8	467
36-47	17,2	43,4	-1,6	3,4	9,1	6,1	0,0	5,6	17,9	1,1	-0,9	597
48-59	13,4	29,4	-1,4	3,5	6,7	6,5	0,0	3,3	11,9	0,6	-0,9	550
<b>Sexe</b>												
Masculin	16,8	35,6	-1,4	5,2	11,9	6,3	-0,2	6,6	18,0	2,2	-0,9	1 217
Féminin	14,2	36,2	-1,3	3,0	8,2	8,8	0,1	3,7	13,7	2,5	-0,7	1 277
<b>Intervalle intergénérisque en mois<sup>3</sup></b>												
Première naissance <sup>4</sup>	14,3	32,7	-1,3	4,1	9,6	9,3	0,0	4,0	17,5	3,2	-0,8	423
<24	20,8	46,8	-1,6	3,8	10,7	10,1	-0,0	6,1	18,1	1,8	-1,0	229
24-47	16,2	36,9	-1,4	4,3	11,0	7,5	-0,0	5,0	15,7	2,5	-0,8	865
48+	13,2	32,5	-1,2	2,5	9,4	7,9	0,0	4,2	11,8	2,3	-0,7	497
<b>Grosseur à la naissance<sup>3</sup></b>												
Très petit	24,3	49,1	-1,7	2,9	16,3	5,6	-0,4	10,3	28,7	1,6	-1,3	93
Petit	15,2	38,1	-1,4	3,8	10,6	8,8	-0,2	6,3	17,4	2,1	-0,9	238
Moyen ou plus gros que la moyenne	15,2	35,2	-1,3	3,7	9,9	8,4	0,1	4,2	14,3	2,6	-0,7	1 645
Manquant	(15,0)	(29,5)	1,2	(8,8)	(9,6)	(4,1)	0,4	(5,1)	(19,2)	(3,6)	0,9	36
<b>Interview de la mère</b>												
Interviewée	15,6	36,1	-1,3	3,8	10,3	8,3	-0,0	4,7	15,4	2,5	-0,8	2 013
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	15,3	30,7	-1,4	6,8	11,6	8,1	-0,1	6,3	14,3	3,9	-0,9	57
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage <sup>5</sup>	15,0	35,8	-1,4	5,2	8,7	4,2	-0,1	6,9	18,1	1,3	-0,9	424
<b>État nutritionnel de la mère<sup>6</sup></b>												
Maigre (BMI<18,5)	16,3	36,7	-1,6	2,5	14,0	6,1	-0,2	8,0	17,8	0,9	-1,1	132
Normal (BMI 18,5-24,9)	16,6	36,6	-1,3	3,2	9,7	7,9	0,0	4,5	15,5	2,8	-0,8	1 338
En surpoids/obèse (BMI ≥ 25)	12,4	34,6	-1,3	4,7	9,3	10,5	0,1	3,9	12,3	2,1	-0,7	290
<b>Résidence</b>												
Urbain	10,3	30,0	-1,1	4,5	11,1	7,0	-0,1	4,4	13,0	1,9	-0,7	768
Rural	17,8	38,5	-1,4	3,9	9,6	7,9	0,0	5,5	17,1	2,5	-0,8	1 726
<b>Région</b>												
Région 1	14,0	33,7	-1,2	5,4	11,4	6,4	-0,2	6,3	17,5	2,8	-0,8	1 070
Région 2	18,5	40,8	-1,5	3,7	9,6	8,8	0,1	5,6	16,6	2,1	-0,8	544
Région 3	10,5	30,0	-1,1	2,9	9,9	7,5	0,1	2,8	11,3	3,2	-0,6	353
Région 4	18,6	39,3	-1,6	2,7	7,8	8,8	0,1	3,8	14,7	1,0	-0,9	527
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>												
Aucun	18,3	37,9	-1,4	3,0	9,4	7,9	0,0	4,8	14,9	2,8	-0,8	1 425
Primaire	10,8	32,6	-1,2	4,9	13,8	7,5	-0,2	6,0	17,3	1,5	-0,8	276
Secondaire ou plus	8,7	30,6	-1,1	6,3	11,1	10,3	-0,1	3,8	15,7	2,6	-0,7	369
<b>Quintile de bien-être économique</b>												
Le plus bas	18,7	40,8	-1,5	4,5	8,4	9,3	0,1	6,3	17,0	3,4	-0,8	565
Second	16,8	37,8	-1,4	3,9	11,0	7,1	-0,1	5,8	17,3	1,4	-0,9	594
Moyen	16,7	36,9	-1,4	4,8	12,5	6,3	-0,0	6,0	18,3	3,2	-0,9	567
Quatrième	12,4	31,6	-1,2	3,3	8,3	7,1	-0,1	3,0	13,5	1,4	-0,8	485
Le plus élevé	9,1	27,5	-1,0	3,3	9,3	8,8	0,1	3,2	9,6	2,2	-0,5	283
Ensemble	15,5	35,9	-1,3	4,1	10,0	7,6	-0,0	5,1	15,8	2,3	-0,8	2 494

Note : le tableau est basé sur les enfants qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage. Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant adopté en 2006. Les indices présentés dans ce tableau ne sont pas comparables à ceux basés sur la population de référence du NCHS/CDC/WHO. Le tableau est basé sur les enfants dont les dates de naissance (mois et année) et les mesures de la taille et du poids qui sont valides. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

<sup>1</sup> Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée ainsi que, dans certains cas, ceux dont l'âge n'est pas connu et ceux qui mesurent moins de 85 cm ;

tous les autres enfants sont mesurés en position debout.

<sup>2</sup> Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant

<sup>3</sup> Non compris les enfants dont la mère n'a pas été interviewée

<sup>4</sup> Les premières naissances multiples -jumeaux, triplés- etc. sont comptées comme première naissance parce qu'elles n'ont pas d'intervalle avec la naissance précédente.

<sup>5</sup> Y compris les enfants dont la mère est décédée

<sup>6</sup> Non compris les enfants dont la mère n'a pas été pesée et mesurée, les enfants dont la mère n'a pas été interviewée et les enfants dont la mère est enceinte ou a donné naissance à un enfant dans les deux mois précédents. L'état nutritionnel de la mère, basé sur l'IMC (Indice de Masse Corporelle), est présenté au tableau 11.10.1.

<sup>7</sup> Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage

---

Tableau 11.2 Allaitement initial

Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été allaités, pourcentage qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage qui ont commencé à être allaités le jour qui a suivi leur naissance et parmi les derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités, pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Parmi les derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 dernières années :			Parmi les enfants derniers-nés au cours des 2 dernières années et qui ont été allaités :		
	Pourcentage ayant été allaités	Pourcentage ayant commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance	Pourcentage ayant commencé à être allaités le jour qui a suivi la naissance <sup>1</sup>	Effectif d'enfants derniers-nés	Pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités <sup>2</sup>	Effectif d'enfants derniers-nés ayant été allaités
<b>Sexe</b>						
Masculin	97,0	51,8	87,4	1 138	21,9	1 104
Féminin	97,5	51,3	88,6	1 181	24,3	1 151
<b>Assistance à l'accouchement</b>						
Professionnel de santé <sup>3</sup>	96,8	47,0	86,3	1 477	23,6	1 430
Sage-femme traditionnelle	98,3	60,7	91,6	776	21,9	763
Autre	98,8	48,2	90,1	58	26,2	58
Personne	*	*	*	4	*	4
Manquant	*	*	*	3	*	0
<b>Lieu de l'accouchement</b>						
Établissement de santé	96,6	46,6	86,5	1 353	22,5	1 307
Maison	98,5	58,7	90,6	957	24,0	943
Autre	*	*	*	5	*	5
Manquant	*	*	*	4	*	0
<b>Résidence</b>						
Urbain	95,6	43,1	81,9	796	25,4	761
Rural	98,1	56,0	91,3	1 523	21,9	1 494
<b>Région</b>						
Région 1	98,0	70,3	91,3	918	23,2	900
Région 2	97,1	47,3	89,4	467	24,6	453
Région 3	94,9	37,4	79,0	449	29,5	426
Région 4	98,0	33,3	88,8	485	15,8	475
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Aucun	98,3	54,7	91,5	1 446	22,5	1 421
Primaire	96,5	52,5	85,9	362	23,1	349
Secondaire ou plus	95,0	42,0	79,9	511	24,9	485
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	97,5	53,1	90,7	524	20,1	511
Second	98,3	56,2	91,2	494	20,0	486
Moyen	97,5	57,8	90,5	502	24,7	490
Quatrième	97,1	51,1	86,2	444	29,4	431
Le plus élevé	95,3	34,6	78,4	354	21,6	337
Ensemble	97,2	51,6	88,1	2 319	23,1	2 255

Note : Le tableau est basé sur les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, cela qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Y compris les enfants qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance

<sup>2</sup> Les enfants à qui on a donné autre chose que le lait maternel pendant les 3 premiers jours de la vie

<sup>3</sup> Médecin, infirmière/sage-femme ou sage-femme auxiliaire

Tableau 11.3 Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère par type d'allaitement, pourcentage actuellement allaité, pourcentage de tous les enfants de moins de 2 ans utilisant un biberon, selon l'âge en mois, Données modèles DHS6

Âge en mois	Type d'allaitement							Pourcentage actuellement allaité	Effectif des derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère	Pourcentage utilisant un biberon	Effectif de tous les enfants de moins de 2 ans
	Non Allaité	Exclusivement allaité	Allaité et eau seulement	Allaités et liquides non lactés <sup>1</sup>	Allaités et autres laits	Allaités et aliments de complément	Total				
0-1	3,2	42,4	34,7	12,2	2,4	5,0	100,0	96,8	159	14,0	167
2-3	2,0	31,6	32,7	17,3	8,9	7,6	100,0	98,0	236	25,9	237
4-5	5,4	23,6	24,1	11,6	6,9	28,4	100,0	94,6	195	24,6	202
6-8	7,2	8,8	17,2	4,4	3,1	59,4	100,0	92,8	310	22,5	314
9-11	8,6	4,0	6,9	4,1	1,5	74,9	100,0	91,4	258	19,5	271
12-17	18,6	1,3	2,7	0,8	0,1	76,6	100,0	81,4	582	13,0	603
18-23	47,0	0,5	0,9	0,5	0,0	51,1	100,0	53,0	365	7,5	421
0-3	2,5	36,0	33,5	15,2	6,3	6,5	100,0	97,5	395	21,0	404
0-5	3,4	31,9	30,4	14,0	6,5	13,8	100,0	96,6	590	22,2	606
6-9	6,6	8,1	14,6	4,7	3,3	62,8	100,0	93,4	395	21,7	405
12-15	14,8	1,6	3,4	1,0	0,1	79,0	100,0	85,2	401	13,0	415
12-23	29,5	1,0	2,0	0,7	0,1	66,7	100,0	70,5	947	10,8	1 024
20-23	52,4	0,7	0,3	0,9	0,0	45,8	100,0	47,6	208	7,7	245

Note : Les données sur l'allaitement se rapportent à une période de 24 heures (hier et la nuit dernière). Les enfants classés dans la catégorie « Allaitement et eau seulement » ne reçoivent aucun complément liquide ou solide. Les catégories « Non allaité », « Allaité exclusivement », « Allaité et eau seulement », « Jus/liquides non lactés », « Autres laits », et « Aliments de complément » (solides et semi solides) sont hiérarchiques et mutuellement exclusives et la somme des pourcentages égale 100 %. Ainsi, les enfants qui sont allaités et qui reçoivent des liquides non lactés et qui ne reçoivent pas d'autres laits et qui ne reçoivent pas d'aliments de complément sont classés dans la catégorie « Liquides non lactés » même s'ils reçoivent également de l'eau. Tout enfant qui reçoit des aliments de complément est classé dans cette catégorie tant qu'il est toujours allaité.

<sup>1</sup> Les liquides non lactés comprennent les jus, les boissons à base de jus, les bouillons et les autres liquides.

**Tableau 11.4 Durée médiane de l'allaitement**

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants nés au cours des 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Durée médiane (en mois) de l'allaitement des enfants nés dans les 3 dernières années <sup>1</sup>		
	Allaitement	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant <sup>2</sup>
<b>Sexe</b>			
Masculin	18,6	a	5,2
Féminin	19,5	a	4,9
<b>Résidence</b>			
Urbain	17,0	a	3,5
Rural	20,5	a	5,8
<b>Région</b>			
Région 1	19,8	1,2	5,5
Région 2	18,8	a	5,6
Région 3	16,1	a	2,9
Région 4	21,5	a	5,5
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>			
Aucun	20,6	a	5,2
Primaire	19,3	a	5,1
Secondaire ou plus	15,9	a	3,9
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	21,6	a	5,7
Second	20,3	a	5,8
Moyen	18,7	(0,9)	5,2
Quatrième	20,2	a	5,0
Le plus élevé	15,3	a	2,9
Ensemble	19,2	a	5,0
Moyenne pour tous les enfants	18,6	2,8	6,2

Note : Les durées médiane et moyenne de l'allaitement sont basées sur le statut d'allaitement de l'enfant au moment de l'enquête (statut actuel). Y compris les enfants vivants et décédés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

a = Non présenté parce que moins de 50 % des enfants de cette catégorie sont exclusivement allaités ou ne reçoivent que de l'eau en plus du lait maternel.

<sup>1</sup> On suppose que les enfants derniers-nés qui ne vivent pas actuellement avec leur mère et tous les enfants qui ne sont pas des derniers-nés ne sont pas actuellement allaités.

<sup>2</sup> Soit exclusivement allaités ou qui ont reçu le lait maternel et de l'eau et/ou des liquides non lactés seulement

Tableau 11.5 Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview

Pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de deux ans vivant avec leur mère, par type d'aliments consommés le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon l'âge, Données modèles DHS6

Âge en mois	Liquides			Nourriture solide ou semi solide										Effectif d'enfants
	Lait en poudre pour enfant	Autres laits <sup>1</sup>	Autres liquides <sup>2</sup>	Aliments enrichis pour bébé	Aliments à base de céréales <sup>3</sup>	Fruits et légumes riches en vitamine A <sup>4</sup>	Autres fruits et légumes	Prépara-tions à base de racines et de tubercules	Prépara-tions à base de légumi-neuses et de noix	Viande, poisson , volaille	Œufs	Fromage, yaourt, autres produits laitiers	Prépara-tions solides ou semi-solides	
ENFANTS ALLAITÉS														
0-1	2,9	0,9	15,3	0,4	4,6	1,6	0,4	1,2	0,4	0,4	0,4	0,4	5,2	154
2-3	9,7	4,0	20,8	2,9	1,2	1,8	1,4	0,0	0,4	1,4	1,2	1,4	7,7	231
4-5	7,7	3,7	20,5	13,4	13,1	3,7	0,8	1,3	1,0	2,1	2,1	0,5	30,0	185
6-8	11,5	11,0	19,1	28,7	31,1	13,9	3,7	7,7	5,7	9,0	4,0	1,7	63,9	288
9-11	5,2	7,6	28,0	22,4	53,3	25,4	7,9	10,9	11,8	17,5	7,9	5,7	81,9	236
12-17	4,7	8,0	24,5	16,3	72,5	39,2	15,6	22,4	17,0	32,7	10,8	5,5	94,0	474
18-23	1,4	7,6	22,1	13,3	74,0	51,3	11,2	23,2	17,0	40,3	11,2	2,7	96,4	194
6-23	5,9	8,6	23,5	20,0	58,9	32,3	10,5	16,7	13,2	25,2	8,7	4,1	84,8	1 192
Total	6,3	6,8	22,1	15,4	41,8	22,6	7,4	11,5	9,1	17,5	6,3	3,1	62,0	1 761
ENFANTS NON ALLAITÉS														
0-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10
6-8	(9,5)	(18,3)	(25,2)	(31,3)	(60,8)	(24,9)	(4,2)	(7,9)	(22,1)	(20,5)	(22,6)	(14,8)	(79,5)	22
9-11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22
12-17	7,8	17,5	37,7	16,7	77,2	49,3	17,9	28,8	20,5	44,8	13,8	5,1	91,0	108
18-23	8,7	14,8	37,4	14,2	81,1	60,6	17,5	30,3	25,2	51,8	16,5	8,3	98,3	172
6-23	8,9	16,4	36,3	16,8	76,7	52,4	16,9	26,8	23,5	45,5	15,9	8,1	92,6	324
Total	9,9	16,8	34,1	16,1	72,4	49,6	16,2	25,5	22,1	42,8	14,9	7,6	87,8	345

Note : Les données sur l'allaitement et sur les aliments consommés se rapportent à la période de « 24 heures » (hier et la nuit dernière). Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Les autres laits comprennent le lait d'animal, qu'il soit frais, en boîte, ou en poudre.

<sup>2</sup> N'inclut pas l'eau plate. Inclut les jus, les boissons à base de jus, les bouillons clairs ou d'autres liquides non lactés

<sup>3</sup> Inclut les aliments enrichis pour bébés

<sup>4</sup> Comprend les citrouilles, les carottes, les courges, les pommes de terre ou patates douces qui sont jaunes ou oranges à l'intérieur, les ignames blanches, manioc, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues, les papayes mûres, les melons et d'autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A

Tableau 11.6 Apport alimentaire minimum acceptable

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable basé sur l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et le nombre de fois qu'ils ont été nourris durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique-sociodémographique	Parmi les enfants allaités de 6-23 mois, pourcentage nourris selon :				Parmi les enfants non allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				Effectif d'enfants de 6-23 mois non allaités	Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				Effectif de tous les enfants de 6-23 mois
	Diversité alimentaire minimum <sup>1</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>2</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable <sup>3</sup>	Effectif d'enfants de 6-23 mois allaités	Lait ou produits laitiers <sup>4</sup>	Diversité alimentaire minimum des repas <sup>5</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>5</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable <sup>6</sup>		Lait maternel, lait, ou produits laitiers <sup>7</sup>	Diversité alimentaire minimum <sup>1</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>8</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable <sup>9</sup>	
<b>Âge en mois</b>														
6-8	5,0	56,5	4,1	288	(24,7)	(22,6)	(26,4)	(14,5)	22	94,6	6,3	54,3	4,9	310
9-11	10,8	33,2	3,6	236	*	*	*	*	22	93,4	11,6	33,3	4,4	258
12-17	18,6	41,5	12,3	474	15,5	29,9	18,3	1,5	108	84,3	20,7	37,2	10,3	582
18-23	22,6	48,2	12,1	194	16,2	35,5	29,6	9,5	172	60,6	28,7	39,5	10,9	365
<b>Sexe</b>														
Masculin	12,2	45,1	7,1	586	18,4	33,4	24,4	7,3	163	82,2	16,8	40,6	7,1	749
Féminin	16,5	44,0	10,0	606	15,6	30,0	27,5	7,5	161	82,3	19,4	40,6	9,5	767
<b>Résidence</b>														
Urbain	19,9	55,6	13,8	358	32,6	42,1	36,6	14,2	153	79,8	26,5	49,9	13,9	511
Rural	12,0	39,8	6,3	833	3,1	22,5	16,4	1,3	171	83,5	13,8	35,8	5,5	1 005
<b>Région</b>														
Région 1	14,9	35,5	8,1	504	11,2	32,0	30,0	1,6	101	85,1	17,8	34,6	7,0	606
Région 2	11,9	54,9	8,4	229	5,6	18,5	16,8	2,2	68	78,4	13,4	46,2	7,0	298
Région 3	26,7	55,2	18,9	184	35,7	46,6	36,1	19,2	104	76,8	33,9	48,3	19,0	288
Région 4	7,3	45,4	2,7	274	5,8	18,6	9,3	1,8	51	85,3	9,1	39,7	2,6	325
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>														
Aucun	12,9	41,9	7,4	782	10,5	22,9	18,9	3,7	182	83,1	14,8	37,6	6,7	964
Primaire	17,7	47,4	11,4	178	(2,7)	(39,7)	(13,6)	(0,0)	40	82,2	21,7	41,2	9,3	218
Secondaire ou plus	16,9	51,3	10,3	232	34,1	44,3	43,3	16,8	103	79,8	25,3	48,8	12,3	335
<b>Quintile de bien-être économique</b>														
Le plus bas	10,5	34,6	4,8	297	1,8	10,4	6,2	0,3	57	84,3	10,5	30,1	4,1	354
Second	10,1	41,6	6,0	255	3,6	18,5	19,4	0,0	49	84,6	11,4	38,0	5,0	304
Moyen	9,9	43,9	5,8	259	11,7	37,4	22,2	3,0	70	81,2	15,8	39,3	5,2	329
Quatrième	23,2	49,2	12,7	240	9,6	27,0	18,2	1,9	58	82,4	23,9	43,2	10,6	298
Le plus élevé	23,7	64,3	19,3	140	42,5	50,8	49,5	22,7	91	77,4	34,3	58,5	20,6	231
Ensemble	14,4	44,6	8,6	1 192	17,0	31,7	25,9	7,4	324	82,3	18,1	40,6	8,3	1 516

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

<sup>1</sup> Enfants ayant reçu des aliments d'au moins quatre groupes contenant les aliments suivants : a. préparation commerciale pour bébés, lait autre que le lait maternel, fromage ou yaourt ou autres produits laitiers ; b. préparations à base de céréales, de racines ou de tubercules et les préparations enrichies pour bébés à base de céréales ; c. fruits et légumes riches en vitamine A, et huile de palme rouge ; d. autres fruits et légumes ; e. œufs, f. viande, poisson et coquillage (et abats) ; g. légumes et noix.

<sup>2</sup> Pour les enfants allaités, la fréquence minimum des repas consiste à recevoir des aliments solides ou semi-solides au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et au moins trois fois par jour pour ceux de 9-23 mois.

<sup>3</sup> On considère que les enfants allaités de 6-23 mois reçoivent un apport alimentaire minimum acceptable s'ils sont nourris selon la diversité minimum alimentaire telle que décrite dans la note 1 et la fréquence minimum des repas telle que défini dans la note 2

<sup>4</sup> Y compris au moins deux repas comptant une préparation commerciale pour bébés, du lait d'animal frais, en boîte en poudre et du yaourt

<sup>5</sup> Pour les enfants de 6-23 mois non allaités, on considère que la fréquence minimum des repas est de recevoir des aliments solides ou semi-solides ou des préparations à base de lait au moins quatre fois par jour

<sup>6</sup> On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent d'autres laits ou des produits laitiers au moins deux fois par jour, s'ils sont nourris selon la fréquence minimum des repas telle que définie à la note 5, et s'ils reçoivent des aliments solides ou semi-solides provenant d'au moins quatre groupes d'aliments, non compris le groupe d'aliments comprenant le lait ou les produits laitiers.

<sup>7</sup> Lait maternel ou pas de lait maternel et recevant au moins deux repas de préparations commerciales pour bébés, de lait d'animal frais, en boîte ou en poudre et de yaourt

<sup>8</sup> Les enfants nourris le nombre minimum de fois recommandé par jour selon leur âge et selon qu'ils sont allaités ou non comme décrit aux notes 2 et 5

<sup>9</sup> On considère que les enfants de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent le lait maternel, d'autres laits ou des produits laitiers comme décrit à la note 7, s'ils sont nourris selon la diversité alimentaire minimum comme décrit à la note 1, et selon la fréquence minimum des repas comme décrit aux notes 2 et 5

**Tableau 11.7 Prévalence de l'anémie parmi les enfants**

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois considérés comme étant anémiés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Anémie selon le niveau d'hémoglobine				Effectif d'enfants de 6-59 mois
	Anémie (<11,0 g/dl)	Anémie légère (10,0-10,9 g/dl)	Anémie modérée (7,0-9,9 g/dl)	Anémie sévère (< 7,0 g/dl)	
<b>Âge en mois</b>					
6-8	88,0	33,5	50,3	4,2	151
9-11	83,0	18,8	57,9	6,3	135
12-17	84,1	22,8	55,5	5,8	300
18-23	83,5	33,1	42,0	8,5	198
24-35	78,9	23,9	48,2	6,8	521
36-47	77,6	25,0	47,5	5,0	661
48-59	74,9	28,0	43,7	3,2	604
<b>Sexe</b>					
Masculin	80,6	26,2	48,3	6,0	1 279
Féminin	78,1	25,8	47,6	4,6	1 290
<b>Interview de la mère</b>					
Interviewée	79,8	26,4	47,9	5,5	2 035
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	79,2	27,7	49,8	1,7	63
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage <sup>1</sup>	77,2	24,2	47,9	5,0	472
<b>Résidence</b>					
Urbain	72,2	29,9	37,1	5,3	821
Rural	82,7	24,2	53,1	5,4	1 748
<b>Région</b>					
Région 1	84,0	24,3	54,1	5,7	1 057
Région 2	75,2	27,8	43,2	4,2	556
Région 3	71,0	33,0	34,3	3,7	416
Région 4	80,8	22,3	51,5	7,1	540
<b>Niveau d'instruction de la mère<sup>2</sup></b>					
Aucun	81,5	24,4	50,7	6,3	1 452
Primaire	81,3	28,3	48,6	4,5	259
Secondaire ou plus	72,7	32,9	37,3	2,5	386
<b>Quintile de bien-être économique</b>					
Le plus bas	81,1	23,6	52,1	5,4	589
Second	80,8	22,5	51,9	6,4	594
Moyen	84,3	27,9	51,3	5,1	558
Quatrième	78,1	27,5	45,5	5,1	511
Le plus élevé	66,5	31,6	31,2	3,7	318
Ensemble	79,3	26,0	48,0	5,3	2 569

Notes : Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé la nuit ayant précédé l'interview dans le ménage et qui ont été testés pour l'anémie. La prévalence de l'anémie, basée sur le niveau d'hémoglobine est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998. Hémoglobine en grammes par décilitre (g/dl).

<sup>1</sup> Y compris les enfants dont la mère est décédée

<sup>2</sup> Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire Ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire Ménage.



Tableau 11.8 Consommation de micronutriments par les enfants

Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère, pourcentages qui ont consommé des aliments riches en vitamine A et des aliments riches en fer au cours des 24 heures ayant précédé l'interview ; parmi tous les enfants de 6-59 mois, pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 mois ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les 7 jours ayant précédé l'interview et pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les 6 mois ayant précédé l'interview; et parmi tous les enfants de 6-59 mois qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage qui disposait de sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère :			Parmi tous les enfants de 6-59 mois :			Parmi les enfants de 6-59 mois vivant dans un ménage dans lequel le sel a été testé :		
	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en vitamine A dans les dernières 24 heures <sup>1</sup>	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en fer dans les dernières 24 heures <sup>2</sup>	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les 6 derniers mois	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les 7 derniers jours <sup>3</sup>	Pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les 6 derniers mois <sup>3,4</sup>	Effectif d'enfants	Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé <sup>5</sup>	Effectif d'enfants
<b>Âge en mois</b>									
6-8	18,8	12,9	310	69,3	43,8	27,7	314	81,5	279
9-11	32,3	22,4	258	83,4	41,6	33,8	271	77,4	245
12-17	54,3	38,2	582	84,2	43,3	48,2	603	82,2	544
18-23	64,2	47,9	365	88,0	43,5	64,9	421	81,7	384
24-35	na	na	na	82,8	40,1	65,8	976	81,2	892
36-47	na	na	na	82,6	32,8	62,0	1 076	79,2	961
48-59	na	na	na	79,3	31,2	62,1	961	85,7	875
<b>Sexe</b>									
Masculin	43,2	30,4	749	81,2	37,3	56,4	2 298	82,1	2 066
Féminin	48,0	34,9	767	82,4	37,9	58,3	2 324	81,1	2 115
<b>Allaitement</b>									
Allaité	40,4	28,5	1 192	82,0	43,7	45,2	1 356	80,0	1 223
Non allaité	66,4	49,1	316	82,5	35,5	63,0	3 207	82,5	2 905
Manquant	*	*	8	39,7	13,7	27,8	59	73,6	53
<b>Âge de la mère à la naissance</b>									
15-19	38,8	26,6	175	82,8	45,8	52,2	326	81,6	293
20-29	44,4	32,0	738	80,1	38,5	55,5	2 198	81,9	2 020
30-39	47,9	35,5	488	83,6	36,1	59,2	1 656	80,6	1 457
40-49	54,9	34,3	115	82,6	32,8	63,0	441	84,0	410
<b>Résidence</b>									
Urbain	46,9	38,5	511	85,0	47,0	61,0	1 521	89,9	1 336
Rural	45,0	29,7	1 005	80,2	33,0	55,5	3 101	77,8	2 844
<b>Région</b>									
Région 1	46,8	34,6	606	76,1	28,6	54,1	1 716	73,6	1 584
Région 2	39,0	28,3	298	85,2	33,5	59,2	1 041	82,8	999
Région 3	55,1	44,4	288	80,0	46,2	55,9	830	90,0	689
Région 4	41,3	22,7	325	89,3	49,7	61,8	1 036	88,0	909
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>									
Aucun	46,1	30,1	964	80,3	33,2	56,7	3 139	79,7	2 849
Primaire	44,8	35,3	218	82,4	39,5	57,0	630	82,6	570
Secondaire ou plus	45,1	38,5	335	87,1	52,5	59,9	853	88,0	762
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	43,3	25,5	354	83,8	32,8	58,7	1 096	79,2	995
Second	38,7	25,3	304	78,7	35,2	55,6	990	76,0	885
Moyen	50,9	36,9	329	77,5	33,2	51,0	947	79,2	891
Quatrième	49,3	38,0	298	85,1	41,2	60,1	916	83,0	833
Le plus élevé	46,2	40,5	231	84,8	50,5	62,6	673	96,2	576
Ensemble	45,7	32,7	1 516	81,8	37,6	57,3	4 622	81,6	4 180

Note : l'information sur la supplémentation en vitamine est basée sur le souvenir de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible). Les informations sur la supplémentation en fer et des vermifuges sont basées sur le souvenir de la mère. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

<sup>1</sup> Y compris la viande (et abats), poisson, volaille, œufs, citrouilles, ignames ou courges rouges ou jaunes, carottes, pommes de terre douces rouges, légumes à feuilles vert foncé, mangues mûres, papayes mûres et autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A et l'huile de palme rouge.

<sup>2</sup> Y compris la viande (et les abats), le poisson, la volaille et les œufs

<sup>3</sup> Les vermifuges contre les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et les schistosomias.

<sup>4</sup> Sont exclus les enfants des ménages dans lesquels le sel n'a pas été testé

---

**Tableau 11.9 Présence de sel iodé dans le ménage**

Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé et pourcentage ne disposant pas de sel dans le ménage et, parmi les ménages dont le sel a été testé, pourcentage ayant du sel iodé selon certaines caractéristiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Parmi tous les ménages, pourcentage :			Parmi les ménages dans lesquels le sel a été testé :	
	Dont le sel a été testé	Disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé <sup>1</sup>	Ne disposant pas de sel dans le ménage	Pourcentage disposant de sel iodé	Effectif de ménages
<b>Résidence</b>					
Urbain	84,6	15,4	2 555	89,9	2 162
Rural	91,4	8,6	3 735	77,4	3 415
<b>Région</b>					
Région 1	91,1	8,9	2 106	74,5	1 920
Région 2	94,0	6,0	1 331	82,1	1 251
Région 3	81,0	19,0	1 501	89,9	1 216
Région 4	88,0	12,0	1 352	86,9	1 190
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	90,6	9,4	1 359	76,1	1 231
Second	89,5	10,5	1 252	78,2	1 121
Moyen	91,2	8,8	1 214	80,2	1 107
Quatrième	87,4	12,6	1 216	82,6	1 063
Le plus élevé	84,6	15,4	1 249	95,4	1 057
Ensemble	88,7	11,3	6 290	82,2	5 578

Tableau 11.10.1 État nutritionnel des femmes

Parmi les femmes de 15-49 ans, pourcentage ayant une taille inférieure à 145 cm, un Indice de Masse Corporelle (IMC) moyen et pourcentage ayant certains niveaux d'IMC, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Taille		Indice de Masse Corporelle <sup>1</sup>								Effectif de femmes
	Pourcentage en dessous de 145 cm	Effectif de femmes	Indice de Masse Corporelle moyen (IMC)	18,5-24,9 (Total normal)	<18,5 (Total maigre)	17,0-18,4 (Maigreux légère)	<17 (Maigreux modérée et sévère)	≥25,0 (Total en surpoids ou obèse)	25,0-29,9 (Surpoids)	≥30,0 (Obèse)	
<b>Âge</b>											
15-19	2,3	862	21,2	78,3	14,0	9,0	4,9	7,8	5,6	2,2	784
20-29	1,2	1 369	22,6	75,6	6,3	4,0	2,3	18,1	13,7	4,4	1 164
30-39	1,5	1 090	23,4	68,8	7,1	5,1	2,0	24,1	15,4	8,7	968
40-49	1,2	652	24,0	59,6	7,5	4,7	2,8	33,0	21,6	11,4	633
<b>Résidence</b>											
Urbain	0,9	1 768	23,9	65,1	6,0	3,8	2,1	28,9	18,0	10,9	1 625
Rural	2,0	2 205	21,8	76,9	10,5	7,0	3,5	12,6	10,2	2,5	1 925
<b>Région</b>											
Région 1	1,3	1 411	21,9	76,9	9,8	6,5	3,3	13,2	10,1	3,1	1 228
Région 2	2,3	768	22,7	70,9	9,0	6,6	2,4	20,1	14,8	5,3	687
Région 3	1,0	1 076	24,1	64,9	5,9	3,9	2,0	29,3	17,2	12,0	995
Région 4	1,9	717	22,4	72,0	9,1	5,1	3,9	19,0	14,3	4,7	639
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	1,8	2 098	22,6	72,5	8,5	5,9	2,6	19,0	13,7	5,2	1 847
Primaire	2,1	546	22,7	71,3	8,4	5,6	2,8	20,3	13,1	7,2	482
Secondaire ou plus	1,0	1 329	23,0	70,0	8,3	4,9	3,4	21,7	14,1	7,7	1 220
<b>Quintiles de bien-être économique</b>											
Le plus bas	2,4	685	21,5	78,3	11,4	6,5	4,9	10,3	8,4	1,9	586
Second	1,5	725	21,8	76,3	10,5	8,4	2,1	13,2	10,8	2,3	629
Moyen	1,7	804	22,3	76,1	9,3	5,3	4,0	14,7	10,3	4,4	719
Quatrième	0,8	867	23,1	68,9	6,5	4,5	2,0	24,7	17,6	7,1	794
Le plus élevé	1,5	891	24,5	61,4	5,9	4,0	1,8	32,7	19,2	13,5	821
Ensemble	1,5	3 973	22,8	71,5	8,4	5,5	2,9	20,1	13,8	6,3	3 549

Note : L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est le ratio du poids en kilogrammes par rapport au carré de la taille en mètres (kg/m<sup>2</sup>).

<sup>1</sup>Sont exclues les femmes enceintes et les femmes ayant eu une naissance dans les 2 mois précédents.

**Tableau 11.10.2 État nutritionnel des hommes**

Parmi les hommes de 15-49 ans, Indice de Masse Corporelle (IMC) moyen et pourcentage ayant certains niveaux d'IMC, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Indice de Masse Corporelle								Effectif d'hommes
	Indice de Masse Corporelle moyen (IMC)	18,5-24,9 (Total normal)	<18,5 (Total maigre)	17,0-18,4 (Maigreux légère)	<17 (Maigreux modérée et sévère)	≥25,0 (Total en surpoids ou obèse)	25,0-29,9 (Surpoids)	≥30,0 (Obèse)	
<b>Âge</b>									
15-19	20,1	68,8	29,0	21,0	8,0	2,3	1,6	0,6	718
20-29	21,5	89,7	6,3	5,3	0,9	4,0	3,9	0,2	965
30-39	22,0	83,7	5,8	5,0	0,8	10,5	8,7	1,8	843
40-49	22,2	77,9	8,2	6,5	1,7	13,9	9,2	4,7	596
<b>Résidence</b>									
Urbain	21,6	79,5	12,5	10,0	2,5	8,0	5,8	2,2	1 517
Rural	21,3	82,4	11,0	8,2	2,9	6,5	5,5	1,0	1 604
<b>Région</b>									
Région 1	21,2	78,5	14,0	10,8	3,2	7,5	6,1	1,3	1 008
Région 2	21,8	81,3	8,9	6,6	2,3	9,7	7,3	2,4	574
Région 3	21,7	82,0	11,4	9,8	1,6	6,7	4,7	1,9	954
Région 4	21,1	83,4	11,2	7,2	3,9	5,4	4,9	0,5	586
<b>Niveau d'instruction</b>									
Aucun	21,5	80,9	10,3	7,7	2,6	8,8	7,6	1,2	1 175
Primaire	21,1	79,4	16,1	12,3	3,8	4,5	3,5	1,0	381
Secondaire ou plus	21,4	81,5	11,8	9,3	2,5	6,8	4,8	2,0	1 565
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	21,0	81,8	12,9	9,6	3,4	5,3	5,2	0,0	522
Second	21,2	81,6	11,9	9,7	2,3	6,5	5,8	0,7	551
Moyen	21,4	80,3	12,2	8,3	4,0	7,5	5,9	1,6	555
Quatrième	21,5	78,7	14,0	11,0	3,0	7,3	5,0	2,3	629
Le plus élevé	21,8	82,3	9,0	7,5	1,5	8,8	6,2	2,5	864
Ensemble 15-49	21,4	81,0	11,7	9,1	2,7	7,3	5,7	1,6	3 121
50-59	22,1	70,3	12,7	10,0	2,7	17,0	13,1	3,9	304
Ensemble 15-59	21,5	80,1	11,8	9,1	2,7	8,1	6,3	1,8	3 425

Note : L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est le ratio du poids en kilogrammes par rapport au carré de la taille en mètres (kg/m<sup>2</sup>).

**Tableau 11.11.1 Prévalence de l'anémie parmi les femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans atteintes d'anémie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Anémie selon le niveau d'hémoglobine					Effectif de femmes
	Non enceinte	Anémie	Légère	Modérée	Sévère	
		<12,0 g/dl	0,0-11,9 g/dl	7,0-9,9 g/dl	< 7,0 g/dl	
	Enceinte	<11,0 g/dl	10,0-10,9 g/dl	7,0-9,9 g/dl	< 7,0 g/dl	
<b>Âge</b>						
15-19		47,1	35,8	11,0	0,4	846
20-29		40,4	31,4	8,6	0,4	1 361
30-39		42,2	34,2	7,5	0,5	1 076
40-49		40,2	32,2	7,0	1,0	640
<b>Nombre d'enfants déjà nés</b>						
0		40,5	32,0	8,1	0,3	986
1		40,5	30,0	10,5	0,1	575
2-3		43,5	34,3	8,8	0,4	942
4-5		40,0	32,6	6,6	0,8	764
6+		47,6	37,1	9,5	0,9	656
<b>Maternité</b>						
Enceinte		55,7	24,0	30,5	1,2	332
Allaite		46,3	38,5	7,4	0,4	933
Ni l'un, ni l'autre		39,2	32,6	6,2	0,5	2 658
<b>Utilise un DIU</b>						
Oui		*	*	*	*	7
Non		42,3	33,2	8,5	0,5	3 916
<b>Statut tabagique<sup>1</sup></b>						
Fume des cigarettes		44,7	31,2	13,5	0,0	308
Ne fume pas		42,0	33,4	8,1	0,5	3 612
		*	*	*	*	3
<b>Résidence</b>						
Urbain		34,9	27,7	6,7	0,6	1 740
Rural		48,2	37,7	10,0	0,4	2 183
<b>Région</b>						
Région 1		50,6	38,7	11,6	0,4	1 391
Région 2		47,4	38,5	8,5	0,3	757
Région 3		27,6	23,0	4,3	0,3	1 063
Région 4		42,5	32,2	9,0	1,3	712
<b>Niveau d'instruction</b>						
Aucun		45,7	35,4	9,7	0,6	2 076
Primaire		47,0	37,5	9,1	0,4	542
Secondaire ou plus		35,0	28,0	6,5	0,4	1 305
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas		51,9	41,0	10,2	0,7	683
Second		48,7	37,7	10,7	0,4	720
Moyen		45,8	35,2	10,1	0,6	786
Quatrième		40,5	31,7	8,4	0,4	859
Le plus élevé		28,1	23,3	4,4	0,4	874
<b>Ensemble</b>		42,3	33,2	8,6	0,5	3 923

Note : La prévalence est ajustée en fonction de l'altitude et du statut tabagique, si l'information est disponible, en utilisant les formules du CDC, 1998. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 11.11.2 Prévalence de l'anémie parmi les hommes**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans atteints d'anémie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Anémie <13,0 g/dl	Effectif d'hommes
<b>Âge</b>		
15-19	39,2	708
20-29	24,9	946
30-39	27,0	818
40-49	28,9	584
<b>Statut tabagique</b>		
Fume des cigarettes, tabac	33,8	776
Ne fume pas	28,1	2 280
<b>Résidence</b>		
Urbain	22,8	1 471
Rural	35,8	1 586
<b>Région</b>		
Région 1	38,1	1 005
Région 2	33,7	558
Région 3	16,9	917
Région 4	30,7	576
<b>Niveau d'instruction</b>		
Aucun	35,8	1 145
Primaire	31,9	370
Secondaire ou plus	24,3	1 542
<b>Quintiles de bien-être économique</b>		
Le plus bas	41,5	516
Second	34,5	538
Moyen	33,7	554
Quatrième	24,8	616
Le plus élevé	19,7	832
Ensemble 15-49	29,6	3 056
50-59	40,9	299
Ensemble 15-59	30,6	3 356

Note : La prévalence est ajustée en fonction et du statut tabagique, si l'information est disponible, en utilisant les formules du CDC, 1998.

**Tableau 11.12 Consommation de micronutriments par les mères**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, pendant la grossesse de leur dernier enfant et pourcentage qui ont pris des vermifuges au cours de la grossesse de leur dernier enfant et parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête et qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Parmi les femmes ayant eu un enfant dans les 5 dernières années :

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu une dose de vitamine A post-partum <sup>1</sup>	Nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, en comprimés ou en sirop, au cours de la grossesse de leur dernière naissance						Pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges durant la grossesse de la dernière naissance	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant eu un enfant dans les 5 dernières années qui vivent dans un ménage dans lequel le sel a été testé :	
		Aucun	<60	60-89	90+	Ne sait pas/manquant	Total			Pourcentage vivant dans un ménage disposant de sel iodé <sup>2</sup>	Effectif de femmes
<b>Âge</b>											
15-19	77,5	5,6	26,1	9,7	35,4	23,1	100,0	70,8	431	82,9	382
20-29	79,0	4,6	28,4	9,9	32,0	25,1	100,0	75,3	1 930	83,2	1 775
30-39	78,4	5,4	27,6	7,9	31,6	27,5	100,0	73,5	1 403	81,2	1 247
40-49	78,9	5,5	27,7	10,5	33,1	23,2	100,0	72,3	412	84,4	380
<b>Résidence</b>											
Urbain	80,2	3,6	21,9	8,6	41,6	24,4	100,0	77,0	1 468	90,5	1 297
Rural	77,8	5,9	31,1	9,7	27,3	26,1	100,0	72,2	2 709	78,5	2 487
<b>Région</b>											
Région 1	75,4	8,3	30,8	8,0	28,0	24,9	100,0	71,4	1 542	75,2	1 423
Région 2	83,8	2,8	31,3	12,2	23,6	30,1	100,0	82,4	896	83,1	854
Région 3	84,3	5,6	22,7	6,8	41,0	23,9	100,0	80,3	816	90,6	686
Région 4	74,0	1,4	24,2	10,7	40,3	23,4	100,0	64,3	922	88,2	821
<b>Niveau d'instruction</b>											
Aucun	76,6	5,3	29,0	9,7	29,0	27,0	100,0	71,3	2 714	80,1	2 464
Primaire	80,0	5,3	29,3	9,8	32,6	23,0	100,0	74,9	583	82,9	524
Secondaire ou plus	84,1	4,2	23,4	7,5	42,4	22,5	100,0	81,3	880	90,1	796
<b>Quintiles de bien-être économique</b>											
Le plus bas	74,6	4,5	30,1	11,9	27,7	25,8	100,0	68,2	917	78,5	835
Second	75,9	7,0	33,2	8,5	25,2	26,0	100,0	74,1	888	77,4	797
Moyen	80,1	6,0	31,7	8,7	28,9	24,7	100,0	73,8	864	81,3	809
Quatrième	80,9	3,8	22,3	9,5	38,5	25,9	100,0	73,6	832	83,6	763
Le plus élevé	83,1	3,6	19,7	7,2	44,5	24,9	100,0	81,9	675	96,2	581
Ensemble	78,6	5,1	27,9	9,3	32,3	25,5	100,0	73,9	4 177	82,6	3 784

<sup>1</sup> Dans les 2 premiers mois après l'accouchement de la dernière naissance

<sup>2</sup> Non compris les femmes des ménages dont le sel n'a pas été testé.