

# Automatismes en première 2022/2023

Frédéric Junier

Lycée du Parc  
1 Boulevard Anatole France  
69006 Lyon

7 septembre 2022

# Plan

- 1 Calcul
- 2 Second degré
- 3 Dérivation locale
- 4 Dérivation Globale
- 5 Suites numériques
- 6 Application du produit scalaire

# Automatisme 1 *thème : Puissances*

- ❶ Écrire  $(3^2 \times 3^5)^4$  sous la forme d'une puissance de 3.
- ❷ Soit  $ABC$  un triangle rectangle en  $A$  tel que  $AB = 5$  et  $BC = 13$ , calculer la longueur  $AC$ .
- ❸ Simplifier  $(2\sqrt{3})^4$
- ❹ Simplifier  $\frac{4+\sqrt{60}}{2}$
- ❺ Soit  $a$  et  $b$  des réels avec  $b \geq 0$ , simplifier  $\frac{a-\sqrt{b}}{2} - \frac{-a+\sqrt{b}}{2}$
- ❻ Développer et réduire  $\left(\frac{a+b+c}{2}\right)^2 - \left(\frac{a+b-c}{2}\right)^2$

## Automatisme 2 thème : Fractions

Réduire au même dénominateur et simplifier les expressions suivantes définies pour l'indéterminée  $x$  ou  $n$ .

- $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

- $\frac{1}{n-4} - n$

- $\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$

- $\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$

- $\frac{1}{x} + \frac{x+2}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x}$

## Automatisme 3 thème : Factoriser

Soit  $a$  un réel.

- Factoriser  $a^4 - 16$
- Factoriser  $a^2 - 1 + 3a - 3$  par  $a - 1$
- Factoriser  $2a^2 + 5a + 2$  par  $a + 2$
- Factoriser  $a^2 + a - 2$
- Factoriser  $a^2 + a - 6$

# Plan

- 1 Calcul
- 2 Second degré
- 3 Dérivation locale
- 4 Dérivation Globale
- 5 Suites numériques
- 6 Application du produit scalaire

## Automatisme 4 thème : Résoudre une équation du second degré

- Déterminer le nombre de solutions dans  $\mathbb{R}$  de l'équation  $x^2 = m$  si  $m > 0$
- Déterminer le nombre de solutions dans  $\mathbb{R}$  de l'équation  $x^2 = m$  si  $m = 0$
- Déterminer le nombre de solutions dans  $\mathbb{R}$  de l'équation  $x^2 = m$  si  $m < 0$
- Résoudre mentalement dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^2 = 9$
- Résoudre mentalement dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(x - 1)^2 = 9$
- Résoudre mentalement dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $16 - (x - 1)^2 = 7$

## Automatisme 5 *thème : Déterminer l'axe de symétrie d'une parabole*

- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole d'équation  $y = x^2$
- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole d'équation  $y = 3 - x^2$
- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole d'équation  $y = (x - 3)^2$
- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole d'équation  $y = (x + 3)^2$
- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole d'équation  $y = (3 - x)^2 - 1$
- Déterminer l'axe de symétrie de la parabole d'équation  $y = -3x^2 - 6x + 1$



## Automatisme 6 *thème : Déterminer les racines d'un trinôme*

- Déterminer les racines du trinôme d'expression  
 $f(x) = -3(x+2)(1-x)$
- Déterminer les racines du trinôme d'expression  $f(x) = 16 - x^2$
- Déterminer les racines du trinôme d'expression  $f(x) = x^2 + 1$
- Déterminer les racines du trinôme d'expression  
 $f(x) = 16 - (x-1)^2$

## Automatisme 7 thème : second degré

Pour chacun des trinômes suivants déterminer le signe de son discriminant sans le calculer.

- $f_1$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f_1(x) = x^2 + 100$
- $f_2$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f_2(x) = (x - 100)^2$
- $f_3$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f_3(x) = (x + 100)^2$
- $f_4$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f_4(x) = x^2 - 100$

# Plan

- 1 Calcul
- 2 Second degré
- 3 Dérivation locale**
- 4 Dérivation Globale
- 5 Suites numériques
- 6 Application du produit scalaire

## Automatisme 8 *thème : dérivation locale*

Soit  $f$  la fonction définie sur  $] -\infty; 0[$  par  $f(x) = \frac{1}{x}$ .

- Soit un réel  $a < 0$  et un réel  $h \neq 0$  tel que  $a + h < 0$ , démontrer que  $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{-h}{(a+h)a}$ .
- En déduire que  $f$  est dérivable en tout réel  $a < 0$  et déterminer l'expression de  $f'(a)$ .
- Déterminer une équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $-2$ .

# Plan

- 1 Calcul
- 2 Second degré
- 3 Dérivation locale
- 4 Dérivation Globale**
- 5 Suites numériques
- 6 Application du produit scalaire

## Automatisme 9 *thème : dérivation*

Déterminer une expression de la fonction dérivée pour la fonction  $f$  dérivable sur l'intervalle  $I$ .

- $f : x \mapsto \frac{x^3-1}{5x^2+1}$  sur  $\mathbb{R}$  ;
- $f : x \mapsto x^2\sqrt{x}$  sur  $]0; +\infty[$  ;
- $f : x \mapsto (8-3x)^7$  sur  $]0; +\infty[$  ;
- $f : x \mapsto 4x - \frac{1}{x-3}$  sur  $]3; +\infty[$ .

## Automatisme 10 *thème : dérivation*

Soit  $f$  une fonction dérivable sur  $[-8; 6]$  dont on donne le tableau de variation ci-dessous.

$x$	-8	-5	2	3	6
$f(x)$	4	0	-1	0	

- 1 Dresser le tableau de signes de la fonction dérivée  $f'$  de  $f$  sur l'intervalle  $[-8; 6]$ .
- 2 Dresser le tableau de variations d'une fonction  $F$  dérivable sur l'intervalle  $[-8; 6]$  et dont la dérivée est  $f$ .

## Automatisme 11 *thème : dérivation*

Déterminer une expression de la fonction dérivée pour la fonction  $f$  dérivable sur l'intervalle  $I$ .

- $f : x \mapsto \sqrt{3x+1}$  sur  $]-\frac{1}{3}; +\infty[$  ;
- $f : x \mapsto (5x-3)\sqrt{x}$  sur  $]0; +\infty[$  ;
- $f : x \mapsto (605x-3)^{607}$  sur  $\mathbb{R}$  ;
- $f : x \mapsto \frac{1}{3} - \frac{2}{3-x}$  sur  $]3; +\infty[$ .



# Plan

- 1 Calcul
- 2 Second degré
- 3 Dérivation locale
- 4 Dérivation Globale
- 5 Suites numériques**
- 6 Application du produit scalaire

## Automatisme 12 *thème : suites*

- Soit la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_n = n^2 - n$ . Calculer  $u_4$  et  $u_7$ .
- Soit la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_0 = 4$  et  $u_{n+1} = 2u_n - 1$ . Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
- Soit la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par  $u_0 = 1$  et  $u_n = u_{n-1} - n + 1$ . Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

## Automatisme 13 *thème : suites*

```
#On définit la suite (Un) par  $U_n=f(n)$   
def f(n):  
    if n==0:  
        return 1  
    else:  
        return 1/n**2  
# n**2 signifie le carré de n
```

Interpréteur en ligne :

<https://repl.it/@Reformelycee/suite-explicite>.

- $u_0 = 1$  Vrai ou Faux ?
- $u_1 = 0,5$  Vrai ou Faux ?
- $u_{50} = 0,0004$  Vrai ou Faux ?
- La suite n'est pas définie en 0. Vrai ou Faux ?

# Plan

- 1 Calcul
- 2 Second degré
- 3 Dérivation locale
- 4 Dérivation Globale
- 5 Suites numériques
- 6 Application du produit scalaire

## Automatisme 14 *thème : Application du produit scalaire*

On se place dans un repère orthonormé.  
Dans chacun des cas suivants, dire si les  
vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.

a.  $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$


b.  $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \end{pmatrix}$

c.  $\vec{u} \begin{pmatrix} \sqrt{10} \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{5} \end{pmatrix}$

## Automatisme 15 *thème* : Application du produit scalaire

Dans le repère orthonormé ci-dessous, les points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  ont des coordonnées entières.

Les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont-elles perpendiculaires ?



## Automatisme 16 *thème : Application du produit scalaire*


Soit  $\widehat{ABC}$  un triangle tel que  $AB = 4$ ,  $AC = 5$   
et  $\widehat{BAC} = 60^\circ$ .

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dots$$

## Automatisme 17 thème : Application du produit scalaire

### QCM une seule réponse exacte

$ABCD$  est un rectangle de centre  $O$  tel que  $AB = 4$  et  $AD = 2$ .



$\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{AB}$  vaut :

☒ **a** 8

☐ **b** -8

☐ **c**  $-4\sqrt{5}$



## Automatisme 18 thème : Application du produit scalaire


### VRAI ou FAUX

$ABCD$  est un carré  
de centre  $O$  et de côté 1.  
Indiquer si les égalités suivantes  
sont vraies ou fausses.

a.  $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$


b.  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$

c.  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$



## Automatisme 19 *thème : Application du produit scalaire*

Calculer la valeur exacte de la longueur  $BC$ .



## Automatisme 20 thème : Application du produit scalaire

### QCM une seule réponse exacte

$A$  et  $B$  sont deux points distincts.

L'ensemble des points  $M$  vérifiant  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$  :

- ☐ a) est une droite ;
- ☐ b) est un cercle ;
- ☐ c) n'est ni une droite ni un cercle.

## Automatisme 21 *thème : Application du produit scalaire*

### QCM une seule réponse exacte

$A$  et  $B$  sont deux points distincts.

L'ensemble des points  $M$  vérifiant  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$  :

- a** est une droite ;
- b** est un cercle ;
- c** n'est ni une droite ni un cercle.