






after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
10^{-3}
10^{-4}
ratio
3
2
1
0
500
600
700
800
900
1000
jet p_T [GeV]



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
ratio
3
2
1
0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
jet η



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
ratio
3
2
1
0
50
100
150
200
250
jet mass [GeV]



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
ratio
3
2
1
0
30
40
50
60
70
80
90
100
constituent multiplicity



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
ratio
girth
0
1
2
3
4
5
6
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
ratio
τ_1
0
1
2
3
4
5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
0
2
4
6
8
10
ratio
0
1
2
3
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
τ_2



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
ratio
τ_3



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
ratio
τ_{21}



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
ratio
τ_{32}



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
ratio
C_2
0
1
2
3
4
5
6
7
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
ratio
0
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
D_2


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
ratio
N_2
0
2
4
6
8
0
1
2
3
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
ratio
3
2
1
0
50
100
150
200
250
soft-drop mass [GeV]


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
ratio
z_g
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
$b\bar{b}b\bar{b}$: 24375
$t\bar{t}b\bar{b}$: 13648
normalised to unit area
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
ratio
3
2
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
R_g