

GSRTC કંડક્ટર ફર્સ્ટ એઇડ સર્ટિફિકેટ સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

બેઝિક થી એડવાન્સ પરીક્ષા લક્ષી અભ્યાસક્રમ અને રીયલ-લાઇફ ઉદાહરણો

GSRTC કંડક્ટરની ભરતી પ્રક્રિયા અને નોકરીની ફરજો દરમિયાન **ફર્સ્ટ એઇડ (પ્રથમ સારવાર) સર્ટિફિકેટ** અને તેની તાલીમ સૌથી મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. મુસાફરી દરમિયાન કોઈ અકસ્માત કે મેડિકલ ઈમરજન્સી થાય ત્યારે કંડક્ટરે કઈ રીતે કામગીરી કરવી તેની સંપૂર્ણ સૈદ્ધાંતિક (Theory) અને પ્રાયોગિક (Practical) માહિતી આ દસ્તાવેજમાં સમાવવામાં આવી છે.

૧. સર્ટિફિકેટ મેળવવાની પ્રક્રિયા અને નિયમો

- **માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા:** ગુજરાતમાં કંડક્ટર લાયસન્સ માટે માત્ર **ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી (Indian Red Cross Society)** અથવા સેન્ટ જોન એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા પ્રમાણિત સર્ટિફિકેટ જ માન્ય ગણાય છે.
- **તાલીમનો સમયગાળો:** સામાન્ય રીતે ૩ થી ૮ દિવસ (લઘુત્તમ ૧૬ કલાક) ના પ્રાયોગિક વર્ગો એટેન્ડ કરવાના હોય છે.
- **માન્યતા સમયગાળો:** શરૂઆતમાં ૧ વર્ષનું પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ મળે છે, જેના આધારે RTO કંડક્ટર લાયસન્સ ઇસ્યુ કરે છે. ત્યારબાદ ઓરિજિનલ સિનિયર પ્રોફેશનલ સર્ટિફિકેટ એનાયત થાય છે જે **૩ વર્ષ** માટે માન્ય રહે છે.

૨. પ્રાથમિક તપાસ માટેનો ગોલ્ડન રૂલ: DRABC પ્રક્રિયા

અકસ્માત સ્થળે અથવા ચાલુ બસમાં કોઈ મુસાફર અચાનક ઢળી પડે ત્યારે આ ક્રમમાં જ તપાસ થવી જોઈએ. પરીક્ષામાં આ સિક્વન્સ વારંવાર પૂછાય છે:

⚠ DRABC પદ્ધતિ અને બસ લાઇફ ઉદાહરણ:

1. **D - Danger (જોખમ તપાસો):** બસનો અકસ્માત થાય ત્યારે સૌથી પહેલા જુઓ કે બસ ચાલુ હાઇવેની વચ્ચે છે કે આસપાસ આગ કે શોર્ટ-સર્કિટનું જોખમ છે? પોતાને અને મુસાફરને સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડો.
2. **R - Response (પ્રતિભાવ):** દર્દીના બંને ખભા હળવેથી હલાવીને જોરથી પૂછો, "તમે ઠીક છો? તમારું નામ શું છે?"
3. **A - Airway (શ્વાસનળી ખોલવી):** જો દર્દી બેભાન હોય તો તેની જીભ પાછળ નમીને શ્વાસનળી બંધ ન કરે તે માટે એક હાથ કપાળ પર રાખી અને બીજા હાથની આંગળીથી હડપચી (Chin) ઉપર કરી માથું પાછળ નમાવો (Head-Tilt, Chin-Lift પદ્ધતિ).
4. **B - Breathing (શ્વાસ ચેક કરવો):** ૧૦ સેકન્ડ સુધી તમારો કાન દર્દીના નાક પાસે રાખીને શ્વાસ જુઓ (Look), સાંભળો (Listen) અને અનુભવો (Feel).
5. **C - Circulation (લોહીનું પરિભ્રમણ):** જો શ્વાસ બંધ હોય, તો તેનો અર્થ હૃદય બંધ છે. તરત જ ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સને ફોન કરી CPR શરૂ કરો.

૩. ઉંમર પ્રમાણે હૃદયના ધબકારા (૧ મિનિટમાં)

પરીક્ષા અને મેડિકલ સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ ઉંમર પ્રમાણે નાડી / હૃદયના ધબકારા નીચે મુજબ પ્રમાણિત છે (તમારા મેડમના સચોટ સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ):

ઉંમર (Age Group)	સામાન્ય ધબકારા (૧ મિનિટમાં)	તબીબી નોંધ / કારણ
૧ દિવસ થી ૧ મહિનો (નવજાત બાળક)	૧૩૦ થી ૧૬૦	બાળકોનું હૃદય કદમાં નાનું હોવાથી અને લોહી પમ્પ કરવાની ક્ષમતા ઓછી હોવાથી તે વધુ ઝડપથી ધબકે છે.
૨૫ થી ૫૦ વર્ષ (વયસ્ક / Adult)	૭૦ થી ૮૦	સામાન્ય આરામની સ્થિતિમાં તંદુરસ્ત ભારતીય વ્યક્તિના પ્રમાણભૂત ધબકારા.
૫૦ વર્ષથી વધુ ઉંમર (Seniors)	૭૦ થી ઓછા (< 70)	ઉંમર વધવાની સાથે હૃદયના સ્નાયુઓ ધીમા પડતા ધબકારા લોઅર સાઇડ પર શાંત થાય છે.

૪. બોડી પલ્સ મેપિંગ (શરીરમાં નાડી માપવાના સ્થાનો)

દર્દીની સ્થિતિ અને ઉંમરના આધારે કંડક્ટરે અલગ-અલગ સ્થાનો પરથી નાડી તપાસવાની હોય છે:

- **કેરોટિડ પલ્સ (Carotid Pulse - ગળા પર):** શ્વાસનળીની બરાબર બાજુમાં ખાંચામાં આવેલી હોય છે. **બેભાન દર્દી** માટે હંમેશા CPR શરૂ કરતા પહેલા આ જ પલ્સ ચેક કરાય છે.
- **રેડિયલ પલ્સ (Radial Pulse - કાંડા પર):** હથેળીની નીચે અંગૂઠાની લાઈનમાં કાંડાના ભાગ પર. આ **સભાન (હોશમાં હોય તેવા)** દર્દીની સામાન્ય તપાસ માટે વપરાય છે.
- **બ્રેકિયલ પલ્સ (Brachial Pulse - હાથની અંદરની તરફ):** કોણીના સાંધાની અંદરની બાજુએ. **૧ વર્ષથી નાના બાળકો** ની તપાસ માટે આ સ્થાન શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે તેમનું ગળું ટૂંકું હોવાથી કેરોટિડ પલ્સ મળતી નથી.

નોંધ: નાડી માપવા માટે ક્યારેય પોતાના અંગૂઠાનો ઉપયોગ ન કરવો, હંમેશા તર્જની અને મધ્યમા (બે આંગળીઓ) નો ઉપયોગ કરવો.

૫. બેઝિક થી એડવાન્સ પ્રથમ સારવાર પ્રક્રિયાઓ (રીયલ-લાઇફ ઉદાહરણો)

એ. CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) – એડવાન્સ લાઇફ સપોર્ટ

રીયલ-લાઇફ ઉદાહરણ: ચાલુ બસમાં ગરમી કે અતિશય થાકને લીધે એક મુસાફર અચાનક સીટ પર ઢળી પડે છે અને તેનો શ્વાસ બંધ થઈ જાય છે.

પ્રક્રિયા: દર્દીને બસની ગેલેરીમાં ચત્તો સુવડાવો. તમારા મજબૂત હાથની હથેળી છાતીની મધ્યમાં સ્ટર્નડીટની વચ્ચે (Chest Bone પર) રાખી આંગળીઓ લોક કરો. કોણી સીધી રાખી ૨ થી ૨.૪ ઇંચ જેટલી છાતી ૧ મિનિટમાં ૧૦૦ થી ૧૨૦ વાર ઝડપે દબાવો. **૩૦ વખત છાતી દબાવ્યા પછી ૨ વખત ક્યુટ્રિમ શ્વાસ આપો (રેશિયો ૩૦:૨).** એમ્બ્યુલન્સ ન આવે ત્યાં સુધી આ ચક્ર સતત ચાલુ રાખો.

બી. ચોકિંગ (Choking - ગળામાં કંઈક ફસાવું)

રીયલ-લાઇફ ઉદાહરણ: ચાલુ બસમાં કોઈ મુસાફર ચણા કે સિંગ ખાતો હોય અને અચાનક બ્રેક વાગતા તે શ્વાસનળીમાં ફસાઈ જાય અને તે બોલી કે શ્વાસ ન લઈ શકે.

પ્રક્રિયા (Heimlich Maneuver): મુસાફરની પાછળ ઊભા રહી તમારા બંને હાથ તેના પેટ પર (નાભિથી સહેજ ઉપર) લાવો. એક હાથની મુઠ્ઠી વાળી, બીજા હાથથી તેને પકડીને **અંદર અને ઉપરની તરફ (Inward and Upward)** જોરથી ધક્કો મારો જેથી ફેફસાના વાયુના દબાણથી વસ્તુ બહાર ફેંકાઈ જાય.

સી. ગંભીર રક્તસ્રાવ (Severe Bleeding Control)

રીયલ-લાઇફ ઉદાહરણ: બસનો કાચ તૂટવાથી મુસાફરના હાથની નસ કપાઈ જાય અને પુષ્કળ લોહી વહે છે.

પ્રક્રિયા: ફર્સ્ટ એઇડ કીટમાંથી જંતુરહિત ગોઝ (૩/૬પડું) ઘા પર મૂકી સીધું દબાવવા (Direct Pressure) આપો. જો લોહી બંધ ન થાય, તો ઘાથી ૨ ઇંચ ઉપર કપડાની પટ્ટી મજબૂત રીતે બાંધી દો (ટોર્નિકેટ - Tourniquet પદ્ધતિ) અને ઇજાગ્રસ્ત ભાગને હૃદયના સ્તરથી ઊંચો કરો.

ડી. ફ્રેક્ચર અને મચકોડ (Fracture)

રીયલ-લાઇફ ઉદાહરણ: બસના ફૂટબોર્ડ પરથી ઉતરતા મુસાફરનો પગ સરકી જાય અને હાડકું તૂટી જાય.

પ્રક્રિયા (RICE અને Splinting): દર્દીને આરામ આપો (Rest). બસમાં રહેલી લાકડી કે જાડા પૂંઠાનો સપોર્ટ તૂટેલા હાડકાની બંને બાજુ આપી પાટો બાંધો (Splint) જેથી હાડકું બિલકુલ હલે નહીં. સોજો ઉતારવા બરફ (Ice) નો શેક કરો.

૬. દાઝી જવાના પ્રકારો (Degrees of Burns)

- ફર્સ્ટ ડિગ્રી (First-Degree):** ત્વચાનું માત્ર ઉપરનું પડ દાઝે છે, ત્વચા લાલ થાય અને બળતરા થાય. ૧૦-૧૫ મિનિટ વહેતું ઠંડુ પાણી રેડવું.
- સેકન્ડ ડિગ્રી (Second-Degree):** ત્વચા પર પાણી ભરેલા ફોલ્લા (Blisters) પડે છે. ફર્સ્ટ એઇડર તરીકે ફોલ્લા ક્યારેય ફોડવા નહીં, ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે.
- થર્ડ ડિગ્રી (Third-Degree):** ત્વચા આખી કાળી કે ચામડા જેવી કડક થઈ જાય છે. નસો (Nerves) બળી જવાથી દર્દીને આ ભાગમાં દુખાવો થતો નથી. દર્દીને સ્વચ્છ સૂકી યાદર ઓઢાડી હોસ્પિટલ ખસેડવો.

૭. ફર્સ્ટ એઇડ કીટની જરૂરી વસ્તુઓ (First Aid Kit Contents)

વસ્તુનું નામ	મુખ્ય ઉપયોગ
રોલર બેન્ડેજ અને ગોઝ સ્વેબ	ઘા સાફ કરવા, લોહી રોકવા અને પાટો બાંધવા માટે.
એન્ટીસેપ્ટીક લોશન (Dettol / Savlon)	ચેપ (Infection) મુક્ત કરવા માટે ઘા સાફ કરવા.
ત્રિકોણાકાર પટ્ટી (Triangular Bandage)	હાથ કે ખભાના ફ્રેક્ચરમાં ઝોળી (Sling) કે સપોર્ટ બનાવવા.
મેડિકલ કાતર અને ચીપિયો	પટ્ટી કાપવા કે ત્વચામાંથી કાચ/કાંટો કાઢવા માટે.
ડિસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્સ અને CPR માસ્ક	પ્રથમ સારવાર આપનારની પોતાની સુરક્ષા અને સ્વચ્છતા માટે.