

		Modelo Mortalidade 21D Agregadas Contínuas - EDA			
					EDA
	Seção	Variável	Domínio de valores	Regra de transformação aplicada	
		idPaciente	Numérico contínuo maior que zero.	Regra: Nenhuma	
	Perfil	cSexo	0: Masculino 1: Feminino	Regra: substituição dos valores 'F' e 'M' para valores numéricos.	
	Perfil	cFaixaEtaria	1: 18 <= idade (em anos) < 50 2: 50 <= idade (em anos) < 60 3: 60 <= idade (em anos) < 70 4: 70 <= idade (em anos) < 80 5: idade (em anos) >= 80	Enquadramento da idade do paciente medida em anos em uma das faixas estabelecidas.	
	Perfil	cFaixaIMC	1: 18.5 < IMC 2: 18.5 <= IMC < 25.0 3: 25.0 <= IMC < 30.0 4: 30.0 <= IMC < 35.0 5: 35.0 <= IMC < 40.0 6: IMC > 40.0	Enquadramento do IMC calculado em uma das faixas estabelecidas.	
	Variáveis Clínicas	cSinalSomaBH72h	0: Não foi encontrada anotação no período 1: Foi encontrada alguma anotação e a soma é negativa 2: Foi encontrada alguma anotação e a soma é zero 3: Foi encontrada alguma anotação e a soma é positiva	Regra: Soma de todas as anotações de balanço hídrico ocorridas dentro das primeiras 72h de internação calculadas a partir da data/hora de internação na UTI. Desconsiderado saldo anterior a internação.	
	Variáveis Clínicas	cTendenciaBH72h	0: Estável: se não houve mudança no padrão do sinal na soma diária nos três primeiros dias (combinações (000, ---); 1: Negativa: para as seguintes combinações (00-, +00, +0-, ++0, ++-, +--, 0--); 2: Positiva: para as seguintes combinações (+++, 00+, 0++, --0, -00, --+, -0+, -++); 3: Indefinida: para as seguintes combinações (0+0, 0+-, +0+, -0-, +-+, +0, 0-+, 0-0, -+-, -+0) ou quando não há anotação para algum dia;	Regra: Buscar a combinação do saldo diário do BH do paciente nos primeiro 3 dias.	
	Variáveis Clínicas	cTendenciaBHPeriodo	0: Não possui quantidade mínima de anotações que possibilite identificar uma tendência (mínimo de três); 1: Não varia o sinal e manteve-se negativo em todo o tempo; 2: Não varia o sinal e manteve-se positivo em todo o tempo; 3: Não varia o sinal e manteve-se 0 em todo o tempo; 4: Varia o sinal e a tendência é descendente; 5: Varia o sinal e a tendência é ascendente; 6: Varia o sinal e não possui tendência.	Regra: avaliar a curva de tendência ao longo do período de internamento – usar algoritmo de análise de tendência (MeanKendall) em série temporal para avaliar a mudança na soma diária (em valor).	
	Variáveis Clínicas	cSinalSomaBHPeriodo	0: Não foi encontrada anotação no período 1: Foi encontrada alguma anotação e a soma é negativa 2: Foi encontrada alguma anotação e a soma é zero 3: Foi encontrada alguma anotação e a soma é positiva	Regra: Soma de todas as anotações de balanço hídrico ocorrida no período de internação calculadas a partir da data/hora de internação na UTI. Desconsiderado saldo anterior a internação.	
		nPropDiasBHPositivo	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0. 0.0 quando não foram encontradas anotações de BH no período.	Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com BH positivo pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasDiarreia	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com diarreia pela quantidade de dias de internação em UTI.	
	Variáveis Clínicas	cFreqDiarreia	0: Não apresenta nenhum dos comportamentos citados abaixo; 1: Apresentou 4 ou mais dejeções em pelo menos 1 janela de 24h; 2: Apresentou 4 ou mais dejeções numa janela de 24h por mais de 3 dias seguidos; 3: Se repete a condição do item 2 ao longo do internamento.	Regra: A partir do cálculo diário da quantidade de anotações realizadas, identificou-se a presença de pelo menos 1 dia com 4 ou mais anotações, se esta situação se repetia nos 3 dias subsequentes. Se sim, verificou-se se este comportamento se repetiu por pelo menos 1 vez durante o período de internação na unidade.	
		nPropDiasHemodialise	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com presença em hemodiálise pela quantidade de dias de internação em UTI.	

	Variáveis Clínicas	cInicioVM	0: Sem registro de ventilação mecânica invasiva (VM) durante o período de internação 1: Primeiro registro de VM encontrado em até 24h ($\leq$) a partir da data de internação na UTI 2: Primeiro registro de VM encontrado entre 24 ($>$) e 48h ($\leq$) a partir da data de internação na UTI 3: Primeiro registro de VM encontrado entre 48 ($>$) e 72h ($\leq$) a partir da data de internação na UTI 4: Primeiro registro de VM encontrado em mais de 72h ($>$) a partir da data de internação na UTI	Regra: Calculado pela quantidade de horas decorridas entre a data/hora de internação na UTI e a data/hora de início do primeiro episódio de ventilação mecânica encontrado no período de internação na UTI, se houver.	
		nPropDiasVM	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se como anotação em ventilação mecânica invasiva (VM) os dias compreendidos entre o início e final de um registro de um episódio de VM, incluindo o primeiro e último dia. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação em VM pela quantidade de dias de internação em UTI.	
	Variáveis Clínicas	cVMReintubacao	0 - Não houve registro de re-intubação durante o período de internamento; 1 - Houve registro de re-intubação durante o período de internamento.	Regra: paciente apresenta mais de 1 registro de VM onde ele sai da ventilação mecânica (endtime) e entra novamente após 72hrs.	
	Variáveis Clínicas	cVMTempoDesmame	0 - Não teve uso ou não foi encontrada anotação; 1 - Até 24hrs ($\leq$); 2 - Entre 24hrs ($>$) e 48hrs ($\leq$); 3 - Entre 48hrs ($>$) e 72hrs ($\leq$); 4 - Acima de 72hrs ($>$).	Regra: Para cada episódio de intubação/re-intubação, contar a quantidade de dias desde o primeiro dia que ele sai da ventilação mecânica até o último dia de registro da ventilação mecânica do episódio. Depois somar a quantidade de dias de desmame obtida em cada episódio. Se o paciente sai e não volta ou re-intuba, enquadrar na faixa "até 24hrs".	
		nPropDiasHGTHiper	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 180 mg/dL como limite máximo para normalidade em anotações de Glicemia capilar (HGT). Considerou-se presença de HGTHiper nos dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de HGTHiper pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasHGTHipo	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 70 mg/dL como limite mínimo para normalidade em anotações de Glicemia capilar (HGT). Considerou-se presença de HGTHipo nos dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de HGTHipo pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasTempCorpElevada	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de temperatura elevada pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasSemUsoNora	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se o acompanhamento do uso de duas drogas vasoativas: noradrenalina e vasopressina. Foi anotado como dia livre de uso de noradrenalina (NORA) os dias que não estavam no intervalo de nenhum episódio de uso da droga. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias sem anotação de uso de NORA pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasNoraMax025	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se o acompanhamento do uso de duas drogas vasoativas: noradrenalina e vasopressina. Foi anotado como dia com uso da droga noradrenalina a 0,25 (NORA025) os dias compreendidos entre o início e final de um episódio de uso da droga cuja taxa máxima aplicada foi maior que 0,0 e até 0,25 (mcg/kg/min), incluindo o primeiro e último dia. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de uso de NORA025 pela quantidade de dias de internação em UTI.	

		nPropDiasNoraMax050	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Foi anotado como dia com uso da droga noradrenalina a 0,50 (NORA050) os dias compreendidos entre o início e final de um episódio de uso da droga cuja taxa máxima aplicada foi maior que 0,25 e até 0,50 (mcg/kg/min), incluindo o primeiro e último dia. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de uso de NORA050 pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasNoraMax050Mais	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Foi anotado como dia com uso da droga noradrenalina a mais de 0,50 (NORA050Mais) os dias compreendidos entre o início e final de um episódio de uso da droga cuja taxa máxima aplicada foi maior que 0.50 (mcg/kg/min), incluindo o primeiro e último dia. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de uso de NORA050Mais pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasUsoVaso	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se o acompanhamento do uso de duas drogas vasoativas: noradrenalina e vasopressina. Foi anotado como dia com uso da droga vasopressina (VASO) os dias compreendidos entre o início e final de um episódio de uso da droga em qualquer taxa, incluindo o primeiro e último dia. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de uso de VASO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
	Nutrição	cInicioNutri	0: Não foi encontrada anotação de administração de calorias ou proteínas durante o período estudado (NUTRIÇÃO) 1: Primeira anotação de NUTRIÇÃO encontrada nas primeiras 24h 2: Primeira anotação de NUTRIÇÃO após 24h e até em 72h 3: Primeira anotação de NUTRIÇÃO após 72h	Regra: Calcular as horas passadas até a primeira anotação referente a administração de calorias ou proteínas (NUTRIÇÃO), o que ocorrer primeiro, contadas a partir da data/hora de admissão na UTI.	
	Nutrição	cInicioProteinas	0: Não foi encontrada anotação de administração de proteínas durante o período estudado (PROTEINAS) 1: Primeira anotação de PROTEINAS encontrada nas primeiras 24h 2: Primeira anotação de PROTEINAS após 24h e até em 72h 3: Primeira anotação de PROTEINAS após 72h	Regra: primeiro dia (day) em que a ingestão de proteína foi maior que zero para cada paciente. Assume 0 (zero) quando não for encontrada anotação de proteína no período de internação na UTI.	
	Nutrição	cInicioCalorias	0: Não foi encontrada anotação de administração de calorias durante o período estudado (CALORIAS) 1: Primeira anotação de CALORIAS encontrada nas primeiras 24h 2: Primeira anotação de CALORIAS após 24h e até em 72h 3: Primeira anotação de CALORIAS após 72h	Regra: primeiro dia em que a ingestão de calorias foi maior que zero para cada paciente. Assume 0 (zero) quando não for encontrada anotação de calorias no período de internação na UTI.	
		nMediaKcalKgDia	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0.	Regra: Média para a ingestão total de calorias por Kg/Dia para cada paciente ao longo de toda a internação.	
		nMediaKcalKgDia_3d	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0.	Regra: Média apenas dos valores diferentes de zero para a ingestão de calorias por Kg/Dia dentro dos primeiros 3 dias.	
		nMediaKcalKgDia_4_7d	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0. NULL quando a quantidade de dias de internamento é <= 3.	Regra: Média apenas dos valores diferentes de zero para a ingestão de calorias por Kg/Dia dentro desta janela de 4 a 7 dias.	
		nMediaKcalKgDia_7dmais	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0. NULL quando a quantidade de dias de internamento é <= 7.	Regra: Média apenas dos valores diferentes de zero para a ingestão de calorias por Kg/Dia neste período pós-7 dias.	
		nMediaGKgDia	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0.	Regra: Média para a ingestão total de proteínas por Kg/Dia para cada paciente ao longo de toda a internação.	
		nMediaGKgDia_3d	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0.	Regra: Média apenas dos valores diferentes de zero para a ingestão de proteínas por Kg/Dia dentro dos primeiros 3 dias.	
		nMediaGKgDia_4_7d	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0. NULL quando a quantidade de dias de internamento é <= 3.	Regra: Média apenas dos valores diferentes de zero para a ingestão de proteínas por Kg/Dia dentro desta janela de 4 a 7 dias.	
		nMediaGKgDia_7dmais	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0. NULL quando a quantidade de dias de internamento é <= 7.	Regra: Média apenas dos valores diferentes de zero para a ingestão de proteínas por Kg/Dia neste período pós-7 dias.	

		nPropDiasJejumProteina	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0 (zero) e menor ou igual a 1.0.	Regra: razão entre a quantidade de dias com zero ingestão de proteínas sobre a quantidade de dias de internação (contados do dia de admissão até o penúltimo dia).	
		nQtdeDiasJejumProteina_3d	Numérico inteiro maior ou igual a 0 (zero).	Regra: número de dias com zero ingestão de proteína nos primeiros 3 dias.	
		nQtdeDiasJejumProteina_4_7d	Numérico inteiro maior ou igual a 0 (zero). NULL quando o período de internação for menor ou igual a 3.	Regra: número de dias com zero ingestão de proteína nos dias 4 a 7.	
		nPropDiasJejumCalorias_7dmais	Numérico contínuo na faixa de 0,0 a 1,0. NULL quando o período de internação for menor que 8 dias.		
		nPropDiasJejumCalorias	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0 (zero) e menor ou igual a 1.0.	Regra: razão entre a quantidade de dias com zero ingestão de calorias sobre a quantidade de dias de internação (contados do dia de admissão até o penúltimo dia).	
		cPropDiasJejumCalorias	0: Nenhum dia com zero ingestão de calorias. 1: Foi detectado jejum de proteína em até 25% dos dias de internação. 2: Foi detectado jejum de proteína em mais de 25 e em até 50% dos dias de internação. 3: Foi detectado jejum de proteína em mais de 50 e em até 75% dos dias de internação. 4: Foi detectado jejum de proteína em mais de 75% dos dias de internação.	Regra: razão entre a quantidade de dias com zero ingestão de calorias sobre a quantidade de dias de internação (contados do dia de admissão até o penúltimo dia). Categorizado em faixas de percentual.	
		nQtdeDiasJejumCalorias_3d	Numérico inteiro maior ou igual a 0 (zero).	Regra: número de dias com zero ingestão de calorias nos primeiros 3 dias.	
		nQtdeDiasJejumCalorias_4_7d	Numérico inteiro maior ou igual a 0 (zero). NULL quando o período de internação for menor ou igual a 3.	Regra: número de dias com zero ingestão de calorias nos dias 4 a 7.	
		nPropDiasJejumCalorias_7dmais	Numérico inteiro maior ou igual a 0 (zero). NULL quando o período de internação for menor ou igual a 7.	Regra: razão entre o número de dias com zero ingestão de calorias nos dias posteriores ao dia 7 (até o final do período de internamento) e a quantidade de dias de internamento subtraído de 7.	
		nPropDiasJejumTotal	Numérico contínuo maior ou igual a 0.0 (zero) e menor ou igual a 1.0.	Regra: razão entre o número de dias com zero ingestão de caloria e proteína (jejum total) e a quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPHMinDia	Numérico contínuo maior que zero. Pode ser NULL.	Valor mínimo registrado no período de 24h. Unidade de medida: units.	
		nPHMaxDia	Numérico contínuo maior que zero. Pode ser NULL.	Valor mínimo registrado no período de 24h. Unidade de medida: mmHg.	
		nPropDiasPHHipo	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PHHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasPHHiper	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PHHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		cTendenciaPH			
		nPropDiasPASHipo	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 100 mmHg como limite mínimo para normalidade em anotações de PAS. Considerou-se PASHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PASHipo pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasPASHiper	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 160 mmHg como limite máximo para normalidade em anotações de PAS. Considerou-se PASHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PASHiper pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		cTendenciaPAS			

		nPropDiasPADHipo	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 60 mmHg como limite mínimo para normalidade em anotações de PAD. Considerou-se PADHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PADHipo pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasPADHiper	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 90 mmHg como limite máximo para normalidade em anotações de PAD. Considerou-se PADHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PADHiper pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		cTendenciaPAD			
		nPropDiasPAMHipo	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 64 mmHg como limite mínimo para normalidade em anotações de PAM. Considerou-se PAMHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PAMHipo pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasPAMHiper	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 64 mmHg como limite máximo para normalidade em anotações de PAM. Considerou-se PAMHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PAMHiper pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		cTendenciaPAM			
		nPropDiasUreiaHiper	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 50 mg/dL, para pacientes do sexo masculino, e 40 mg/dL, para para pacientes do sexo feminino, como limite máximo para normalidade em anotações de Ureia. Considerou-se UREIAHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de UreiaHiper pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasCreatininaHiper	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 1,3 mg/dL, para pacientes do sexo masculino, e 1,1 mg/dL, para para pacientes do sexo feminino, como limite máximo para normalidade em anotações de Creatinina. Considerou-se CREATHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de CREATHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasSodioHiper	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 145 mEq/L como limite máximo para normalidade em anotações de Sódio. Considerou-se SODIOHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima ou igual ao limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de SODIOHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.	

		nPropDiasSodioHipo	Númerico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 135 mEq/L como limite mínimo para normalidade em anotações de Sódio. Considerou-se SODIOHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de SODIOHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		cPropDiasPotassioHiper	Númerico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 5,5 mEq/L como limite máximo para normalidade em anotações de Potássio. Considerou-se POTHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de POTHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		cPropDiasPotassioHipo	Númerico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 3,0 mEq/L como limite mínimo para normalidade em anotações de Potássio. Considerou-se POTHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de POTHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasMagnesioHiper	Númerico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 2,5 mg/dL como limite máximo para normalidade em anotações de Potássio. Considerou-se MAGHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de MAGHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasMagnesioHipo	Númerico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 1,6 md/dL como limite mínimo para normalidade em anotações de Magnésio. Considerou-se MAGHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de MAGHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasFosforoHipo	Númerico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 2 mg/dL como limite mínimo para normalidade em anotações de Fósforo. Considerou-se FOSFOROHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de FOSFOROHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasAlbuminaHipo	Númerico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 3,5 g/dL como limite mínimo para normalidade em anotações de Albumina. Considerou-se presença de ALBUMHIPO nos dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de ALBUMHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasLinfoTotaisHipo	Númerico contínuo na faixa 0.0 e 1.0.	Por premissa, considerou-se 900 K/uL, para pacientes do sexo masculino, e 800 K/uL, para pacientes do sexo feminino, como limite mínimo para normalidade em anotações de Linfócitos Totais. Considerou-se presença de LINFOTOTHIPO nos dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de LINFOTOTHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	

		nPropDiasHemoglobinaHipo	Numérico contínuo na faixa 0.0 e 1.0.	Por premissa, considerou-se 13,5 g/dL, para pacientes do sexo masculino, e 12 g/dL, para pacientes do sexo feminino, como limite mínimo para normalidade em anotações de Hemoglobina. Considerou-se presença de HEMOHIPO nos dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de HEMOHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
Exames Laboratoriais	cFreqASTHiper	0: Não foi encontrada anotação de TGO (AST ou Aspartato) no período ou foi encontrada alguma anotação, porém nenhuma fora do limite de normalidade estabelecido 1: Foi detectada anotação de TGOHIPER no período e esta é inferior ou igual ao dobro do valor limite de normalidade estabelecido 2: Foi detectada anotação de TGOHIPER no período e esta é superior ao dobro e inferior ou igual ao quintuplo do valor limite de normalidade estabelecido 3: Foi detectada anotação de TGOHIPER no período e esta é superior ao quintuplo do valor limite de normalidade estabelecido	Por premissa, considerou-se 38 IU/L, para pacientes do sexo masculino, e 32 IU/L, para pacientes do sexo feminino, como limite máximo para normalidade em anotações de TGO. Considerou-se TGOHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de TGOHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.		
Exames Laboratoriais	cFreqALTHiper	0: Não foi encontrada anotação de TGP (ALT ou Alanina aminotransferases) no período ou foi encontrada alguma anotação, porém nenhuma fora do limite de normalidade estabelecido 1: Foi detectada anotação de TGPHIPER no período e esta é inferior ou igual ao dobro do valor limite de normalidade estabelecido 2: Foi detectada anotação de TGPHIPER no período e esta é superior ao dobro e inferior ou igual ao quintuplo do valor limite de normalidade estabelecido 3: Foi detectada anotação de TGPHIPER no período e esta é superior ao quintuplo do valor limite de normalidade estabelecido	Por premissa, considerou-se 41 IU/L, para pacientes do sexo masculino, e 31 IU/L, para pacientes do sexo feminino, como limite máximo para normalidade em anotações de TGP. Considerou-se TGPHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de TGPHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.		
		nPropDiasBilirrubinaHiper	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 1,2 mg/dL como limite máximo para normalidade em anotações de Bilirrubina. Considerou-se BILIHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de BILIHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasTrigliceridesHiper	Numérico contínuo na faixa 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 150 mg/dL, para pacientes do sexo masculino, e 135 mg/dL, para pacientes do sexo feminino, como limite máximo para normalidade em anotações de Triglicérides. Considerou-se TRIGHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de TRIGHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.	
Exames Laboratoriais	cFreqFosfatAlcalinaHiper	0: Não foi encontrada anotação de Fosfatase alcalina no período ou foi encontrada alguma anotação, porém nenhuma fora do limite de normalidade estabelecido 1: Foi detectada anotação de FALHIPER no período e esta é inferior ou igual ao dobro do valor limite de normalidade estabelecido 2: Foi detectada anotação de FALHIPER no período e esta é superior ao dobro e inferior ou igual ao quintuplo do valor limite de normalidade estabelecido 3: Foi detectada anotação de FALHIPER no período e esta é superior ao quintuplo do valor limite de normalidade estabelecido	Por premissa, considerou-se 150 IU/L como limite máximo para normalidade em anotações de Fosfatase alcalina. Considerou-se FALHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de FALHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.		

		nPropDiasWBCHipo	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 4.0 K/uL como limite mínimo para normalidade em anotações de WBC. Considerou-se WBCHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de WBCHipo pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasWBCHiper	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 11.0 K/uL como limite máximo para normalidade em anotações de WBC. Considerou-se WBCHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de WBCHiper pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nPropDiasPlaquetasHipo	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 150.0 K/uL como limite mínimo para normalidade em anotações de Plaquetas. Considerou-se PLAQUETASHIPO os dias em que se observou pelo menos uma anotação abaixo do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de PLAQUETASHIPO pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		cPlaquetasTendencia		Queda > 30% em 4 dias Alto risco de mortalidade. Plaquetas em ascensão Indicador de sucesso clínico e prontidão para extubação. Trombocitopenia persistente Associada a tempo prolongado de ventilação mecânica e falha na extubação.	
		nPropDiasLactatoHiper	Numérico contínuo na faixa de 0.0 a 1.0.	Por premissa, considerou-se 2.5 mmol/L como limite máximo para normalidade em anotações de Lactato Sérico. Considerou-se LACTATOHIPER os dias em que se observou pelo menos uma anotação acima do limite estabelecido. Regra: Calculado pela razão entre a quantidade de dias com anotação de LACTATOHIPER pela quantidade de dias de internação em UTI.	
		nDiasEmUTI	Numérico inteiro contínuo, maior ou igual a 3 e menor ou igual a 21.	Calculada a quantidade de janelas de 24h contadas a partir da data e hora de admissão na UTI. Cada janela foi considerada como dia de internação. Janelas finais de até 6h não foram contabilizadas, porém seus registros associados foram absorvidos nas transformações aplicadas no dia anterior. Unidade de medida do valor final: dias.	
	Internação	cDiasEmUTI	0: Curta duração (1 a 4 dias) 1: Média duração (5 a 8 dias) 2: Longa duração (mais de 8 dias)	Regra: classificar a partir de nDiasEmUTI.	
	Internação	cDesfechoEmUTI	0: Alta em UTI 1: Óbito em UTI	Atribuído o desfecho 1 quando a data de óbito estava preenchida na base de dados.	