

Esercizi: descrivere un dataset

Esercizio 1: calcola media, mediana e moda del campione.

Esercizio 2: calcola varianza, deviazione standard e IQR (VAR.P, DEV.ST.P, QUARTILE.INC).

Esercizio 3: costruisci una tabella di frequenza per classi (18-21, 22-25, 26-30) e indica la classe modale.

Esercizio 4: applica la regola dell'IQR e indica se ci sono outlier.

Dataset: voti di 12 studenti

18, 22, 25, 25, 27, 28,
28, 28, 29, 30, 30, 30

Suggerimento: ordina i dati prima di iniziare.

Valori

18
22
25
25
27
28
28
28
29
30
30
30

Media

26,66667

Mediana

28

Moda

28

Varianza

13,33333

Deviazione standard

3,651484

Scarti dalla media

-8,666666667
-4,666666667
-1,666666667
-1,666666667
0,333333333
1,333333333
1,333333333
1,333333333
2,333333333
3,333333333
3,333333333
3,333333333

Quadrati

75,11111111
21,77777778
2,77777778
2,77777778
0,11111111
1,77777778
1,77777778
1,77777778
5,44444444
11,11111111
11,11111111
11,11111111

Somma Quadrati

146,6666667

Q1

25

Q3

29,25

IQR

4,25

Inizio

fine

frequenza

18	21	1
22	25	3
26	30	8
		0

Classe modale

26-30

Calcolo degli outlier

Limite inferiore	18,625
Limite superiore	35,625

OUTLIER

18

Inserire il n numero 95 al data set

Valori

18	Media	31,92307692
22	Mediana	28
25	Moda	28
25		
27		
28	Varianza	371,4102564
28	Deviazione standard	19,27200707
28		
29		
30	Q1	25
30	Q3	30
30		
95	IQR	5
	Lim inf	17,5
	Lim sup	37,5
	Outlier	95