

# EE1205: Signals and Systems - TA

EE22BTECH11039 - Pandrangi Aditya Sriram

.1 The Z-transform of  $p(n)$  is defined as

$$P(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} p(n)z^{-n} \quad (.1.1)$$

.2 If

$$p(n) = p_1(n) * p_2(n), \quad (.2.1)$$

$$P(z) = P_1(z)P_2(z) \quad (.2.2)$$

.3 For a Geometric progression

$$x(n) = x(0) r^n u(n), \quad (.3.1)$$

$$\Rightarrow X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x(0) r^n z^{-n} \quad (.3.2)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x(0) (rz^{-1})^n \quad (.3.3)$$

$$= \frac{x(0)}{1 - rz^{-1}}, \quad |z| > |r| \quad (.3.4)$$

.4 Substituting  $r = 1$  in (.3.4),

$$u(n)ZU(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1 \quad (.4.1)$$

.5 From (.1.1) and (.4.1),

$$U(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u(n)z^{-n} \quad (.5.1)$$

$$\Rightarrow \frac{dU(z)}{dz} = -z^{-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} nu(n)z^{-n} \quad (.5.2)$$

$$\therefore nu(n)Z \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}, \quad |z| > 1 \quad (.5.3)$$

.6 For an AP,

$$x(n) = [x(0) + nd] u(n) = x(0)u(n) + dnu(n) \quad (.6.1)$$

$$\Rightarrow X(z) = \frac{x(0)}{1 - z^{-1}} + \frac{dz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}, \quad |z| > 1 \quad (.6.2)$$

upon substituting from (.4.1) and (.5.3).

.7 From (??), the sum to  $n$  terms of a GP can be expressed as

$$y(n) = x(n) * u(n) \quad (.7.1)$$

where  $x(n)$  is defined in (.3.1). From (.2.2), (.3.4) and (.4.1),

$$Y(z) = X(z)U(z) \quad (.7.2)$$

$$= \left( \frac{x(0)}{1 - rz^{-1}} \right) \left( \frac{1}{1 - z^{-1}} \right) \quad |z| > |r| \cap |z| > |1| \quad (.7.3)$$

$$= \frac{x(0)}{(1 - rz^{-1})(1 - z^{-1})} \quad |z| > |r| \quad (.7.4)$$

which can be expressed as

$$Y(z) = \frac{x(0)}{r-1} \left( \frac{r}{1 - rz^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}} \right) \quad (.7.5)$$

using partial fractions. Again, from (.3.4) and (.4.1), the inverse of the above can be expressed as

$$y(n) = x(0) \left( \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \right) u(n) \quad (.7.6)$$

.8 For the AP  $x(n)$ , the sum of first  $n + 1$  terms can be expressed as

$$y(n) = \sum_{k=0}^n x(k) \quad (.8.1)$$

$$\Rightarrow y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)u(n-k) \quad (.8.2)$$

$$= x(n) * u(n) \quad (.8.3)$$

Taking the Z-transform on both sides, and substituting (.6.2) and (.4.1) (making use of the convolution property of Z-transform),

$$Y(z) = X(z)U(z) \quad (.8.4)$$

$$\Rightarrow Y(z) = \left( \frac{x(0)}{1 - z^{-1}} + \frac{dz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \right) \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad |z| > 1 \quad (.8.5)$$

$$= \frac{x(0)}{(1 - z^{-1})^2} + \frac{dz^{-1}}{(1 - z^{-1})^3}, \quad |z| > 1 \quad (.8.6)$$

Separating the terms,

$$Y(z) = x(0) \left[ \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} + \frac{1}{1 - z^{-1}} \right] + \frac{d}{2} \left[ -z \frac{d}{dz} \left( \frac{1}{(1 - z^{-1})^2} \right) \right], \quad |z| > 1 \quad (.8.7)$$

$$= x(0) \left[ \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} + \frac{1}{1 - z^{-1}} \right] + \frac{d}{2} \left[ -z \frac{d}{dz} \left( \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} + \frac{1}{1 - z^{-1}} \right) \right], \quad |z| > 1 \quad (.8.8)$$

Taking the inverse Z-transform using (.5.3), (.4.1) and applying the derivative property:

$$y(n) = \left( x(0)(n+1) + \frac{d}{2}n(n+1) \right) u(n) \quad (.8.9)$$

$$= \frac{n+1}{2} (2x(0) + nd) u(n) \quad (.8.10)$$