MX010677



GROWPIG! DESARROLLO 40KG AMOXICILINA CLIENTE RECTO PF

Alimento balanceado medicado con amoxicilina para desarrollo de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garantizado Proteina, min. 15.0% Grasa, mín. 4.0% Humedad, máx, 12,0% Fibra, máx. 3.0% Cenizas, máx. 6.0% E.L.N. 60.0%

Ingredientes Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, oxido y/o sulfato de manganeso sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo orgánico, selenio orgánico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos como secuestrante de micotoxinas 3 kg/t, saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, ß glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), amoxicilina (400 g/t).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con amoxicilina; formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 50 y 75 kg) Indicado su uso 7 días para el tratamiento de infecciones bacterianas tales como estreptococosis, pleuroneumonía contagiosa, poliserositis infecciosa, nefritis, cistitis e infecciones del tracto reproductivo. Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso, vía oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

Tiempo de retiro: 14 días. No administre este producto en aves de producción de huevo y a bovinos en producción de leche destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción



"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

