Contenido Neto: 40kg

8/TTTOXIA

ANIJIDIXOMA NOO QQADIGEM OTNEMIJA Autorización SAGAKRA A-9066-167 WEAN UP 3 B E AMOXICILINA 40KG PE

PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PRE-INICIACIÓN

	%SL'SS	N'7'3
.xsiV	%05'9	SezineO
WAN	%0071	Нитедад
XEIV	%00'E	Fibra cruda
'LIHAI	ococi+	EDD IO DEED IO

OGASITNARAÐ SISIJANA

18,25%

INGREDIENTES:

Proteina cruda

biotina, niacina, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina. oxido y/o sultato de zinc, sultato de manganeso, selenito de sodio,EDDY y/o yoduro de potasio, vitaminas A_i , BS_i , E_i , X_i antioxidante (BHA, Etoxiquin), ácidas orgánicos, amoxicilina (400g/t), carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, (2,000 FYT/kg), saborizente sintético sabor frambuesa, eduicorante, extractos vegetales (cúrcuma, silium, capsicum), monodicálcico, sal común, lisine y/o metionina y/o treonina y/o triptófano y/o valina, cloruro de colina, litesa Sorgo, mais pasta de soya, soya integral, acelte vegetal, harina de pescado, carbonato de calcio, ortofosfato

INDICACIONES:

ADVERTENCIAS:

conford and energial and a second of the more of the second of the secon indicado para la prevención y el tratamiento de Infecciones bacterianas susceptíbles a la amoxicilina. Allimento medicado con smoxicilina para cerdos en la etapa de preiniciación (de 12 a 15 kg de peso).

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Oral, ofrecer el allmento VVEAN UP 3 B a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante 7 dias..

: oM stol

No almacenar el allmento, en lugares húmedos, callentes y mai ventillados, hágalo en sitios secos y frescos,

Estipat copie tatimas y nunca dejat el producto directamente el suelo y/o en contacto con paredes. protegidos de roedores, insectos y otros enimales.

yo otrecer et etimento a onas especies u ona finalidad zootacnica de los poncinos. construct armunos eneg neatized est eup zobiec sal éb alothica el baz estre est d'abudont este estre est annonn

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta mèdica

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado" Fecha de caducidad : Seis meses después de su fecha de producción