

MX000749

Contenido Neto: 25K

VIPEREWAN FASE O

Autorización SAGARPA A-9066-005

AUMENTO MEDICADO CON TIAMULINA Y CLORTETRACILINA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

USO VETERINARIO

ANÁLISIS GARANTIZADO

|                |      |        |
|----------------|------|--------|
| Proteína cruda | Mín. | 22,00% |
| Grasa cruda    | Mín. | 5,00%  |
| Fibra cruda    | Máx. | 2,80%  |
| Humedad        | Máx. | 12,00% |
| Cenizas        | Máx. | 8,50%  |
| E.L.N          | Dif. | 49,70% |

INGREDIENTES:

Sorgo, maíz, pasta de soja, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, proteína concentrada de soja, harina de pescado, plasma porcino y/o harina de sangre de origen porcino, carbonato de calcio, ortofosfato monodibásico, caolín, sal común, lisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura *Saccharomyces cerevisiae* inactiva, combinación de *Bacillus licheniformis* y *B. Subtilis* ( $9.9 \times 10^8$  UFC/kg) fitasa (2 000 FYT/kg) cloruro de colina, betaina, saborizante sintético sabor granibuesas, ácidos orgánicos análogos (BHA, Etoxiquin), ácido propiónico como inhibidor de hongos, tiamulina (100 g/ton), clortetraciclina (300 g/ton) carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, Iodo EDDV y/o yoduro de potasio, vitaminas A, D3, E, K, biotina, niacina, pantotenato de calcio, monofosfato de calcio, monofosfato de calcio, clonocobalamina.

INDICACIONES:

Alimento medicado con tiamulina y clortetraciclina para cerdos en la etapa de preiniciación (del 12º día de vida y hasta que alcance los 6,0kg de peso). Indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas susceptibles a la combinación de tiamulina y clortetraciclina.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, ofrecer el alimento VIPEREWAN FASE O a libre acceso bajo la pilmia de poco y frecuente durante 7 días.

ADVERTENCIAS:

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos, protegiéndolos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. No se administre este producto 5 días antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo humano.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

Lote No :

Fecha de caducidad : 6 meses después de su fecha de producción

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"