MX010758



CARNERINA API ABA FASE 5 40KG TILMICOSINA CLIENTE ECTO PE

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilmicosina para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

Análisis garantizado Proteina, min. 13.0%

Grasa, mín. 4.0%

Humedad, máx, 12,0% Fibra, máx. 7.0%

Cenizas, máx. 10.0%

E.L.N. 54.0% Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas Saccharomyces cerevisiae (2x10⁶9 UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg. o xilanasa 1200 U/kg., ß glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg), fosfato de tilmicosina (200 g/ton).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con tilmicosina para cerdas en gestación

Presentación en pellet que ayuda a consumirio adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas , granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas

Indicado para el tratamiento de neumonía causada por Actinobacillus pleuropneumoniae Mycoplasma hyopneumoniae. Pasteurella multocida y otros microorganismos sensibles a tilmicosina ; en enfermedad de Glasser ; y para reducir los signos clínicos y mortalidad

asociada al Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRSS) Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

Tiempo de retiro: Este alimento deberá de ser retirado de los cerdos destinados para consumo humano 7 días antes del sacrificio.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 5 **40KG TILMICOSINA CLIENTE** DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empague cerrado"

ECHA DE PRODUCCION

