

MX010722



CARNERINA API ABA FASE 2

40KG FLORFENICOL

CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con florfenicol para crecimiento de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-504

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 16.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, aminoácidos (lisina o metionina o treonina o triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 kg/t), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanas 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante o aromatizante frutal sintético, florfenicol (40 g/t).
Grasa, mín. 3.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 5.0%	
Cenizas, máx. 8.0%	
E.L.N. 56.0%	

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado florfenicol para crecimiento de cerdos

(42 a 77 días de edad)

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para esta etapa.

Indicado su uso de 7-15 días para el control de afecciones respiratorias simples y complejas.

Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No administre este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano. No consumir derivados de animales durante 5 días posteriores al tratamiento

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 2

40KG FLORFENICOL

CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

