## MX012034



# CARNERINA NO. 4 LACTANCIA PI ABA LINCOMICINA Y RTETRACICI INA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con lincomicina y clortetraciclina para cerdas lactantes

### Autorización SAGARPA A-0544-506

#### Análisis garantizado Proteina, min. 17.0% Grasa, mín. 6.0% Humedad, máx, 12,0% Fibra, máx. 6.0% Cenizas, máx. 10.0% E.L.N. 49.0%

Ingredientes Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A,D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas ( 3kg/t), acidificante orgánico (ácido butírico), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, saborizante o aromatizante lácteo frutal sintético, levaduras deshidratadas Saccharomyces cerevisiae (2x10^9 UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, ß glucanasa: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), fincomicina (100 g/t), clortetraciclina (400 g/t).

#### Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con fincomicina y clortetraciclina para cerdas en factancia Presentación en pellet que ayuda a consumirio adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la lactancia de las cerdas

Indicado su uso 7 días para tratamiento de enfermedades respiratorias por Mycoplasma spp y Actinobacillus pleuropneumoniae (App); y de enfermedades entéricas como Enteropatías Proliferativas Porcinas (EPP). Mantener en todo momento aqua potable y fresca para las cerdas

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: La cantidad de alimento requerido por la cerda lactante, depende de su pesa, número de lactancia, de las condiciones ambientales y del número de lechones que se estén alimentando, Oral, Ofrecerlo al menos en 2 a 4 servidas al día, Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

#### **ADVERTENCIAS**

Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales

De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes

Tiempo de retiro: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5 días después de la última administración.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO. 4 LACTANCIA API ABA LINCOMICINA Y CLORTETRACICLINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empague cerrado"

FECHA DE PRODUCCION