

MX012037

Contenido neto:



CARNERINA NO. 4 LACTANCIA API ABA TILOSINA Y SILFAMETAZINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilosina y sulfametazina para
cerdas lactantes

Autorización SAGARPA A-0544-506

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 17.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3kg/ton), acidificante orgánico (ácido butírico), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, saborizante o aromatizante lácteo frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (2x10 ⁹ UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, β glucanasa: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa 1800 U/kg) fosfato de tilosina (110 g/ton), sulfametazina (100 g/ton).
Grasa, mín. 6.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 6.0%	
Cenizas, máx. 10.0%	
E.L.N. 49.0%	

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con tilosina y sulfametazina para cerdas en lactancia.

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la lactancia de las cerdas.

Indicado para reducir la incidencia y severidad de rinitis por *Bordetella bronchiseptica*; para la prevención de la disentería porcina enteritis bacteriana porcina (salmonelosis) o enteritis necrótica causada por *Salmonella choleraesuis*; control de neumonía porcina causada por *Pasteurella multocida* y/o *Actinomyces pyogenes*.

Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La cantidad de alimento requerido por la cerda lactante depende de su peso, número de lactancia, de las condiciones ambientales y del número de lechones que se estén alimentando. Oral. Ofrecerlo al menos en 2 a 4 servidas al día.

Bajo la prescripción y supervisión del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:

Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los alimentos destinados para consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO. 4 LACTANCIA API ABA TILOSINA Y SILFAMETAZINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"



D04 FECHA DE PRODUCCION