## MX012033



# CARNERINA NO. 4 LACTANCIA API ABA CLORTETRACICLINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con clortetraciclina para cerdas lactantes

## Autorización SAGARPA A-0544-506

Análisis garantizado	
Proteina, min.	17.0%
Grasa, mín.	6.0%
Humedad, máx	.12.0%
Fibra, máx.	6.0%
Cenizas, máx.	10.0%
E.L.N.	49.0%

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de cafia, carbonato de calicio, ortofosfato de calicio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de rorso, yoduro de potasio o EDDI, selenito orgánico, cromo orgánico, vitaminas A.D. E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionia, teriofrano), atuminositicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas ( 3kg/t), acidificante orgánico (ácido butirico), ácido propiónico y ácido acelico como fungicida, saborizante o aromatizante lacteo frutal sintético, levaduras deshidratadas Saccharomyces cerevisiae (2x10º9 UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, ß glucanasa: 200 U/kg, cetulasa: 200 U/kg, manasa 1800 U/kg) clortetraciolina (400 g/t)

### Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con ciortetraciclina para cerdas en lactancia. Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la lactancia de las cerdas.

Indicado su uso de 8 a 15 días continuos para el tratamiento de las infecciones microbianas sensibles a la clortetraciclina (antibiótico de amplio espectro).

Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: La cantidad de alimento requerido por la cerda lactante, depende de su peso, número de lactancia, de las condiciones ambientales y del número de lechones que se estén alimentando. Oral. Ofrecerlo al menos en 2 a 4 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

#### ADVERTENCIAS:

Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No debe de administrarse este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano. No se deberán de consumir los subproductos de los animales tratados hasta 5 días después de terminado el tratamiento.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO. 4 LACTANCIA API ABA CLORTETRACICLINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

FECHA DE PRODUCCION